

**LA DÉTERMINATION RAPIDE
DES VARIÉTÉS DE FRUITS**

**COMMENT TROUVER SOI-MÊME
LE NOM D'UN FRUIT ?**

*

POIRES - POMMES

PETITE BIBLIOTHÈQUE HORTICOLE
publiée sous la direction de J. VERCIER

La Détermination rapide des variétés de fruits. Comment trouver soi-même le nom d'un fruit. Poires - Pommes,

par J. VERCIER. 1 vol. in-16 de 330 pages, avec figures.

Cerises - Fraises. 1 vol..... (Sous presse.)

Abricots - Pêches - Prunes. 1 vol..... (En préparation.)

L'Asperge, 1 vol. par J. VERCIER et Mlle VERCIER..... (Sous presse.)

Comment défendre nos vergers et nos jardins de leurs ennemis. 1 vol: par M. VERGUIN, inspecteur du Service de la Défense des Végétaux..... (Sous presse.)

La Fumure des Jardins, par M. KILR, directeur du Comptoir des Engrais azotés, à Dijon..... (En préparation.)

Le Dahlia. 1 vol., par M. Louis CAYEUX, ingénieur horticole.

(Sous presse.)

A LA MÊME LIBRAIRIE

Le Petit Jardin, Manuel pratique d'horticulture, par D. Bois, professeur de culture au Muséum, 5e édition. 1925, 1 vol. in-18 de 476 pages, 225 fig. (*Bibl. des Connaiss. utiles.*) ... 15 fr.

Les Plantes d'appartement et les Plantes de fenêtres, par D. Bois. 3e édition, 1929, 1 vol. in-18 de 444 pages, avec 219 figures (*Bibl. des Connaiss. utiles.*).... 1 5 fr.

Arboriculture fruitière, par L. BUSSARD, ingénieur agronome, professeur à l'École nationale d'Horticulture de Versailles, et G. DUVAL, ingénieur agronome. 5e édition, 1929, 1 vol. in-18 de 522 pages, avec 235 figures (*Encyclopédie Agricole*). Broché.. 24 fr.

Cartonné..... 30 fr.

Manuel de Floriculture, Nouvelle édition. 1931, 1 vol. in-16 de 418 pages, avec 328 figures (*Bibl. des Connaiss. utiles*).. . . . 20 fr.

Ajouter pour frais d'envoi : France, 10 % ; Étranger 15 %.

PETITE BIBLIOTHÈQUE HORTICOLE
publiée sous la direction de J. VERCIER

LA DÉTERMINATION RAPIDE
DES VARIÉTÉS DE FRUITS

COMMENT TROUVER SOI-MÊME LE NOM D'UN FRUIT ?

*

POIRES - POMMES

(Méthode chiffrée, inédite)

PAR

J. VERCIER

PROFESSEUR RÉGIONAL D'HORTICULTURE ET D'ARBORICULTURE



PARIS

LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

19, RUE HAUTEFEUILLE, 19

1934

OUVRAGES DU MÊME AUTEUR

Arboriculture fruitière (Cours complet, 70^e mille), 376 page, 354 figures (Médailles d'or).

Arboriculture fruitière en images (Album, 20^e mille), 250 pages dont 101 planches. (Médaille d'or de la S. N. H. F.).

Culture potagère (Cours complet, 82^e mille), 402 pages, 243 figures (Médaille d'or).

Étude sur l'Asperge (Médaille d'or).

Étude sur la Fraise (grande Médaille de vermeil).

Étude sur les Jardins scolaires, 68 pages (Médaille d'or).

Le Cassis (4^e édition), 153 pages, (médailles des S. N. H. F. et S. N. A. F.).

Le Fraisier, 176 pages et 48 fig. (1^{re} édition, 1933).

Nouvelle utilisation du froid artificiel en floriculture, 48 pages (Médaille d'or).

Sur un nouvel ennemi du Framboisier. L'Agrilus chrysodère var. rubicola.

En vente chez l'auteur, J. Vercier, 7, rue de Constantine, Dijon.

PRÉFACE

Au moment où tous les producteurs français s'organisent pour reconquérir sur les marchés extérieurs la place qu'ils y occupaient autrefois; au moment aussi où les commerçants et les cultivateurs tombent d'accord pour standardiser par région la production nationale, et restreindre utilement de ce chef le nombre beaucoup trop élevé des variétés fruitières utilisées en France; à la veille donc de voir, sinon disparaître, mais du moins diminuer la liste évidemment trop longue des fruits que nous cultivons mais que nous vendons assez mal, il nous a paru sage (avant que certaines de ces variétés ne disparaissent des cultures encore existantes) de relever leurs caractères pour qu'il soit permis à nos descendants de les retrouver un jour ou de les identifier sans difficulté s'ils viennent à en perdre les noms.

Notre but a donc été double, en publiant cet ouvrage mettre sous un petit volume, dans les mains des producteurs, des commerçants en fruits, des amateurs, des élèves des écoles d'agriculture et des écoles normales d'instituteurs, l'image et le signalement d'un assez grand nombre des fruits cultivés après la guerre, en même temps qu'une méthode neuve, simplifiée, inédite, originale et pratique leur permettant de trouver eux-mêmes, et parfois rapidement, aujourd'hui comme demain, les noms si souvent ignorés des bons fruits.

J. V.

INTRODUCTION

Il ne saurait être question, dans ce travail purement technique, de faire l'histoire du problème compliqué qu'a été de tout temps celui de la détermination des fruits.

Des travaux remarquables ont été successivement publiés tant en France qu'en Italie, en Allemagne ou en Amérique, par d'éminents auteurs parmi lesquels : -Mayer (1778); Manger (1780) ; Sickler (1794) ; Christ (1794 à 1809) ; Diel (1801) ; Von Bosc (1860) ; Willermoz (1863) ; Lucas (1869) ; Decaisne (1871) ; Engelbrecht (1890) ; Goethe (1894) ; etc...

M. Gerolamo Molon, professeur de pomologie à Milan, en a fait d'ailleurs une étude complète que nos lecteurs pourront lire dans *Il Risveglio Orticolo*, avril-mai 1916.

Nous rendrons tout d'abord un très sincère hommage aux auteurs qui nous ont précédé et inspiré. Eux seuls sont véritablement connus les difficultés, les patientes et interminables notes et observations et enfin les multiples écueils qu'à notre tour nous avons rencontrés. Leurs travaux – fruits de combien d'années de travail ! – quoique ingrats ou peu attrayants pour un profane, ont tous fait époque dans l'histoire de la pomologie.

Ces différentes études représentent toutefois plutôt des systèmes de classification que des méthodes de détermination. Goethe, cependant, s'était appliqué à rendre la sienne utilisable pour l'identification.

Ce fut, en réalité, Chasset, l'éminent pomologue, secrétaire général de la Société pomologique de France, qui, le premier, publia en 1928 un travail visant nettement la détermination de 270 variétés de poires en utilisant dans son très intéressant ouvrage *Essai de détermination des fruits* : 10 des tables de détermination dont les silhouettes permettent le rapprochement d'une poire donnée avec l'une des 16 familles qu'il indique ; 20 des tableaux synoptiques dans lesquels figurent les caractères suivants : époque de maturité, couleur

du fruit avant maturité, forme du pédoncule, couleur et saveur de la pulpe.

A la même époque, Molon édifia à son tour un système de classification, s'aidant de 14 familles et des caractères de maturité et coloration des fruits.

Un peu plus tard, en 1931, E. Thoury imagina un système de « Grilles » dont les cases numérotées servent à constituer des numéros matricules. La première grille aide à fixer les caractères de maturité, forme, couleur, saveur ; la 2^e grille permet de relever la longueur du pédicelle, la coloration ou la régularité des cuvettes, le poids approximatif, l'époque de floraison; la 3^e grille sert à noter la fertilité, la vigueur, la rusticité, la forme ; le 4^e tableau fait apprécier le rendement, la qualité, la couleur et la densité du jus. De l'examen des renseignements recueillis dans ces différents tableaux, l'auteur déduit qu'il y a ou non parenté, synonymie et, finalement, conclut qu'il est en présence de telle ou telle variété.

Nous ne citerons que pour mémoire : *The apples of New York* (traité descriptif et polychromique des pommes cultivées aux États- Unis) publié par le *Department of Agriculture* en 1918 ;

Dictionnaire pomologique, par André Leroy (1869 et 1879).

Les meilleurs fruits au début du XXe siècle, publié par la Société Nationale d'Horticulture de France (2^e édition 1928).

Catalogue descriptif des fruits adoptés par le Congrès pomologique, publié par la Société pomologique de France (3^e édition, 1927)... etc...

Ces derniers ouvrages ont eu pour but unique de décrire un certain nombre de bons fruits.

Malgré toute la valeur de ces travaux, il convient, sans vouloir les critiquer, de relever leurs différents points faibles. Bien que tantôt richement – mais alors insuffisamment – illustrés, ou complétés par de simples silhouettes, insuffisantes elles aussi chaque fois qu'un fruit affecte des formes variables, ces ouvrages ont parfois un volume ou une dimension exagérés qui rendent difficile leur emploi et leur logement.

D'autre part, leur système de classification ou de détermination a pour base une série de 8 à 16 types de fruits

auxquels les auteurs ont rattaché facilement peut-être toutes les variétés par eux étudiées, mais qui constituent, semble-t-il, un écueil sérieux pour la plupart des débutants. Il est toujours délicat en effet de ranger une poire parmi l'un des types ainsi prévus. Le profane – pour ne parler que de lui – ne voit pas assez facilement si le fruit qu'il a en main et dont il désire connaître le nom, est une poire « Beurrée » ou « Semi-Beurrée », « Ampolifomre » ou « Lardée », « Musquée » plutôt qu' « Aromatique » ; s'il convient de la rapprocher de la forme d'une toupie « Turbiniforme », « d'un coing « Cydoniforme » ou d'une calabasse « Calebassiforme », etc... Avec les pommes, le rattachement des différents fruits aux types Reinette, Calville, etc... est tout aussi délicat.

Ce sont là des divisions ou trop savantes ou ténébreuses que nos élèves nous ont invariablement déclarées aussi difficiles à suivre qu'à comprendre.

L'enquête à laquelle nous nous sommes livré auprès des élèves des écoles d'agriculture et des écoles normales d'instituteurs en même temps que de quelques amateurs de fruits n'a fait que confirmer notre sentiment: *Les ouvrages existants semblent surtout profitables aux professionnels déjà rompus aux exercices de détermination et familiers avec les termes techniques usité en pomologie. Ils ne sont pas suffisamment à la portée des profanes et pas d'un emploi facile pour les élèves de nos écoles d'agriculture.*

C'est à la suite de cette constatation que nous avons à notre tour tenté de faire œuvre utile.

Quelle que soit la difficulté apparente et réelle du problème, les nombreuses années de travail assidu qu'il pouvait exiger, nous avons tenu à l'entreprendre en envisageant simultanément l'examen approfondi des principales variétés appartenant aux diverses essences fruitières.

Malgré notre âge, et tout en sachant que la vie d'un homme serait nécessaire pour tenter un tel effort, nous avons entrepris de mettre sur pied un ouvrage aussi modeste qu'élémentaire, et peu coûteux, facile à consulter, d'un prix abordable et cependant assez complet, et plus illustré que tous les autres. Ce sont là bien des qualités ! que nous avons seulement tenté de réunir. Y sommes-nous parvenu, partiellement au moins ?

Ce serait là notre plus cher désir. Le public auquel est destiné cet ouvrage sera son meilleur juge. Suivant l'accueil qu'il lui fera, nous conclurons que nous avons ou non rendu service en ajoutant ce nouveau livre à la littérature horticole.

L'accueil – il faut bien le dire – que nos lecteurs ont réservé à nos traités précédents (*Arboriculture fruitière* : soixante-dixième mille; *Arboriculture fruitière en images* : vingtième mille; *Culture, potagère* : quatre-vingt-deuxième mille) nous a incité à penser que la facilité d'emploi du présent traité, son format restreint, son sens pratique, la rapidité relative du diagnostic qu'il permet d'établir, le feront adopter.

Nos prédécesseurs ont su préparer de remarquables ouvrages destinés à l'élite des cultivateurs ; nous nous sommes appliqué à rédiger le nôtre d'une façon très élémentaire sinon enfantine pour qu'il soit compris et utilisé par les moins initiés. Pussions-nous au moins nous être rapproché d'un tel idéal.

Que tous les chefs d'établissements qui ont bien voulu faciliter notre tâche en nous autorisant à plusieurs reprises à visiter leurs cultures fruitières pour y relever les notes qui nous étaient indispensables veuillent bien recevoir ici nos vifs et bien sincères remerciements.

*
* *

Le présent volume comprend trois parties : la première est consacrée à l'exposé et au fonctionnement de la méthode chiffrée ainsi qu'à des précisions relatives à quelques expressions techniques ; la seconde consiste en l'étude d'environ deux cents variétés de poires ; la troisième est réservée à l'étude d'environ deux cents variétés de pommes.

Nous publierons ultérieurement un additif qui permettra à nos lecteurs de compléter à leur tour cet ouvrage à l'aide de nouvelles descriptions de poires et de pommes.

En intercalant eux-mêmes les papillons qui ; spécialement, seront préparés et soigneusement paginés, aux places qui leur seront assignées, ils verront s'accroître davantage encore les chances déjà grandes qu'ils ont de trouver les noms de fruits auxquels ils s'intéressent.

PREMIÈRE PARTIE

DÉTERMINATION DES FRUITS PAR LA MÉTHODE CHIFFRÉE

Que diriez-vous si l'on mettait devant vous, d'une part, une, clef au moyen de laquelle vous établiriez un numéro de plusieurs chiffres et, d'autre part, un grand tableau électrique où il vous suffirait d'appuyer sur le bouton porteur du dit numéro pour voir apparaître le nom de la variété à laquelle vous vous intéressez ? Vous féliciteriez sans aucun doute l'auteur de l'invention.

Nous n'en sommes pas encore là ; mais dorés et déjà, il nous semble bien qu'un projet de cette nature serait réalisable et couronné de succès à la condition toutefois de limiter le nombre des variétés. Il n'est donc pas étrange d'envisager dès aujourd'hui la possibilité de réaliser soi-même une combinaison à l'aide de chiffres ayant un sens connu pour ensuite se reporter à une liste où, en regard du numéro que fournit, la dite combinaison, se trouve inscrit le nom de la variété recherchée.

C'est qu'en effet c'est sur une telle base que repose la nouvelle méthode d'identification à laquelle nous nous sommes arrêté.

Notre ouvrage a nécessité, comme ceux des auteurs qui ont précédé, de patientes et interminables observations sur les fruits les plus divers.

Nous avons inscrit avec beaucoup de soin, sous une forme chiffrée, toujours dans le même ordre et avec un nombre constant de chiffres, les traits essentiels et particulièrement

saillants d'un fruit. Nous avons obtenu de la sorte un numéro formé de sept chiffres qui, à eux seuls, révèlent dix caractères différents, donnant en quelque sorte l'expression et l'état civil résumé du fruit observé. Nous avons appelé ce groupe de sept chiffres le *Diagnostic* du fruit.

Tout diagnostic est accompagné de deux ou plusieurs silhouettes, voire même d'une ou plusieurs coupes transversales, capables de donner une idée exacte du profil vertical et, du contour (observé du côté de l'œil) ; il est donc facile et prudent de s'y reporter.

Les traits et caractères secondaires de ce même fruit ainsi que la plupart des caractères végétatifs de l'arbre qui l'a produit ont fait l'objet en quelques lignes d'un texte particulièrement substantiel auquel vous pourrez vous reporter dans les cas douteux ou pour exercer le contrôle de vos propres notes.

Enfin, correspondant au Diagnostic, à la figure et au texte, est inscrit le nom dont il convient de doter le fruit étudié.

Pour établir le diagnostic conforme à chaque fruit, nous avons effectué notre travail dans un certain ordre. Pour trouver le nom d'une pomme, d'une poire, vous devrez faire à votre tour et dans l'ordre inverse une partie de ce même examen. Appliquez ici, en la parodiant, cette formule bien connue : Aide-toi... et le livre t'aidera !

Nous avons étudié et, partant, rendu possible la détermination des différents fruits, limitant au présent ouvrage celle des poires et des pommes et réservant pour deux autres volumes l'étude analogue des autres fruits.

*VALEUR OU SENS QU'IL CONVIENT
D'ATTRIBUER*

à quelques mots techniques.

Avant de vouloir établir vous-même un diagnostic au vu des clefs qu'à cette intention nous avons préparées, il faut que vous soyez pénétré, comme nous-même, de la valeur exacte des mots ou rubriques dont nous nous sommes servi.

MATURITÉ. - Il est essentiel de connaître l'époque de

maturité pour établir le premier chiffre d'un diagnostic. Nous avons prévu, dans la première colonne de nos clés, sept époques de maturité pour les poires et cinq époques s'échelonnant pour les pommes. A chacune d'elles correspond un numéro. Il suffit donc de choisir aussi exactement que possible celui qui caractérise le fruit étudié pour poser le premier de la série de sept chiffres devant former le dit diagnostic.

Avec les variétés hâtives, le choix est en général aisé ; il est moins précis pour les variétés tardives, et en particulier pour les poires et les pommes dont la maturité chevauche souvent sur les mois d'automne et d'hiver. Cette remarque est valable non seulement lorsqu'on envisage une variété cultivée dans des milieux différents, mais aussi pour le cas d'un fruit cultivé dans une même localité. C'est ainsi que vous trouverez couramment en novembre des spécimens mûrs de pommes « Reine des Reinettes » et, en décembre, des poires « Bermagotte Espéren » etc. .. bien que ces fruits soient en réalité d'une maturité plus tardive. Au lieu de choisir un seul chiffre qui laisse supposer l'exclusion de tous autres, il est sage, en présence de ce cas quelque peu douteux ou embarrassant, de noter simultanément, s'il y a lieu, 2 ou parfois même 3 chiffres au lieu d'un seul; ils exprimeront à eux tous le dit doute en même temps qu'une précision relative, mais pratiquement suffisante pour sérier en premier examen la pomme ou la poire. Si cette imprécision, cette petite difficulté que représente le choix à faire parmi deux chiffres superposés donnent au diagnostic une élasticité nécessaire, elles vous obligeront parfois à étendre un peu vos recherches ; si par exemple vous n'avez pas obtenu satisfaction en recherchant, parmi les pommes, le numéro : 4. 236. 431

5

que vous aviez établi en consultant toute la clé, cherchez parmi les nombres commençant par un 5 et vous réussirez. Ce supplément de recherches représente en réalité un bien petit travail.

Rapport hauteur-largeur. – Tous les fruits d'une même variété n'ont pas forcément un rapport absolument constant

entre leur hauteur et leur largeur ; toutefois en pratique, ils peuvent être classés comme étant ou plus haut que large (1) ou plus large que haut (2), ou aussi haut que large (3). Une pomme « Gros Locard » sera toujours plus large que haute, tandis qu'une « Kandil Sinap » sera presque toujours plus haute que large ; les poires « Sucrée de Montluçon », « Passe-Crassane »... seront presque toujours aussi hautes que larges, tandis que les fruits de « Conférence », « Lebrun », « Le Lectier », seront toujours plus hauts que larges. Il est donc très facile à l'aide des chiffres 1, 2 ou 3 d'exprimer d'une façon élémentaire mais suffisante le rapport des hauteur et largeur.

Cette note, qui doit prendre le 2e rang dans la liste des 7 chiffres du diagnostic, est donnée à la suite d'un simple coup d'œil jeté sur le fruit. Il est cependant sage, pour opérer sûrement, de mesurer et comparer ces 2 dimensions avec un crayon par exemple ; l'expérience vous apprendra que faute de prendre cette précaution, chaque fois que les différences ne sont pas très apparentes, vous serez tenté d'inscrire 1 là où il y a lieu de mettre parfois un 3, ou bien encore un 3 à la place d'un 2. Pour assurer la rapidité dans les recherches, à faire ensuite dans le livre, il convient de disposer de données exactes. Dans le cas de doute ou lorsque, dans un lot de fruits identiques, vous rencontrez certains exemplaires du groupe 1 et quelques autres seulement, du groupe 2, inscrivez 1 en gros caractères et un petit 2 en dessous du 1.


SYMÉTRIE. - Nous admettons qu'un fruit est *symétrique* lorsque, coupé en deux, suivant son axe, il ne peut procurer que 2 parties semblables et égales. Les pommes et les poires ci-contre sont *symétriques*:

Ces fruits peuvent être presque symétriques, mais procurer cependant, si on les coupe dans un certain sens en suivant leur axe, 2 parties, a, b, quelque peu dissemblables; nous disons que ces fruits sont légèrement asymétriques.


C'est le cas des fruits ci-après, puisqu'une moitié seulement




de la poire comporte une légère gibbosité, et qu'avec la pomme on obtient un quart un peu plus volumineux à gauche, *a*, qu'à droite, *b*.



Quand, enfin, le fruit est nettement de forme irrégulière, son sectionnement permet d'obtenir 2 parties dont le contour ou le volume différent sensiblement. Nous admettons que les fruits suivants sont *asymétriques*. Pour apprécier la symétrie et inscrire la note qui lui correspond, examinez le fruit verticalement et sur ses différentes faces. Préféralement encore, coupez-le suivant le plan vertical qui risque le plus de mettre en évidence une différence s'il doit en exister une.



CONTOUR. - Nous donnons à ce terme une signification toute spéciale. Tenez le fruit horizontalement entre le pouce et l'index, le pédicelle face à vous, puis ensuite l'œil face à vous. Observez la régularité du contour, c'est-à-dire le périmètre plus ou moins arrondi du fruit à l'endroit où il est le plus large.



Vous jugerez que ce contour est *régulièrement arrondi* s'il se confond avec une circonférence ; qu'il est *irrégulièrement arrondi ou bosselé*, si la dite courbe est déformée ; qu'il est enfin *côtelé* s'il accuse des bosses plus ou moins saillantes et à des intervalles presque réguliers.


Nos silhouettes pointillées donnent une idée exacte des contours (périmètres) observés. Au centre nous avons situé

l'œil. Un petit cercle en blanc indique un œil ouvert ou entrouvert ; un cercle noir précise que l'œil est habituellement fermé. Les plus petites lignes rayonnant autour de ces cercles représentent des rides existantes ; les plus grandes correspondent à des bosses, ou même à des côtes qui bordent la cuvette. Celle-ci n'est ni ridée, ni bossuée quand ces lignes font défaut.

Type et forme. - Pour être mieux compris de nos lecteurs – initiés ou non aux recherches pomologiques – pour qu'ils aient moins de peine à discerner les poires piriformes des oblongues ou des calebassiformes, etc pour leur éviter toute hésitation – faute de limites précises – lorsqu'ils tentent de classer les pommes parmi les calvilles ou les reinettes, nous avons feint d'ignorer tous les termes admis par nos devanciers. Nous avons fait table rase de tous les anciens errements. A ces nombreuses classes ou familles conventionnelles plutôt que précises, nous avons substitué une simple note qui spécifie l'existence ou la conformation des cuvettes. Ce procédé apparemment enfantin présente le mérite d'être à la fois plus simple et plus certain que celui qui consiste à rattacher un peu au hasard la forme – variable d'ailleurs – d'un fruit donné à l'un des nombreux types admis. Les caractères propres aux cuvettes n'avaient pas encore retenu l'attention des pomologues ; leur constance relative permet de les utiliser au même titre que le coloris ou le pédicelle.

Nous nous sommes bornée à établir pour les poires trois types seulement, basés sur le nombre des cuvettes qui les caractérisent. Elles sont dites : sans cuvette, avec une cuvette, avec deux cuvettes, suivant que l'œil ou le pédicelle se trouvent implantés plus ou moins à fleur du fruit.

Les poires ci-contre sont *sans ou presque sans cuvette*






Elles sont ici avec *une cuvette* située tantôt vers le pédicelle, tantôt vers l'œil.



La plupart sont pourvues de *deux cuvettes* ;

Lorsque la ou les cuvettes sont très peu profondes, que vous êtes indécis pour les classer dans l'une ou l'autre des catégories, adoptez les deux chiffres qui correspondent au type douteux ; inscrivez ces deux chiffres l'un au-dessous de l'autre ; ils auront la même valeur et vous aideront à trouver, en donnant à votre diagnostic une certaine élasticité.

A ces trois types, nous avons ajouté – pour les poires – les formes :



Rétrécie vers la partie supérieure *A, B, C, D*



Étranglée (plus ou moins) *E, F, G, H*



Arrondie ou ovoïde, *I, J, K, L* ...


Ce qui nous conduit à 9 formules, numérotées de 1 à 9 dans la 4^e colonne de la clé spéciale aux poires ; vous aurez donc à choisir parmi les différentes rubriques/

- 1 Sans cuvette, rétrécie;
- 2 Sans cuvette, étranglée;
- 3 Sans cuvette, arrondie ou ovoïde;
- 4 Une cuvette, rétrécie;

- 5 Une cuvette, étranglée;
- 6 Une cuvette, arrondie ou ovoïde;
- 7 Deux cuvettes, rétrécie;
- 8 Deux cuvettes, étranglée ;
- 9 Deux cuvettes, arrondie ou ovoïde.

CUVETTES. – Pour les pommes – qui ont invariablement deux cuvettes – nous avons admis et retenu seulement la profondeur de chacune d'elles et cela suivant un ordre conventionnel : 1° profondeur de la cuvette du pédicelle ; 2° profondeur de la cuvette de l'œil. Nous avons obtenu de la sorte 9 types auxquels correspondent des numéros de 1 à 9 parmi lesquels il convient de choisir pour poser le quatrième chiffre du diagnostic.

Par l'examen sommaire de quelques pommes en mélange vous vous rendrez compte assez vite de ce qu'il convient de désigner sous les termes de *Cuvette profonde (a)*, *cuvette moyennement profonde (b)*, *cuvette peu profonde (c)*. Une fois votre œil exercé, vous jugerez sagement, une pomme pour la classer sans difficulté parmi les fruits ayant :



- 1 Deux cuvettes profondes.
- 2 Deux cuvettes moyennement profondes.
- 3 Deux cuvettes peu profondes.
- 4 Cuvette du pédicelle profonde;
Cuvette de l'œil moyennement profonde.
Cuvette du pédicelle profonde;
- 5 Cuvette de l'œil peu profonde.
Cuvette du pédicelle moyennement profonde;
Cuvette de l'œil peu profonde.
- 6 Cuvette du pédicelle moyennement profonde ;
Cuvette de l'œil profonde.
- 7 Cuvette du pédicelle moyennement profonde ;
Cuvette de l'œil peu profonde.


Vercier. – *Comment reconnaître les fruits*

8 Cuvette du pédicelle peu profonde;
Cuvette de l'œil profonde.

9 Cuvette du pédicelle peu profonde;
cuvette de l'œil moyennement profonde.

Ces désignations, bien qu'élémentaires, faciles à admettre par les moins initiés, nous ont suffi et vous suffiront pour préciser la forme d'une pomme que les silhouettes, dessinées d'autre part, complètent parfaitement.


Le fond des cuvettes présente fréquemment des *rides* (*r*)



plus ou moins accusées, plus ou moins nombreuses. Ces menus plissements de la peau rayonnent autour de l'œil.

Le bord de la cuvette est lui-même lisse et uni (*m*), ou au contraire ondulé (*n*), bossué (*o*), ou même côtelé (*p*) ; il est parfois gibbeux (*q*) chez les poires.

PÉDICELLE ou **PÉDONCULE**. – Chez les poires il est court (*a*), 5 à 15 millimètres ;



moyen (*b*), 20 à 30 millimètres; long (*c*), plus de 30 millimètres; gros (*d*) ; grêle (*e*) ou charnu (*f*) suivant sa position par rapport à l'axe du fruit, il est droit,; (*a, c*) ou oblique (*b, d, e, f*);



assez souvent arqué (*g, h*); parfois à la base d'un éperon ou d'une gibbosité (*d, j, h*).


Chez les pommes, le pédicelle est très court ou court. (*i, j*), 3 à 12 millimètres, mais n'atteignant pas le bord de la cuvette ;

moyen (*k*, *l*) dès qu'il dépasse le bord de la cuvette sans le dépasser de plus de 12 millimètres ; long (*m*) quand sa longueur au delà du bord de la cuvette excède 12 millimètres.

Œil. Calice. – L'œil est constitué par l'ensemble des cinq pièces (sépalés) qui forment le calice. Les sépalés sont courts, longs, étroits, larges, caducs, persistants, parfois aussi plus ou moins charnus, et partant, rigides.

Le point d'attache des sépalés forme un cercle petit, moyen ou grand, ce qui donne lieu à un œil petit, moyen ou grand. Avant d'arrêter la dimension de l'œil, il convient de bien observer le point d'attache des sépalés; certains yeux paraissent petits alors qu'ils sont en réalité moyens lorsque les sépalés, d'abord couchés à la base, se relèvent au centre. Comparez les yeux dans un lot de fruits en mélange et votre œil sera bien vite exercé à discerner les yeux petits des moyens ou des grands.

L'œil est dit *ouvert* quand les sépalés sont redressés (*b*) et à plus forte raison recourbés extérieurement (*a*), laissant voir un cercle nu à leur intérieur. L'œil est mi-ouvert quand les



sépalés sont obliques vers l'intérieur (*c*), laissant voir au moins une partie du centre de l'œil. L'œil est fermé ou clos quand les sépalés se rapprochent ou ont un point de tangence (*e*), ou même s'entrecroisent (*d*), au point de masquer entièrement le cercle intérieur.

Les yeux sont donc à la fois grands et ouverts, grands et clos, moyens-fermés, moyens-ouverts, petits-fermés, etc.

Couleur du fruit. – Épiderme. - La surface lisse, mi-rugueuse ou rugueuse, constitue un caractère assez fixe ; elle est même parfois visqueuse pour certaines pommes à peau brillante. L'épiderme est tantôt mince, tantôt épais. Vous ne l'apprécierez bien qu'en procédant à l'épluchage sur une tranche de fruit large de 1 centimètre.

Le coloris est un guide, mais il varie avec de nombreux

facteurs : le climat, le sol, le porte-greffe, la vigueur, l'âge.

Considérez une pomme d'api : elle peut être entièrement rouge sur un arbre très ensoleillé ; mais sur ce même arbre, vous trouverez des fruits presque ou même entièrement verts là où le feuillage les abrite à l'excès.

Les teintes rouillées, bronzées, fauves ou grises sont atténuées dans le feuillage et dans la partie du fruit qui est opposée au soleil. Les mêmes facteurs influencent ce coloris qui est limité parfois à une marbrure ou à quelques taches, tandis qu'il est abondant sur d'autres arbres ou dans d'autres régions.

Parmi les fruits d'un ton irréprochable que vous vous plaisez à admirer dans les expositions, beaucoup sont privés de leur teinte normale rouge, grise ou fauve, parce qu'ils ont été ensachés. Vous aurez à tenir compte de ce cas spécial comme nous avons dû le faire nous-même. Ne cherchez à déterminer que des fruits mûrs qui se sont développés en plein air.

La teinte de la cuvette du pédicelle nous a guidé comme elle vous guidera : tantôt elle est réduite et la cuvette est dite maculée (de fauve ou de brun) ; tantôt elle est largement lavée de ces mêmes tons. Parfois, au contraire, cette cuvette n'est pas teinte spécialement. Le voisinage de l'œil, moins fréquemment teinté, constitue un caractère trop inconstant; aussi ne l'avons-nous pas retenu.

La partie de l'épiderme exposée à l'insolation se colore généralement en rouge, – en rose ou en rouge-brun un peu cuivré ; il convenait donc de préciser la teinte. Parfois ce rouge ou ce rose sont unis, dégradés sur les bords ; parfois ils sont rayés de rouge plus vif et nous avons en ce cas retenu la présence des stries. Chaque fois qu'un fruit sera strié peu ou fortement, n'hésitez pas, inscrivez un 8 au cinquième chiffre de votre diagnostic.

Quand l'épiderme est unicolore (jaune ou entièrement rouge), notez-le comme il convient. S'il est jaune et fauve vers le pédicelle, ne le notez pas comme lorsqu'il est jaune et fauve au pourtour.

Quand il est à fond jaune, mais plus ou moins taché ou

voilé de gris ou de fauve au pourtour, c'est encore un cas spécial qu'il ne faut pas confondre avec la même robe qui, en plus, est frappée de rouge à l'insolation:

Observez donc avec soin les 9 cas prévus dans la cinquième colonne de nos clés et ne négligez pas d'inscrire 2 chiffres au lieu d'un quand vous rencontrerez 2 cas distincts ; inscrivez-en même 3 s'il y a lieu; ils vous aideront peut-être à trouver plus facilement.

Chair ou pulpe. – Nous n'avons pas cherché à caractériser le diagnostic en précisant nettement la qualité du fruit : première, deuxième ou troisième qualité ; tout au plus avons-nous, à propos de la chair, relaté, sa saveur : assez bonne, bonne ou très bonne. A part quelques exceptions, tous nos fruits étudiés sont de bonne qualité. Vous pourrez à votre tour, en fixant vous-même les caractères principaux (couleur, consistance) et en y ajoutant, si vous le désirez, les caractères secondaires (sucrée, juteuse, acidulée), vous faire une opinion personnelle de la saveur du fruit. Sa qualité dépend souvent de l'usage auquel on le destine et non pas uniquement du charme qu'il procure au palais.

Vous noterez donc, suivant les cas, toujours à l'aide d'un chiffre figurant dans la colonne spéciale à la couleur : *blanche, jaunâtre, verdâtre, rosée, rose au pourtour, teintée de vert ou de jaune, tendre, ferme, cassante, peu juteuse, musquée, un peu âpre, etc...*

COMMENT IL FAUT S'Y PRENDRE POUR DÉTERMINER RAPIDEMENT UN FRUIT

Ne vous contentez, jamais d'une seule pomme ou d'une seule poire pour tenter d'en trouver le nom ; procurez-vous ou exigez de celui qui vous consulte un groupe de 6 à 10 fruits pris au hasard sur l'arbre ou préférablement encore sur deux ou plusieurs arbres semblables. En vous contentant d'un seul exemplaire, vous courez le risque, en jugeant d'après lui, d'inscrire des caractères erronés s'il ne représente pas à lui seul l'ensemble des caractères que nous avons pu recueillir personnellement à votre intention.

Prenez donc un lot des pommes... qui vous préoccupent. Examinez-les bien en détail pour avoir à l'esprit une image moyenne et aussi exacte que possible. Jetez les yeux successivement sur les différentes colonnes de la *clé*. Choisissez dans chacune d'elles et parmi les caractères qu'elle groupe le chiffre correspondant que vous jugez se rapportant le mieux au caractère que vous trouvez. Inscrivez côte à côte les chiffres ainsi choisis en observant l'ordre dans lequel sont établies les colonnes. C'est ce groupe de chiffres qui représente le numéro cherché. C'est ce numéro que vous devez aussitôt rechercher dans le livre parmi tous ceux réservés aux pommes (1). Cette recherche peut être des plus rapides, puisque les dits numéros sont classés par ordre numérique dans un tableau qui précède chaque clé. Si par hasard vous rencontrez très exactement ce nombre, reportez-vous à la page dont le dit tableau fait mention dans une colonne spéciale. Jetez un coup d'œil sur les silhouettes qui accompagnent le diagnostic trouvé.

Si elles vous donnent l'impression qu'elles sont véritablement l'image du fruit que vous avez en main, vous n'avez

(1) Voyez la liste des diagnostics qui précède la clé des pommes.

qu'à lire : le nom qui les précède vous donne satisfaction. Mais pour plus de sûreté – car nous apprécions la précision, – jetez encore un coup d'œil sur les quelques lignes du texte situées en dessous ; elles relatent les caractères secondaires qui sont à même de vous éclairer définitivement. Ce contrôle – pour la forme – peut porter sur quelques-uns seulement de ces caractères secondaires, mais, nous l'avons déjà dit, vous pouvez l'étendre à tous ceux que nous y avons prévus tant pour le fruit lui-même que pour l'arbre, qui l'a produit.

Quelque superflu que puisse paraître ce contrôle, il est sage d'y procéder. Vous pourrez, dans certains cas, en effet, assez rares d'ailleurs, établir votre diagnostic en tous points semblable à l'un des nôtres alors qu'il sera erroné ; et pour peu que les silhouettes aient une vague ressemblance avec le fruit que vous observez, vous risqueriez de conclure prématurément et faussement.

Tout fruit examiné doit pouvoir être identifié, s'il figure toutefois parmi ceux décrits dans l'ouvrage. Nous avons tenu à y grouper un assez grand nombre de variétés, avec l'espoir de vous donner satisfaction le plus possible en augmentant d'autant vos chances.

Théoriquement donc, si, après nous, vous examinez un fruit et que vous le notiez exactement comme nous l'avons fait, vous devez trouver la même série de chiffres que nous-même et, en feuilletant le livre, vous devez arriver rapidement au but, c'est-à-dire au nom que vous cherchez.

En pratique, les choses ne se passent pas toujours ainsi.

Les fruits, au lieu d'être absolument semblables entre eux, varient quelque peu même lorsqu'ils proviennent d'un même arbre, d'une même branche, d'une même bourse. Les uns sont plus hauts ou, au contraire, plus larges, colorés ou non en rouge; les cuvettes varient un peu de forme ou de profondeur; le pédicelle peut être tantôt droit, tantôt oblique et même arqué ; la chair même varie avec les milieux : elle est quelquefois blanche ici, et plutôt jaunâtre ailleurs, etc...

Il s'en suit que, pour cette raison déjà, vous pouvez relever certains chiffres qui, dans votre diagnostic, diffèrent des

nôtres. Mais vous pouvez aussi coter autrement que nous l'avons fait un caractère donné, notamment lorsqu'il y a doute. Nous avons pu, par exemple, apprécier comme étant moyennement profonde une cuvette qui n'est pas nettement profonde, tandis que vous estimez peut-être qu'elle est profonde. Ce détail suffit pour fausser le quatrième chiffre du diagnostic. Si, de plus, vous tombez sur des pommes dont le pédicelle est moyen alors qu'il est ordinairement court et que nous l'avons noté tel, le sixième chiffre du même diagnostic différera encore du nôtre.

Tout ceci a été prévu.

Il n'est pas obligatoire de retrouver sur le livre le nombre tel que vous l'avez inscrit : il suffit de retrouver individuellement – mais avec le numéro d'ordre qui leur est assigné – tous vos chiffres parmi ceux que nous avons pris soin de superposer dans notre diagnostic.

Si, par exemple, au vu d'une pomme, après avoir établi le nombre 4. 155. 821, vous le cherchez vainement dans le tableau de tête ou dans le livre, ne concluez pas de suite que votre fruit n'y figure pas. Comparez un à un vos 7 chiffres avec ceux des numéros qui commencent par 4, se continuent par 1, puis contiennent un 5 (soit sur la ligne principale, soit en dessus, soit en dessous); continuez avec le 5, puis le 8, le

6, et le 1. Vous serez amené assez vite au N° 4.185.761 qui

$$\begin{array}{cc} 4 & 2 \\ 3 & 5 \ 4 \ 83 \end{array}$$

réunit bien tous vos chiffres.

Concluez alors que vous êtes vraisemblablement en présence de la variété Kandil Sinap (le nom est à côté). Vérifiez encore avec la figure (silhouette et coupe), puis avec le texte, et vous serez étonné que 8 ou 10 minutes seulement vous auront suffi pour entrer en possession de la solution du problème.

Si vous vous êtes trompé en fixant l'époque de maturité

d'une poire, vous allez vainement chercher parmi les nombres commençant par un 4 étant donné que vous aurez écrit 4.168.981, alors qu'il eût fallu inscrire 5.168.981. Avant d'abandonner vos recherches, voyez donc parmi les nombres commençant par un 5 et vous rencontrerez le diagnostic souhaité avec le nom du fruit : Duchesse Bérerd.

Recherches complémentaires en cas d'insuccès. – Si, en opérant comme nous l'avons dit, vous ne trouvez pas dans notre ouvrage le nombre que vous recherchez, c'est que le fruit qui est en votre possession n'y figure pas, vous avez sans doute affaire en ce cas à une variété locale très peu connue ou de qualité médiocre; ou bien, votre numéro diagnostic a été mal établi, vous n'avez pas donné à chacun des caractères successivement relevés la valeur que, personnellement nous leur avons attribuée. Recommencez l'opération en redoublant d'attention; pesez davantage les différents cas exprimés dans chacune des colonnes de la clé; si vous hésitez parfois entre deux chiffres à poser, inscrivez-les tous deux en les superposant. Recherchez à nouveau dans le volume et vous trouverez sans doute tous vos chiffres en les prenant soit parmi nos gros chiffres, soit parmi les petits (situés au-dessus ou au-dessous).

Mais il peut arriver que par suite des conditions un peu spéciales de milieu, de vigueur, de porte-greffe, etc... dans lesquelles se sont développés vos fruits, un caractère qui vous frappe et auquel vous attachez une importance réelle, entraîne l'emploi d'un chiffre qui diffère du nôtre; vous hésitez à conclure en pareil cas. Vérifiez alors les silhouettes établies en regard des nombres se rapprochant le plus de celui par vous établi. Presque toujours vous arriverez à distinguer le fruit qui vous intéresse. Contrôlez avec les caractères secondaires, et vous aurez solutionné définitivement le problème.


Autre façon de procéder. – Notre méthode qui, logiquement, devrait vous conduire mathématiquement au but, si tous les fruits d'une même variété étaient absolument semblables, pourra au moins, dans certains cas, sembler manquer encore de précision. Quand après avoir vainement suivi la

voie chiffrée, quand, pour un motif quelconque, vous ne voulez pas faire usage de la clé ou si vous avez égaré celle-ci, servez-vous de notre livre comme d'un dictionnaire pomologique ordinaire. Sachant que les fruits, y sont sériés à peu de chose près d'après leur époque de maturité, vous n'aurez qu'à rechercher dans la série des numéros commençant par un 5 ; le nom d'une poire que vous savez être *très tardive*, et parmi ceux commençant par un 2 ou par un 3 celui d'un fruit de fin d'été. En feuilletant ainsi les silhouettes d'un groupe défini dans une liste déjà limitée, votre regard s'arrêtera sur une ou deux d'entre elles; vous lirez les quelques lignes de texte pour comparer les caractères, de part et d'autre, et vous obtiendrez encore assez vite satisfaction.

Nota. - Pour éviter de perdre la clé, ce qui vous mettrait ensuite dans un grand embarras, nous vous recommandons d'en faire un duplicata en papier fort dont vous collerez la base en haut de la dernière page des poires (ou des pommes), ce qui la mettra en évidence (en papillon).

Quand, après avoir eu les yeux fréquemment fixés sur elle au cours d'une séance de détermination, vous voudrez refermer le livre, vous replierez la dite feuille en dedans en vous servant de la rive collée comme d'une charnière.

DEUXIÈME PARTIE



ÉTUDE DES VARIÉTÉS

DE

POIRES

Liste des variétés de poires classées d'après l'ordre
numérique de leurs diagnostics respectifs.

| Diagnostics | NOMS | Pages | Diagnostics | NOMS | Pages |
|----------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------|-------|
| 6 9 1.343.271 1 33 6 | Doyenné de juillet | 39 | 7 83 2.172.793 355 52 4 | Illinka..... | 45 |
| 6 2.141.551 72 768 | Gentil Bianca | 39 | 2.174.482 15 | Du Canada | 45 |
| 2.141.551 14 29 12 | Beurré Giffard | 40 | 51 5 2.174.761 82 296 5 | André Desportes | 46 |
| 2.144.296 8 23 | Fondante des emmurés | 41 | 4 4 2.182.291 5 783 | Lawson..... | 46 |
| 4 68 2.145.291 2 74 | Précoce de Trévoux... | 41 | 6 2 2.194.596 77 461 4 | Sainte-Anne..... | 47 |
| 5 42 4 2.151.281 3 94 77 9 | Clapp's Favourite | 41 | 2.286.241 3 5 9 6 | Bergamote d'été | 48 |
| 2.171.281 3 42 4 | Fin Juillet | 43 | 3.117.671 7 | De L'Assomption | 48 |
| 82 2 2.171.591 45 769 | Epargne | 43 | 6 3.141.243 4 76 | Prince Impérial | 49 |
| 4 4 2.171.771 347 59 8 | Wilder | 45 | 86 3.141.591 374 24 | Belle de Bruxelles | 49 |
| | | | 4 85 3 3.141.691 52 74 3 | Madame Treyve | 50 |

| Diagnostics | NOMS | Pages | Diagnostics | NOMS | Pages |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------------------|-------|
| 3.141.988 7 6 | Rousselet de Reims | 51 | 4.142.593 266 | Saint-Nicolas | 59 |
| 7 6 3.142.291 14 126 1 | Monsallard | 51 | 81 8 4.142.661 5 75 89 4 | Conseiller à la cour | 59 |
| 8 59 3.167.341 2 82 133 | Docteur Jules Guyot ... | 52 | 4.142.691 351 74 | Beurré d'Angleterre ... | 60 |
| 8 9 3.168.541 2 35 788 | Bon Chrétien Williams | 52 | 6 4.144.291 13 | Président Roosevelt ... | 61 |
| 8 3.171.621 4 42 9 | Bonne d'Ezée | 53 | 2 6 4.145.591 5 5 82 | William-Duchesse | 61 |
| 1 7 3.182.841 4 5 568 4 | Souvenir su Congrès ... | 54 | 3 6 4.147.291 5 3 4 7 4 1 | Fondante Thiriote | 62 |
| 41 74 3.195.891 4 82 66 8 5 | Triomphe de Vienne ... | 54 | 4 7 2 4.147.321 5 | Duchesse Panachée ... | 63 |
| 41 74 3.195.891 4 82 66 8 5 | Doyenné de Mérode .. | 56 | 4 7 2 4.152.891 5 45 685 | Nouveau Poiteau | 63 |
| 3 4.141.993 5 2 825 | Beurré Capiamont ... | 56 | 1 4 4.152.991 5 45 824 | Beurré Durondeau ... | 64 |
| 1 1 4.142.291 74 5 | Comte de Chambord .. | 57 | 18 93 4.154.791 66 655 | Fondante des Bois | 65 |
| 5 4.142.361 51 9 | Louise Bonne D'Avranches .. | 57 | 16 17 4.155.244 67 798 8 6 | Beurré Fouqueray ... | 65 |
| 81 8 4.142.591 15 66 8 | Favorite Morel | 58 | 69 8 4.155.498 98 64 | Prémices d'Écully | 66 |

| Diagnostics | NOMS | Pages | Diagnostics | NOMS | Pages |
|--------------------------------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| 83 6 4.159.631 5 67 72 45 9 | Belle Guérandaise | 66 | 8 1.184.741 45 956 | Directeur Hardy | 74 |
| 98 4.161.861 5 14 55 | Baronne de Mello | 67 | 1 6 4.184.842 35 81 | Joyau de septembre ... | 75 |
| 9 8 4.165.791 5 54 26 | Alexandrine Douillard | 68 | 72 3 4.184.746 393 26 47 9 | St-Michel Archange . | 75 |
| 86 7 4.171.861 43 94 | Beurré Hardy | 68 | 75 9 4.144.841 81 8 | Enfant Nantais | 76 |
| 8 4.172.667 5 45 791 | Conférence | 69 | 4 3 4.184.891 37 98 | Beurré Superfin | 77 |
| 5 4.172.886 5 8 69 | Van Marum | 70 | 4.187.641 8 | Ellis | 77 |
| 5 7 1.174.294 51 661 8 | Princesse | 70 | 5 4.192.281 5 81 176 | Marguerite Marillat ... | 78 |
| 4.174.896 41 6 | Pierre Tourasse | 71 | 8 6 4.196.591 85 645 | Le Brun | 79 |
| 4 4.177.746 5 84 6 | Grosse Louise | 72 | 4.219.666 3 4 49 | Doyenné de Mongeron | 79 |
| 4 67 4.181.681 77 59 | Beurré Gris | 73 | 4.349.795 76 5 1 49 25 | Beurré Dilly | 80 |
| 4 6 4.182.892 5 98 78 7 4 | Beurré Auguste | 74 | 4.353.592 5 226 68 7 4.357.731 68 4 | Boieldieu | 81 |
| | | | | Docteur Desportes | 81 |

| Diagnostics | NOMS | Pages | Diagnostics | NOMS | Pages |
|------------------------------------|-------------------------|-------|------------------------------------------|------------------------|-------|
| 14 58 4.359.732 147 29 | Doyenné Blanc | 82 | 2 84 81 5.151.781 46 62 17 5 | Nec Plus Ultra Meuris | 89 |
| 1 7 4.374.681 43 59 | Seigneur | 82 | 5.152.399 8 63 | Certeau d'Automne ... | 90 |
| 5 5.134.541 387 73 | Jules d'Airolles | 83 | 6 5.152.741 6 85 58 | De la Foresterie | 91 |
| 5.141.393 6 54 | Foucoubas | 84 | 7 5.152.791 4 81 666 | Louise Bonne Sannier | 91 |
| 14 5.142.291 51 168 8 | Épine du Mas | 84 | 85 1 5.152.796 348 369 7 | Sucrée de Montluçon | 92 |
| 1 8 5.142.741 74 69 9 | Comtesse de Paris | 85 | 4 5.152.891 81 7 | Beurré d'Apremont ... | 93 |
| 7 58 5.144.241 357 79 8 6 | Doyenné du Comice .. | 86 | 67 5.154.182 6 7 | Éva Baltet | 93 |
| 5 5.144.791 375 646 | Délices d'Hardenpont | 87 | 1 27 7 5.154.291 386 54 4 | Charles Ernest | 94 |
| 9 28 5.144.791 3 7 64 | Des Urbanistes | 87 | 1 72 5.155.561 328 69 | Beurré Diel | 95 |
| 55 5 5.144.881 6 77 646 | Orpheline d'Enghien . | 88 | 2 5.158.541 6 6 29 | Beurré d'Hardenpont . | 95 |
| 7 5.145.392 4 5 7 1 | Général Tottleben | 88 | 4 63 5.158.541 87 29 | Jeanne d'Arc | 96 |
| 5 4 5.145.995 74 6 8 | Vans Mons | 89 | 5 646 5.162.591 6 95 189 | Le Lectier | 97 |

| Diagnostics | NOMS | Pages | Diagnostics | NOMS | Pages |
|----------------------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|-------|
| 5.162.591 95 265 8 84 | Beurré Six | 97 | 59 5.174.854 386 96 4 62 | Messire Jean | 106 |
| 5.165.661 58 79 4 71 66 | Triomphe de Jodoigne | 98 | 5.177.891 6 48 2 | Pierre Corneille | 106 |
| 5.165.741 54 58 9 9 7 | Ferdinand Gaillard | 99 | 5.182.193 5 4 8 | Colombia | 107 |
| 5.168.791 6 35 66 354 | Sœur Grégoire | 100 | 5.182.341 55 2 9 1 | Beurré Luizet | 108 |
| 5.168.981 9 844 7 | Duchesse Bérerd | 100 | 5.183.692 96 78 97 5 | Roi Ch. de Wurtemberg | 108 |
| 5.169.743 388 696 85 6 | Duchesse d'Angoulême | 101 | 5.184.641 6 58 796 35 | Président Mas | 109 |
| 5.171.741 42 964 | Beurré Clairgeau | 102 | 5.184.741 375 6 1 | Baltet père | 109 |
| 5.171.782 82 54 95 7 2 | Armand Jandriot | 103 | 5.184.895 45 667 94 5 | Virginie Baltet | 110 |
| 5.172.191 6 84 26 54 2 1 | Curé | 103 | 5.185.691 351 82 7 58 3 | Marie-Louise d'Uccle . | 111 |
| 5.172.796 85 568 1 7 | Président d'Osmonville | 104 | 5.185.741 72 69 4 8 | Bon Chrétien Napoléon..... | 111 |
| 5.172.831 6 8 64 2 | Soldat Laboureur | 105 | 5.186.981 375 8 46 8 | Duchesse Bronzée | 112 |
| 5.172.851 5 6 | Président Héron | 105 | 5.187.941 93 6 77 | Beurré Dumont | 113 |

| Diagnostics | NOMS | Pages | Diagnostics | NOMS | Pages |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| 5.188.597 4 74 64 6 74 | Bon Chrétien Bonnamour | 113 | 5.357.732 6 3 | Kieffer Seedling | 122 |
| 5.189.641 57 9 95 8 | Beurré Bachelier | 114 | 5.376.681 184 84 5 78 | Doyenné Guillard ... | 122 |
| 5.189.891 394 65 3 7 | Prémices Lesueur | 115 | 5.396.691 44 964 5 | Bonne de Beugny | 123 |
| 5.191.985 8 7 2 1 67 | Figue d'Alençon | 115 | 6.122.994 7 15 856 85 34 | Martin Sec | 124 |
| 5.192.291 85 766 4 8 1 | Madame Bonnefond .. | 116 | 6.141.793 72 22 4 83 1 | Beurré Gris D'Enghien | 124 |
| 5.193.295 7 4 71 | Marguerite Brandon ... | 117 | 6.141.943 77 82 4 9 9 18 6 | Merveille Ribet | 125 |
| 5.194.886 85 45 4 5 | Mère Périer | 117 | 6.144.841 355 936 7 3 | Bonne de Malines | 125 |
| 5.195.391 4 82 7 6 4 55 4 | Légipont | 118 | 6.145.595 52 6 1 4 6.149.796 7 27 84 7 | Beurré Rance | 126 |
| 5.199.891 387 969 | Colmar d'Arenberg ... | 118 | 6.151.891 3 3 68 6 56 | Doyenné d'Alençon ... | 127 |
| 5.229.696 356 6 | Bergamote Crassane ... | 119 | 6.152.791 85 64 | Passé Colmar | 128 |
| 5.311.831 4 7 9 | Doyenné Gris | 120 | | | |
| 5.343.396 256 24 6 2 85 | Maude | 120 | | | |
| 5.357.131 1 9 646 3 | La France | 121 | | | |

| Diagnostics | NOMS | Pages | Diagnostics | NOMS | Pages |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 84 26 6.153.594 7 341 641 | Duchesse de Mouchy .. | 129 | 3 6 6.181.792 5 4 64 7 | Anna Audusson | 137 |
| 6.154.284 41 6 | Ministre Viger | 129 | 41 2 6.182.392 5 358 6 7 | Beurré Sterkmans | 138 |
| 4 6 6.154.791 5 85 65 | Saint-Germain d'hiver | 130 | 7 13 6.188.241 354 79 | Président Drouard | 139 |
| 2 71 68 6.154.791 7 45 246 87 3 | Madame Ballet | 131 | 86 6.192.781 65 946 | Nouvelle Fulvie | 140 |
| 6.155.781 394 4 | Beurré Vauban | 132 | 6.194.691 5 3 6 | Virgouleuse | 140 |
| 1 6.159.731 7 346 4 | Doyenné de Montjean . | 132 | 6.194.841 8 98 | Beurré Dubuisson | 141 |
| 8 7 6.161.291 7 39 62 | Fondante Fougère | 133 | 6 6.195.736 7 84 4 | Directeur Alphanth | 142 |
| 8 6.164.591 396 62 | Zéphirin Grégoire | 134 | 6 2 6 6.195.793 7 388 641 | Dorset | 142 |
| 54 6.165.693 9 66 | Bési de Chaumontel ... | 134 | 3 87 6.196.941 7 364 8 | Prince Napoléon | 143 |
| 55 5 6.168.292 7 97 661 8 7 | Bon Chrétien d'hiver | 135 | 6.198.743 | Belle sans pépin de Riha | 144 |
| 6.181.494 7 | Saint-Rémy | 136 | 8 6.239.881 7 26 63 | Bergamote Sannier | 144 |
| 52 6.181.591 44 6 | Professeur Opoix | 137 | 751 6.268.596 7 387 267 | Joséphine de Malines . | 145 |

| Diagnostics | NOMS | Pages | Diagnostics | NOMS | Pages |
|------------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 6.286.592 3 4 68 8 | Bergamote la Gantoise | 145 | 18 4 7.157.291 44 8 2 | Alexandrine Mas | 153 |
| 6.289.731 5 5 64 5 4 | Bergamote Dorée | 146 | 4 88 7.159.541 6 324 636 7 | Doyenné d'hiver | 154 |
| 6.316.746 229 53 67 5 | Bergamote Phillipot ... | 146 | 4 3 7.159.791 83 64 6 | Sénateur Belle | 154 |
| 6.359.591 196 6 4 49 2 | Suzette de Bavay | 147 | 7.162.799 91 92 8 | Belle Angevine | 155 |
| 6.377.891 183 743 6 | Duchesse de Bordeaux | 148 | 7.165.669 358 294 53 7 | Catillac | 156 |
| 6.393.941 191 835 | Beurré de Luçon | 148 | 7.181.696 6 42 76 8 3 | St-Germain Vauquelin | 156 |
| 6.398.396 5 6 65 9 | Royale d'hiver | 149 | 7.185.641 6 9 766 8 | Marie Benoist | 157 |
| 7.151.671 6 4 43 4 7 6 | Triomphe de Tournay . | 150 | 7.185.78 7.189.441 2 75 | Comte de Wurtemberg Hoover | 158 158 |
| 7.153.691 6 89 18 4 6 8 2 | Beurré de Naghin | 150 | 7.195.896 84.66 8 8 | Souvenir de Jules Guindon | 158 |
| 7.154.691 6 85 72 17 64 | Belle des Abrès | 151 | 7.197.741 6 389 69 5 56 | Charles Cognée | 159 |
| 7.154.894 6 348 723 8 26 | Notaire Lepin | 151 | 54 8 7.199.741 87 336 | Rémy Chatenay | 160 |
| 7.157.241 3 3 7 2 | Doyenné Gabriel | 152 | | | |

| Diagnostics | NOMS | Pages | Diagnostics | NOMS | Pages |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------|------------------------------------|-------|
| 4 7.227.836 6 31 5 | Bergamote Fortuné | 160 | 98 7.289.649 6 357 796 | Doyenné Madame Levasseur | 164 |
| 8 7.229.831 4 | Olivier de Serres | 161 | 4 7.289.841 6 | Madame Millet | 165 |
| 86 7 7.243.696 6 359 54 5 4 | Bergamote Espéren ... | 162 | 8 7 7.317.893 6 49 781 5 | Alexandre III | 166 |
| 4 7 7.256.662 6 349 55 | Bergamote Hertrich | 162 | 79 7.321.872 217 78 4 | Bergamote de Parthenay | 166 |
| 7.269.891 36 65 | Broom Parck | 163 | 6 7.359.511 6 21 899 | Passe Crassane | 167 |
| 7.287.83 | Souvenir de Cronstadt | 164 | 4 7.386.883 6 99 9 7 | Souvenir de Pierre Achard | 168 |


Clé pour l'identification des poires

| I MATURITÉ | II RAPPORT HAUTEUR- LARGEUR | III SYMÉTRIE ET CONTOUR | | IV TYPE ET FORME | | V COULEUR | VI PÉDICELLE | VII CHAIR |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 Juillet | 1 Plus haute que large. | Symétrique et à contour | 1 régulièrement arrondi. | Sans ou presque sans cuvette et plus ou moins | 1 Rétrécie vers le pédicelle. | 1 Jaune clair. | 1 Gros, long, implanté droit. | 1 Blanche, tendre, juteuse, sucrée. |
| 2 Fin juillet- Août. | | | 2 irrégulièrement arrondi. | | 2 étranglée | 2 Jaune clair frappé de rouge. | 2 Gros, long, oblique. | 2 Blanche, tendre, peu sucrée. |
| 3 Fin août- Septembre. | | | 3 fortement boussué ou côtelé. | | 3 ovoïde ou arrondie. | 3 Jaune foncé ou citrin frappé de rouge. | 3 Gros, court, droit. | 3 Blanche, peu juteuse |
| 4 Fin septembre octobre. | 2 Plus large que haute. | Légèrement asymétrique et à contour | 4 régulièrement arrondi. | Une cuvette et plus ou moins | 4 rétrécie vers le pédicelle. | 4 Vert jaunâtre sans autre teinte. | 4 Gros, court, oblique. | 4 Blanche, ferme ou croquante. |
| 5 Fin octobre- Nov.-déc. | | | 5 irrégulièrement arrondi. | | 5 étranglée. | 5 Jaune teinté de roux, de gris ou de fauve autour du pédicelle. | 5 Moyen ou grêle, droit. | 5 Verdâtre. |
| 6 Fin décembre- janv.-février. | | | 6 fortement bossué ou côtelé | | 6 ovoïde ou arrondie. | 6 Jaune plus ou moins teinté ou marbré de fauve, de bronzé ou de roux au pourtour. | 6 Moyen ou grêle oblique. | 6 Jaunâtre. |
| 7 Fin fév.-mars- avril | 3 Aussi haute que large. | Symétrique et à contour | 7 régulièrement arrondi. | Deux cuvettes et plus ou moins | 7 Rétrécie vers le pédicelle. | 7 Jaune plus ou moins teinté, tâché, veiné de fauve, de bronzé, de roux ou de gris et frappé de rouge | 7 Charnu, droit. | 7 Saumonée. |
| | 8 irrégulièrement arrondi. | | 8 étranglée | | 8 Bronzée, rouillée ou grise sur fond jaune. | 8 Charnu, oblique. | 8 Musquée. | |
| | 9 fortement bossué ou côtelé | | 9 ovoïde ou arrondie. | | 9 Bronzée, rouillée ou grise et plus ou moins frappée de rouge. | 9 Arqué. | 9 Légèrement âpre. | |

Doyenne de Juillet

Syn. : *Doyenne d'été; Jolimont précoce.*

6 9
1.343.271
1 33
6



Fruit petit, ovoïde, tombant facilement à maturité. Épiderme jaune clair frappé de rouge sombre pointillé de gris. Pédicelle souvent charnu, à fleur de peau au pied d'une légère gibbosité. Œil moyen ouvert ou mi-ouvert. Chair blanche, mi-fondante, légèrement parfumée ; bonne ou assez bonne, mais blettit vite.

Arbre vigoureux sur franc ; assez faible sur cognassier. Rameaux longs brun rougeâtre, lenticelles rondes, grosses, saillantes, peu nombreuses. Feuilles vert gai, ovales-allongées, à pointe recourbée ; pétiole court et rosé ; dents obtuses ou arrondies. Boutons assez gros, aigus.


Variété d'amateur et de marché ; convient pour toutes formes en sol riche, à bonne exposition; à tailler court.

Gentil Bianca

6
2.141.194
72 768


Fruit petit asymétrique, conique tronqué. Épiderme jaune clair, rarement un peu rosé, mi-épais, plaqué, marbré ou pointillé de brun ou de gris brunâtre du côté de l'œil. Pédicelle moyen, plus ou moins fort, arqué, vert clair, presque à fleur de peau, mais plus souvent au pied d'un très léger éperon, dans cuvette petite et plissée. Œil moyen ouvert en étoile presque à fleur du fruit. Chair blanchâtre ou jaunâtre, un peu granuleuse, musquée, ferme ou mi-croquante, juteuse, sucrée. Bonne.

Arbre de moyenne vigueur sur cognassier; très fertile.



Rameaux brun jaunâtre ou rougeâtres ; lenticelles nombreuses, rondes, grisâtres. Yeux gros, coniques écartés. Bouton gros. Feuilles moyennes planes, rudes au toucher, ovales-arrondies ou elliptiques. Dents peu profondes ; pétiole grêle.

Variété d'amateur.



Beurré Giffard

Syn. : *Giffard*.

76
2.141.551
14 29
12

Fruit moyen ou sous-moyen. Épiderme lisse, mince, jaune pâle, verdâtre, grossièrement pointillé, lavé de fauve vers le pédicelle et l'œil et souvent un peu teinté de rose foncé légèrement pruiné. Pédicelle moyen ou assez fort. Œil moyen ou petit, affleurant ou dans cuvette peu profonde, lisse ou plissée. Chair blanche, fondante, juteuse, sucrée, acidulée. Très bonne.

Arbre moyennement vigoureux, un peu divergent, préfère le franc au cognassier, fertile. Rameaux roux brun-clair, assez forts, arqués ; lenticelles petites, peu nombreuses, rondes ; yeux moyens, coniques, mi-appliqués. Feuilles petites, elliptiques-lancéoles, étroites, creusées, peu épaisses ; dents peu accusées. Boutons gros, courts, pointus.

Variété de commerce ; s'accommode des formes à haute tige et plates ; assez sensible à la tavelure ; préfère les sols chauds et fertiles.

Fondante des Emmurés

2.144.296
8 23




Fruit sous-moyen. Épiderme épais, jaune clair, finement pointillé, légèrement lavé ou granité de rose. Pédicelle fort, à fleur de peau, renflé à l'extrémité. Œil moyen ou petit, mi-clos, dans cuvette peu profonde, large, au bord ondulé. Chair blanchâtre ou jaunâtre, ferme, acidulée. Bonne.

Arbre vigoureux sur cognassier, mi-étalé, bien fertile. Rameaux forts, courts, brun jaunâtre. Lenticelles petites, rondes. Yeux gros, mi-détachés. Feuilles moyennes, ovales, aiguës, minces et planes.

Variété pour amateur; s'accommode des formes naines.

Précoce de Trévoux

4 68
2.145.291
2 74




Fruit moyen tombant facilement. Épiderme jaune clair, abondamment pointillé, lavé de fauve autour du pédicelle ; un peu voilé de roux; frappé de rose carminé. Pédicelle gros ou charnu, à fleur de peau. Œil moyen ou assez grand, ouvert, dans cuvette superficielle, sépales parfois charnus. Chair blanche, tendre, juteuse, sucrée, légèrement parfumée. Bonne.

Arbre moyennement vigoureux, mi-étalé ; s'accommode du franc et du cognassier même à haute altitude. Rameaux forts, droits, mi-longs, brun-gris et acajou. Lenticelles peu nombreuses, rondes et mi-allongées. Yeux sous-moyens, courts, pointus, saillants. Boutons petits. Feuilles moyennes ovales-aiguës, épaisses, planes. Dents obtuses et peu profondes.

Variété pour le marché ; se prête à toutes formes en sol riche, à l'abri des vents. Entrecueillir les fruits. Tailler normalement.

Clapp's FavouriteSyn. : *Favorite de Clapp.*

5
42 4
2.151.281
3 94 77
9




Fruits moyens ou surmoyens, isolés. Épiderme mince, jaune clair ou verdâtre légèrement frappé de rose, abondamment pointillé, un peu marbré de fauve vers le pédicelle. Pédicelle gros ou charnu implanté à fleur de peau ou dans très légère cuvette bossuée. Œil moyen mi-clos, affleurant, ou dans cuvette superficielle légèrement plissée ou côtelée. Chair blanche très juteuse, sucrée, parfumée ; blettit vite. Très bonne.

Arbre suffisamment vigoureux, mi-érigé, assez fertile, même à haute altitude. Rameaux gros, rouge-violacé ou brun-rougeâtre. Lenticelles grosses, allongées. Yeux courts, détachés. Feuilles grandes, planes, ovales-allongées, vert foncé, luisantes, épaisses. Dents peu profondes, obtuses. Pétiole long, mince, souvent rosé. Boutons petits, aigus.

Variété de commerce ; pour formes naines en terre saine et fertile ; entrecueillir.

Fin Juillet

2.171.281
3 42 4



Fruit moyen. Épiderme jaune clair ou citrin, légèrement frappé de rose, abondamment pointillé de roux. Pédicelle gros ou fort, implanté à fleur de peau, au pied d'une gibbosité. Œil petit, mi-ouvert dans cuvette nulle ou très faible à bord régulier. Chair blanche, tendre, juteuse, sucrée avec parfois une très légère pointe d'âpreté. Bonne.


Arbre vigoureux, mi-érigé, fertile. Rameaux sous-moyens, longs, rougeâtres, un peu coudés; mérithalles courts. Lenticelles rondes et longues, non saillantes. Yeux courts, mi-appliqués. Boutons petits. Feuilles petites, elliptiques, lisses, vert brillant, creusées en gouttière. Dents peu marquées ; arrondies, pétiole long, grêle.

Variété pour amateur.

Épargne

Syn. : *Grosse Cuisse Dame* ; *d'Épargne* ;
Beau Présent.

82 2
2.171.591
45 769




Fruits moyens ou surmoyens, solitaires. Épiderme mi-épais, jaune-verdâtre taché de fauve, surtout vers le pédicelle ; teinté parfois de rouge. Pédicelle de grosseur moyenne, un peu charnu à la base, au pied d'une légère gibbosité. Œil moyen, mi-ouvert entouré de plis ou de menues bosses, saillant ou affleurant. Chair blanchâtre, mi-fine, mi-fondante ou granulée, juteuse, acidulée, très légèrement âpre. Bonne ou assez bonne. A consommer dès que la teinte verte s'éclaircit ; blettit avant même d'être jaune.

Arbre de vigueur moyenne ou sous-moyenne sur cognassier ; grande sur franc ; port étalé ; très fertile. Rameaux gros, longs, arqués, brun-olivâtre ou violacé. Lenticelles grises, nombreuses, rondes. Yeux courts, peu détachés. Feuilles grandes, ovales-arrondies, rigides, légèrement creusées, bords parfois ondulés, vert foncé luisant. Dents fortes, aiguës ou obtuses. Pétiole fort. Boutons gros, courts.

Variété pour le marché ; toutes formes, surtout haute tige. Sensible à la tavelure.

Wilder



4 4
2.171.771
347 59
8


Fruit moyen, à base aplatie, rétréci mais obtus. Épiderme assez résistant, mi-lisse, jaune assez clair, lavé de fauve autour du pédicelle, abondamment pointillé de brun, surtout vers la base, teinté de rouge sombre, parfois strié de rose. Pédicelle oblique, court, gros ou charnu, dans cuvette peu profonde, étroite ou à peine marquée, mais toujours bosselée ou éperonnée. Œil moyen, affleurant ou dans cuvette très légère et large, rarement plissée ; sépales longs. Chair blanche, mi-fine, serrée, un peu croquante, sucrée, parfumée. Bonne ; à consommer une fois jaune.

Arbre vigoureux même sur cognassier, érigé, de fertilité bonne ou moyenne. Rameaux brun-rougeâtre, mi-longs, assez gros ; mérithalles courts ; lenticelles arrondies, ou ovales. Yeux courts, presque appliqués. Feuilles moyennes, ovales, planes souples à pointe courte assez aiguë. Dents fines, régulières, aiguës. Pétiole court, plutôt grêle. Boutons assez gros, ovoïdes, aigus.

Variété à greffer sur franc pour le plein vent, mais s'accommode du cognassier en petite forme.

Illinka

7
83
2.172.793
355 52
4



Fruits moyens ou sur moyens, isolés ou par 2 ou 3. Épiderme épais vert jaunâtre ou jaune-paille lavé ou non de rose terne avec stries peu visibles ; finement pointillé de roux ou de gris ; bronzé vers le pédicelle. Pédicelle fort, à fleur de peau ou dans cuvette gibbeuse ; au pied d'une petite gibbosité. Œil ouvert ou mi-ouvert, dans cuvette superficielle à peine plissée, parfois bossuée. Chair blanche, ferme, grossière, tend à devenir farineuse. Assez bonne.

Arbre vigoureux, érigé, fertile. Rameaux forts, courts, bruns. Lenticelles grosses, rondes, saillantes. Yeux petits, appliqués. Feuilles grandes, ovales allongées, rigides, vert très foncé, un peu creusées, pointe retournée ; dents arrondies, peu marquées. Variété pour amateur.

Du Canada

2.174.482
15




Fruit sous-moyen ou petit. Épiderme lisse, mince, verdâtre, finement ponctué de fauve. Pédicelle charnu dans cuvette moyennement profonde, large, ou superficielle, à bord lisse. Œil petit, clos ou mi-clos dans cuvette peu profonde. Chair blanche, fondante, acidulée ; blettit vite.

Arbre de vigueur moyenne, mi-érigé, peu fertile. Rameaux gros, demi-longs, brun vineux. Lenticelles nombreuses, rondes ou demi-longues. Yeux petits, détachés. Feuilles grandes, ovales-arrondies, lisses, bords un peu ondulés, vert franc. Dents fines, obtuses. Boutons petits.

Variété pour amateur.

André Desportes

51 5
2.174.761
2 296
5



Fruit moyen ou sous-moyen. Épiderme jaune clair, faiblement taché de fauve vers le pédicelle et ailleurs, nuancé de carmin à l'insolation.


Pédicelle moyen ou court un peu charnu à la base, au pied d'une gibbosité. Œil petit, ouvert ou mi-clos dans cuvette peu profonde, large, parfois plissée ou bossuée. Chair blanchâtre, fine, fondante, sucrée, acidulée. Bonne, mais blettit une fois jaune.

Arbre faible sur cognassier, très fertile. Rameaux mi-courts, assez gros, violet cendré. Lenticelles nombreuses, rondes. Feuilles allongées en gouttière, plissées, vert luisant, Dents fines ou nulles. Boutons gros.

Variété pour amateur et marché. S'accommode surtout du franc et de tous sols.

Lawson

4 4
2.182.291
5 783



Fruit assez gros, asymétrique, bossué au pourtour. Épiderme lisse, mi-épais, jaune citrin, fouetté et strillé d'un beau rouge vif, à l'insolation seulement, un peu voilé de gris brun vers les extrémités, parsemé de menus points peu visibles.

Pédicelle de moyenne longueur, assez gros, arqué ou oblique, un peu charnu à la base, à fleur du fruit, contre un léger éperon. Œil moyen, clos, dans cuvette moyennement profonde, large et irrégulièrement arrondie. Chair blanche, veinée de jaune, tendre, un peu cassante, assez peu juteuse, sucrée. Bonne, mais cotonneuse assez vite. A consommer dès que la teinte jaune est généralisée.

Arbre vigoureux, de fertilité à peine suffisante. Rameaux de grosseur et de longueur moyennes, brun clair. Lenticelles fauves, allongées. Yeux gros, écartés. Bouton court. Feuilles moyennes, rudes au toucher ; dents peu profondes.

Variété d'amateur.

Sainte-Anne

6 2
2.194.596
77 461
4



Fruit moyen. Épiderme vert-jaunâtre ou doré, lisse, pointillé de fauve ou de rougeâtre, légèrement veiné de gris ou de fauve. Pédicelle souvent à fleur de peau ou prolongeant obliquement le fruit ; moyenne gibbosité. Œil petit ou moyen, mi-ouvert, dans cuvette plissée, peu profonde. Chair blanchâtre ou jaunâtre, tendre, mi-sucrée, mi-juteuse, blettissant très vite. Assez bonne.


Arbre vigoureux, érigé, moyennement fertile. Rameaux forts et mi-longs, brun-violacé. Lenticelles rondes, grosses, blanchâtres, abondantes, saillantes. Yeux moyens aigus, légèrement détachés. Feuilles moyennes ou assez grandes, ovales-elliptiques, pointe courte, vert foncé luisant, bord un peu ondulé. Dents aiguës, peu profondes. Boutons courts, coniques.

Variété de marché ou d'amateur ; tous porte-greffes.

Bergamote d'été

Syn. : *Beurré blanc d'été*. *Doyenné doré*.

2.286.241
3 5 9 6



Fruit petit ou sous-moyen à surface bossuée. Épiderme jaune clair frappé de rouge, ponctué de fauve. Pédicelle fort ou gros, oblique, à fleur de peau ou dans légère cuvette plissée. Œil grand, ouvert, dans cuvette peu profonde. Chair blanche, très juteuse, peu parfumée.

Arbre peu vigoureux, mi-érigé, très fertile. Rameaux gros, mi-courts, brun-rosé. Lenticelles très fines, rondes, mi-allongées. Yeux mi-appliqués. Feuilles moyennes, ovales-elliptiques, lisses, convexes ou retournées à l'extrémité ; dents peu marquées. Boutons gros, courts, marron.

Variété pour amateur.

De l'Assomption

Syn. : *Beurré de l'Assomption*.

3.117.671
7



Fruit gros, tombant facilement. Épiderme un peu rude, jaune clair ou jaune-verdâtre, ponctué, granité de roux. Pédicelle charnu, droit, dans cuvette étroite et bossuée. Œil grand, ouvert, dans cuvette profonde, large, entourée de bosses. Chair blanchâtre très juteuse, tendre, sucrée, légèrement parfumée. Bonne.


Arbre de vigueur moyenne, érigé, moyennement fertile, toujours faible sur cognassier. Rameaux gros, demi-courts. Lenticelles grosses, rondes, grises, peu nombreuses, saillantes. Yeux petits aigus, mi-détachés absents à la base. Feuilles assez grandes, elliptiques, lisses, presque planes, à peine

arquées, très coriaces, Pétiole long, gros. Boutons gros, courts, foncés.

Variété d'amateur ; à conduire en fuseau ou en espalier, greffé sur franc ; à tailler assez court.

Prince Impérial

6
3.141.243
4 76



Fruit sous-moyen ou petit. Épiderme jaune clair ou citrin, parfois lavé et veiné de rose et de rouge, ponctué de gris foncé. Pédicelle fort, parfois avec verrues, à fleur de peau. Œil assez grand, mi-ouvert, dans cuvette superficielle, lisse. Chair blanche, serrée, juteuse.


Arbre de vigueur moyenne, à greffer sur franc ; fertile. Rameaux forts, demi-longs peu nombreux, brun-clair. Lenticelles peu nombreuses, rondes. Yeux petits, appliqués. Feuilles étroites allongées-lancéolées, légèrement creusées. Dents obtuses. Boutons petits.

Variété pour amateur ; à conduire à haute ou basse tige.

Belle de Bruxelles

Syn. : *Sans pépins*.

86
3.141.591
374 24



Fruit gros ou surmoyen. Épiderme jaune citrin, parfois veiné de rose, teinté de fauve autour du pédicelle, recouvert de petits points bruns. Pédicelle arqué, assez long, renflé aux extrémités, à fleur de peau. Œil grand, ouvert, dans cuvette peu profonde, large, plissée. Chair blanche.

VERCIER. - *Comment reconnaître les fruits.*


Arbre vigoureux. Rameaux gros, brun verdâtre. Lenticelles rondes, assez nombreuses, mi-saillantes. Yeux petits, appliqués. Feuilles moyennes, lancéolées, légèrement creuses ou arquées, vert-foncé brillant. Dents fines. Boutons aigus, courts.

Variété pour amateur.

Madame Treyve

Syn.: *Souvenir de Madame Treyve*.

4
85 3
3.141.691
52 74
3



Fruit surmoyen. Épiderme presque lisse, brillant, jaune clair, recouvert de fauve y compris vers le pédicelle et l'œil, ponctué de brun foncé. Pédicelle mi-court, fort, renflé à l'extrémité dans cuvette nulle ou superficielle, à bord ondulé ou gibbeux. Œil assez grand ou moyen, mi-ouvert ou mi-clos, sépales développés dans cuvette large plus ou moins profonde. Chair blanche, fondante, juteuse, sucrée et parfumée. Très bonne.

Arbre peu vigoureux sur cognassier, préfère les situations chaudes, très fertile. Rameaux jaunâtres, forts. Lenticelles allongées, peu nombreuses. Yeux moyens, aigus, mi-appliqués. Feuilles ovales aiguës, sous-moyennes, un peu creusées, vert foncé brillant, mi-épaisses. Dents peu profondes, aiguës. Boutons moyens, aigus. Fleurs grandes.

Variété d'amateur; à greffer sur cognassier pour espalier et cordon ; sur franc pour pyramides et hautes tiges. Tailler court.

Rousselet de Reims

Syn. : *Petit Rousselet* ; *Perdreau musqué*.

3.141.998

7 6



Fruit petit. Épiderme mi-épais, lisse, jaune pâle et terne, ponctué et granité de gris, abondamment teinté rouge brun. Pédicelle mince, à fleur de peau. Œil assez grand, ouvert, à fleur de fruit. Chair blanc-jaunâtre, sucrée, mi-fine, un peu musquée. Bonne.

Arbre vigoureux, mi-érigé, assez fertile. Rameaux brun clair et brun foncé violacé. Lenticelles petites ; rondes. Yeux petits, courts, appliqués. Boutons petits, allongés. Feuilles moyennes assez larges, épaisses, vert foncé, gaufrées puis convexes. Dents fines, peu profondes, obtuses.

Variété d'industrie, pour confiserie et cuisson ; pour plein vent ; résiste à la tavelure ; s'accommode d'un sol médiocre et de la montagne.

Monsallard

Syn. : *Epine fondante*.

7 6
3.142.291

14 126


1



Fruit moyen. Épiderme jaune presque citrin, lisse, pointillé de roux. Pédicelle, assez long, fort, à fleur de peau ou dans cuvette large et superficielle. Œil moyen, mi-ouvert dans cuvette large et superficielle à bord régulier. Chair blanc-jaunâtre acidulée. Bonne.

Arbre vigoureux, mi-érigé, fertile. Rameaux forts, assez longs, brun foncé. Lenticelles rondes, petites, peu nombreuses, blanchâtres. Yeux petits, pointus. Feuilles grandes, ovales-arrondies, un peu arquées, vert-clair, non parcheminées ; dents arrondies ; boutons petits.

Variété d'amateur.




Docteur Jules Guyot

8 59
3.167.341
2 82 133

Fruits gros ou très gros, attachés par 1, 2 ou 3. Épiderme jaune citrin, abondamment et finement ponctué de roux, souvent teinté rose. Pédicelle mi-court, fort, oblique au pied d'un éperon plus ou moins accusé, dans cuvette peu profonde. Œil moyen, mi-ouvert dans légère cuvette bossuée ou plissée. Chair blanche, fondante, sucrée, très juteuse. Très bonne.

Arbre de vigueur modérée sur cognassier ; port érigé ; très fertile. Rameaux brun-rouge. Lenticelles nombreuses, rondes et allongées. Yeux courts, plats, mi-appliqués. Feuilles moyennes, elliptiques, rigides. Boutons moyens, allongés, aigus.

Variété d'amateur et de marché ; à cultiver en petites formes, sur cognassier ; à tailler court. Mi-résistant à la tavelure.



Bon Chrétien Williams

Syn. : *Williams* ; *Bartlett de Boston*.

8 9
3.168.541
2 35 788

Fruits gros, isolés ou par deux. Épiderme lisse, jaune doré, maculé de fauve vers le pédicelle, légèrement rosé à l'insolation. Pédicelle fort, mi-court, à fleur de peau ou dans cuvette peu profonde, étroite, bossuée. Œil moyen ou assez grand, mi-ouvert, dans cuvette peu profonde ou superficielle. Chair blanche, fine, fondante, sucrée, musquée. Très bonne.


Arbre de vigueur modérée, érigé, régulièrement et très fertile. Rameaux gros, mi-courts, fauve-clair. Lenticelles rondes, parfois elliptiques, grises. Yeux moyens, peu écartés, coniques. Feuilles moyennes elliptiques-aiguës, creusées, vert-clair. Dents peu profondes, obtuses. Boutons moyens, ovoïdes. Fleurs petites.

Variété de commerce et d'industrie. S'accommode surtout d'un sol riche, frais, du cognassier ou du franc. Toutes formes. Exposition Est et Sud-Ouest. Tailler court. Un peu sujette à la tavelure.

Bonne d'Ezée

Syn. : *Bonne des Haies*.


8
3.171.621
4 42 9



Fruit gros. Épiderme épais, parcheminé, jaune abondamment bronzé. Pédicelle gros à l'extrémité, avec quelques verrues. Œil petit, ouvert ou mi-ouvert, dans cuvette superficielle à bord régulier, lisse. Chair blanche, acidulée, fondante. Assez bonne.

Arbre de vigueur suffisante, mi-érigé, très fertile. Rameaux assez gros, courts, brun-jaunâtre. Lenticelles petites, rondes, parfois transversales. Yeux gros, pointus, détachés. Feuilles moyennes, elliptiques, en forme de gouttière, plissées, peu épaisses, vert franc ; dents peu profondes, obtuses ou arrondies. Boutons moyens, allongés.

Variété d'amateur.



Beurré d'Amanlis


Syn. : *Amanlis*; *de Thiessé*.

8
3.175.691
44 6

Fruit, moyen. Épiderme mince, lisse, jaune-verdâtre, ponctué abondamment et parfois marbré de fauve : quelquefois lavé de rouge sombre. Pédicelle mince, un peu renflé aux extrémités, dans cuvette petite, étroite, bossuée. Œil moyen, mi-ouvert, dans cuvette peu profonde, étroite. Chair blanche ou blanchâtre, fondante, juteuse, sucrée, légèrement âpre. Bonne, mais blettit hâtivement.

Arbre vigoureux, érigé, fertile. Rameaux gros, longs, arqués, brun-rougeâtre-violacé. Lenticelles grosses, rondes, blanches, rarement elliptiques. Yeux courts, petits, légèrement détachés. Feuilles moyennes ou surmoyennes, elliptiques, vert gai, à pointe fine, bord un peu ondulé. Dents aiguës et fines. Boutons assez gros, courts, arrondis. Fleurs grandes.

Variété d'amateur et de marché ; pour haute tige ; toutes altitudes. Entrecueillir les fruits. Sensible à la tavelure.



Souvenir du Congrès

1 7
3.182.841
4 5 568
4

Fruit surmoyen ou gros, asymétrique et bosselé. Épiderme jaune doré, finement pointillé de roux, abondamment bronzé autour du pédicelle, parfois légèrement rosé. Pédicelle gros, tantôt affleurant, tantôt dans une petite cuvette bossuée ou gibbeuse. Œil moyen ou petit, rarement


assez grand, ouvert, dans cuvette peu profonde, large, à bord ondulé, côtelé ou plissé. Chair blanc-jaunâtre, juteuse, fondante, sucrée, légèrement musquée. Bonne.

Arbre assez vigoureux, érigé, de fertilité moyenne ou bonne. Rameaux longs et forts, brun clair. Lenticelles rondes et ovales. Yeux courts et appliqués. Feuilles petites, ovales, minces, rudes, un peu creusées, vert franc. Dents peu profondes, obtuses. Boutons petits.

Variété pour amateur. Petites formes de préférence.

Triomphe de Vienne


41 74
3.195.891
4 82 66
8 5



Fruits gros, asymétriques, ventru vers la base, à surface bossuée, attachés par 1 et 2. Épiderme jaune citrin ou paille ; abondamment lavé et marbré de brun et ponctué régulièrement ; parfois légèrement rosé à l'insolation. Pédicelle fort, ou mi-grêle long, oblique un peu arqué, renflé à l'extrémité, parfois charnus, dans cuvette étroite, bossuée ou gibbeuse. Œil moyen, sépales un peu charnus, entrouvert dans cuvette large, moyennement profonde. Chair blanche, ou blanchâtre, fine, juteuse, sucrée, parfumée. Très bonne ou bonne. Blettit rapidement.

Arbre assez peu vigoureux, érigé, très fertile. Rameaux gros, mi-courts, brun-jaunâtre. Lenticelles allongées, jaunât. Yeux gros, pointus. Feuilles grandes, ovales-allongées, épaisses, un peu arquées et creusées, vert franc. Boutons moyens, allongés. Fleurs grandes, en coupe, demi-hâtives.

Variété de commerce et d'exportation ; cueillir de bonne heure ; sol léger, riche. Greffer sur cognassier ; tailler court. Résistante à la tavelure.



Doyenné de Mérode


Syn. : *Beurré Bousso* ; *Double Philippe*.

59
3.346.783
159 64
7

Fruit moyen ou surmoyen. Épiderme épais, jaune doré, finement et abondamment pointillé, taché de gris fauve vers le pédicelle, teinté rouge sombre. Pédicelle gros aux extrémités dans cuvette peu profonde, large, à bord accidenté. Œil moyen, ouvert ou mi-clos dans cuvette à bord ondulé. Chair blanche, mi-tendre, parfois farineuse ; blettit très vite. Assez bonne.

Arbre vigoureux, mi-étalé, fertile. Rameaux gros, assez longs, un peu arqués et coudés, brun-rougeâtre. Lenticelles peu nombreuses, rondes, grosses, saillantes. Yeux coniques, détachés. Feuilles grandes, ovales-allongées, planes, un peu plissées, parcheminées, vert-foncé. Dents obtuses ou aiguës. Boutons sous-moyens.

Variété d'amateur ; pour hautes et basses tiges.



Beurré Capiaumont

Syn. : *Beurré Aurore* ; *Beurré de la Glacière*.

3
4.141.993
5 2 825


Fruit moyen. Épiderme rugueux, jaune clair, abondamment bronzé et finement pointillé blanchâtre. Pédicelle charnu, à fleur de peau, gros à l'extrémité. Œil ouvert, assez grand, dans cuvette superficielle. Chair blanche, veinée de verdâtre autour des loges, un peu granuleuse, juteuse, sucrée, acidulée parfumée, mi-fine. Bonne.

Arbre de vigueur suffisante, mi-érigé, fertile. Rameaux moyens, demi-longs, violacés. Lenticelles rondes, nombreuses. Yeux petits, appliqués. Feuilles assez grandes, elliptiques, creusées et légèrement arquées, rigides. Dents bien marquées, obtuses. Boutons moyens.

Variété d'amateur, de commerce et d'industrie. (Conserves au sirop, séchage). A greffer sur cognassier. Petites formes de préférence.

Comte de Chambord


1 1
4.142.291
74 5



Fruit moyen. Épiderme jaune clair tigré de fauve, lisse. Pédicelle grêle, arqué, au pied d'une gibbosité. Œil moyen, ou sous-moyen, entrouvert, dans cuvette superficielle à bord régulier, un peu plissé. Chair blanche ou blanc-verdâtre, mi-ferme, juteuse.

Arbre de vigueur modérée, mi-étalé, fertile. Rameaux moyens, assez courts, bruns. Yeux ovoïdes, appliqués. Lenticelles peu nombreuses, rondes, ou demi-allongées. Feuilles ovales, minces, étalées, vert-clair. Dents obtuses. Boutons gros, marron.

Variété pour amateur.



Louise bonne d'Avranches


Syn. : *Bonne Louise* ; *Louise bonne de Jersey*.

5
4.142.361
51 9

Fruit moyen. Épiderme jaune citrin, frappé de rouge très vif, ponctué de gros et nombreux points rouges ou verdâtres. Pédicelle de longueur moyenne oblique, contourné, à fleur de fruit. Œil moyen ou petit, mi-ouvert dans cuvette unie ou légèrement ondulée. Chair blanche, très juteuse, sucrée, fine, fondante, très parfumée. Très bonne.

Arbre moyennement vigoureux; port érigé ; régulièrement, et très fertile. Rameaux brun rougeâtre, droits. Lenticelles petites, rondes, assez apparentes, grises. Yeux petits, coniques, appliqués. Feuilles moyennes, elliptiques ou oblongues, creusées en gouttière et arquées. Dents obtuses ou arrondies. Boutons, petits, effilés.

Variété de commerce et d'exportation. Très sensible à la tavelure. Tous porte-greffes, mais préfère le franc. Toutes formes. Surtout le contre-espalier et la demi-tige. Sol sain et bien exposé.



Favorite Morel

81 8
4.142.591
15 66
8

Fruits gros. Épiderme mince, un peu rude, jaune-blanchâtre, lavé de roux autour du pédicelle, fortement pointillé, presque voilé de roux. Pédicelle fort, court, à fleur de peau ou dans

légère cuvette, étroite et fortement bossuée. Œil moyen ou petit, fermé, dans cuvette peu profonde et étroite. Sépales charnus. Chair blanche, serrée, sucrée, juteuse, fondante, parfumée. Bonne.

Arbre vigoureux sur cognassier; érigé, fertile. Rameaux moyens, rougeâtres, droits. Lenticelles longues ou rondes, gris rosé. Yeux petits, appliqués. Feuilles assez grandes, elliptiques, planes, non parcheminées, vert clair. Boutons moyens, minces.

Variété pour amateur.

Saint-Nicolas

Syn. : *Sucré vert d'automne*.

4.142.593
266



Fruits moyens. Épiderme jaune, finement pointillé, lavé de fauve autour du pédicelle. Pédicelle gros, arqué, renflé à son extrémité. Chair très juteuse, parfumée, mais blettit vite.


Arbre peu vigoureux, fertile ou très fertile. Rameaux forts et mi-courts, brun clair ou brun rosé. Lenticelles rondes ou légèrement allongées, blanchâtres, grosses. Yeux moyens, pointus, détachés. Feuilles petites, elliptiques, presque planes, lisses, à pointe recourbée ; dents arrondies. Boutons moyens, effilés.

Variété d'amateur.

Conseiller à la Cour

Syn. : *Maréchal de la Cour*; *Duc d'Orléans*.

81 8
4.142.661
5 75 89
4



Fruits surmoyens. Épiderme rugueux, jaune clair plus ou moins


recouvert de rouille. Pédicelle mi-fort dans cuvette nulle ou très peu profonde. Œil grand ou moyen, ouvert ; sépales un peu charnus dans cuvette peu profonde, large, à bord ondulé et régulier. Chair blanche, fine, sucrée, parfumée, juteuse, acidulée, légèrement granuleuse au centre ; très bonne. Arbre vigoureux, fertile. Rameaux assez forts, brun clair. Lenticelles saillantes, grosses, rondes ou ovales. Yeux allongés aigus, mi-appliqués. Feuilles moyennes ou assez grosses, ovales-arrondies, étalées, plissées, mi-parcheminées. Dents peu profondes, aiguës. Boutons moyens, effilés. Fleurs grandes, mi-hâtives. Variété pour amateur. Assez résistante à la tavelure.

Beurré d'Angleterre

Syn. : *Bec d'oie*; *De Finois*; *Gisambert*.

4.142.691

351 74



Fruits moyens tombant facilement. Épiderme jaune verdâtre entièrement pointillé, taché et marbré de roux, lavé de fauve autour du pédicelle. Pédicelle à fleur de fruit ou le prolongeant. Œil petit, ouvert, affleurant. Chair blanche, mi-ferme, très sucrée, granuleuse au centre ; blettit très vite.

Arbre vigoureux, érigé, très fertile. Rameaux brun rougeâtre. Lenticelles rondes, assez nombreuses. Yeux coniques, plutôt appliqués. Feuilles petites ou moyennes, elliptiques, coriaces, vert gai, luisantes, un peu creusées et arquées ; dents arrondies ; boutons gros, pointus, marron.

Variété d'industrie pour conserves, confitures et confiserie ; tous porte-greffes ; de préférence, la haute tige.


Président Roosevelt

6
4.144.291
13

Fruits gros ou très gros. Épiderme lisse, parcheminé, jaune clair, frappé de rose vif ou de rouge-brique ; assez abondamment et grossièrement ponctué de fauve. Pédicelle fort, gros à son extrémité, dans cuvette très faible ou éperonnée. Œil sous-moyen, mi-clos, dans cuvette presque nulle, à bord légèrement ondulé. Chair blanche, serrée sans être ferme, peu juteuse ; légèrement parfumée avec une pointe d'âpreté. Assez bonne.

Arbre de bonne vigueur sur cognassier, fertile. Rameaux assez courts, brun légèrement rougeâtre. Lenticelles abondantes, petites, allongées ou rondes, jaunes. Yeux pointus, un peu écartés. Feuilles petites, elliptiques-allongées, lisses. Dents à peine marquées. Boutons gros, allongés.


Variété d'apparat et de commerce.

**William-Duchesse**

Syn. : *Pitmaston-Duchesse*.

6
4.145.591
5 5 82


Fruits gros ou très gros, un peu bosselés, isolés ou par 2. Épiderme lisse, mince, jaune citrin clair, assez régulièrement pointillé de roux, lavé de marron vers le pédicelle. Pédicelle gros ou charnu, dans cuvette très superficielle, bossuée gibbeuse.



Œil moyen, ouvert ou mi-clos, dans cuvette peu profonde, étroite, bossuée ; sépales charnus. Chair blanche, fondante, parfumée, peu sucrée. Bonne.

Arbre vigoureux, moyennement fertile. Rameaux mi-forts, brun rougeâtre. Lenticelles rondes ou allongées, grises. Yeux coniques, aigus, détachés. Feuilles petites ou moyennes, ovales-elliptiques, planes ou creusées, arquées, épaisses, vert franc, luisantes. Dents aiguës, obtuses. Pétiole court et grêle. Boutons gros, coniques-aigus, brun foncé.

Variété d'amateur et d'apparat. A greffer sur cognassier. A cultiver en formes naines.



Fondante Thirriot

3 6
4.147.291
5 3 4 74
1

Fruits gros. Épiderme rugueux, jaune citrin finement pointillé de brun et lavé rose vif ; parfois un peu marbré fauve. Pédicelle fort, renflé aux extrémités, dans cuvette peu profonde ou nulle, plissée ou mamelonnée. Œil petit, ouvert, dans cuvette peu profonde, évasée, à bord presque uni. Chair blanche, juteuse, légèrement parfumée, sucrée, acidulée un peu musquée ; très bonne.

Arbre de vigueur modérée, bien fertile. Rameaux forts, longs, brun jaunâtre. Lenticelles assez nombreuses, petites, rondes, jaunes. Yeux gros, coniques, écartés. Feuilles moyennes, ovales, un peu creusées, vert clair, mi-rigides. Dents peu marquées. Boutons assez gros, brun clair.

Variété d'amateur et de commerce ; assez résistante à la tavelure ; à greffer de préférence sur franc.

Duchesse panachée


4.147.321

5

Fruits gros. Épiderme rude, jaune citrin teinté de rose à l'insolation avec parfois de larges bandes longitudinales jaune clair, et quelques marbrures ailleurs qu'autour du pédicelle ; fortement pointillé sur toute sa surface. Pédicelle fort, renflé à son extrémité, dans cuvette peu profonde, bossuée. Œil moyen, mi-ouvert dans cuvette moyennement profonde, large, à bord bosselé. Chair blanche, juteuse, sucrée, très bonne.

Arbre de vigueur moyenne, bien fertile. Rameaux moyens, parfois panachés, rougeâtres aux extrémités. Lenticelles blanches, allongées, mi-nombreuses. Yeux coniques, détachés. Feuilles moyennes, elliptiques, souples, un peu creusées. Dents aiguës, peu visibles.

Variété d'amateur ; à cultiver en petite ou moyenne forme. Sensible à la tavelure.

**Nouveau Poiteau**


Syn. : *Retour de Rome*.

4 7 2

4.152.891


5 45 685

Fruits surmoyens. Épiderme vert jaunâtre, abondamment et finement pointillé de blanchâtre ; peu ou assez fortement taché de gris-brun sur des points différents. Pédicelle long, fort, charnu à sa base, dans cuvette peu profonde souvent inexistante, bossuée. Œil ouvert, dans cuvette étroite et peu profonde. Chair blanc-verdâtre, vineuse, juteuse ; blettit vite. Bonne.



Arbre vigoureux, fertile, érigé. Rameaux vert jaunâtre, assez forts. Lenticelles arrondies, assez nombreuses, jaunâtres. Yeux petits, appliqués. Feuilles grandes, elliptiques, vert clair luisant, un peu creusées. Dents très fines, aiguës. Pétiole long.

Variété d'amateur ; pour toutes formes.



Beurré Durondeau

Syn. : *De Tongre; Durondeau.*

1 4
4.152.991
5 45 824

Fruits gros, ordinairement réunis par 2. Épiderme bronzé, cuivré ou rougeâtre à l'insolation. Pédicelle fort prolongeant le fruit ou inséré dans cuvette nulle ou petite, très étroite, bossuée. Œil moyen, ouvert ou mi-clos, dans cuvette peu profonde, large, ondulée. Chair blanchâtre, mi-fondante, juteuse, sucrée, parfumée. Bonne.

Arbre vigoureux, assez fertile. Rameaux moyens, bruns ou brun violacé ; lenticelles blanc-grisâtre. Yeux petits, détachés. Feuilles moyennes, épaisses, un peu creusées ; boutons moyens, allongés, aigus.


Variété d'amateur et de commerce.

Bonne variété pour la montagne.

Fondante des Bois

Syn. : *Beurré Davy* ; *Beurré Spence* ; *Belle de Flandres* ; *Impératrice de France*.

18 93
4.154.791
66 655




Fruit gros, ordinairement solitaire. Épiderme mince, jaune ou jaune verdâtre, plaqué ou marbré et pointillé de brun et de vert, lavé de rose à l'insolation. Pédicelle charnu à son extrémité, dans cuvette moyennement profonde à bord régulier. Œil moyen, mi-ouvert, dans cuvette superficielle ou peu profonde, étroite. Chair blanc-verdâtre, très juteuse, sucrée, très parfumée, très bonne.

Arbre vigoureux sur cognassier, fertile. Rameaux longs, de moyenne force, brun violacé ; lenticelles nombreuses rondes ou elliptiques, non saillantes. Yeux allongés, très saillants. Feuilles moyennes elliptiques, lisses, peu épaisses. Dents fines. Boutons allongés. Fleurs moyennes, tardives.

Variété pour amateur. Sensible à la tavelure.

Beurré Fouqueray

16 17
4.155.244
67 798
8 6



Fruit surmoyen. Épiderme mince, lisse, jaune, avec quelques marbrures fauves, y compris autour du pédicelle. Pédicelle charnu, à fleur de peau. Œil moyen, entr'ouvert, dans cuvette moyennement profonde, à bord bosselé. Chair blanchâtre assez ferme, musquée, mi-grossière, graveleuse au centre, juteuse, peu sucrée. Bonne.


Arbre de vigueur moyenne sur cognassier, assez fertile

Vercier. — *Comment reconnaître les fruits.*

5

Rameaux gros et courts, verdâtres. Lenticelles moyennement nombreuses, petites, rondes. Feuilles moyennes, elliptiques, planes, vert clair, mi-rigides. Boutons gros, allongés.

Variété pour amateur ; craint la tavelure.




Prémices d'Ecully

69 8
4.155.798
98 64

Fruit assez gros. Épiderme jaune clair, taché de gris y compris vers le pédicelle, pointillé de brun-verdâtre, lavé de rose à l'insolation. Pédicelle charnu dans cuvette presque nulle. Œil petit, mi-clos, dans cuvette peu profonde et très large. Chair blanche, juteuse, sucrée, légèrement musquée, très bonne.

Arbre vigoureux, érigé, moyennement fertile. Rameaux moyens, brun-jaunâtre. Lenticelles nombreuses rondes et jaunes. Yeux courts, coniques, légèrement détachés. Feuilles moyennes, ovales-arrondies, planes, vert clair. Dents arrondies, peu marquées. Boutons moyens, effilés.

Variété d'amateur.



Belle Guérandaise

83 6
4.159.631
5 67 72
45 9

Fruit gros. Épiderme mince et parcheminé, lisse, jaune clair, finement pointillé de roux, et marbré de fauve, rose à l'insolation. Pédicelle fort, gros à son extrémité, dans cuvette large, peu profonde. Œil moyen, ouvert, dans cuvette évasée et ondulée. Chair blanche, ferme, cassante, juteuse.


Arbre vigoureux, mi-érigé, moyennement fertile. Rameaux moyens, olivâtres. Lenticelles peu nombreuses, petites, jaunâtres. Yeux courts, coniques, détachés. Feuilles petites, ovales, lisses, peu épaisses, un peu arquées. Dents obtuses, à peine marquées. Boutons petits, marron.

Variété pour amateur ; résiste à la tavelure.

Baronne de Mello

Syn. : *Beurré Van Mons* ; *Cannelle de Van Mons* ; *His*.


98
4.161.861
5 14 55



Fruits moyens, attachés isolément ou par 2 et 3. Épiderme rude, jaune presque entièrement bronzé. Pédicelle fort prolongeant le fruit. Œil moyen, ouvert dans faible cuvette plissée. Chair blanche-verdâtre, tendre, sucrée, parfumée et légèrement musquée. Très bonne.

Arbre moyennement vigoureux, érigé, fertile. Rameaux assez courts, allongés, rougeâtres. Lenticelles petite, nombreuses, rondes. Yeux gros, pointus, légèrement détachés. Feuilles moyennes, elliptiques, lisses ou ondulées, épaisses. Dents obtuses. Boutons gros, pointus, marron.

Variété pour amateur.



Alexandrine Douillard


Syn. : *P. Douillard*.

9 8
4.165.791
5 54 26

Fruits moyens. Épiderme jaune clair, mince, lisse, légèrement marbré de fauve et teinté de rose. Pédicelle fin, dans cuvette très réduite, côtelée ou gibbeuse, tachée de fauve. Œil petit, clos ou mi-clos, dans cuvette large, peu profonde, côtelée. Chair blanche, fine, sucrée, juteuse, parfumée, blettissant vite. Bonne.

Arbre de vigueur moyenne, très fertile, mais alternant. Rameaux longs, brun-jaunâtre. Lenticelles nombreuses, rondes, petites, blanches. Yeux gros, courts, mi-écartés. Feuilles petites, planes, vert-clair. Dents peu profondes, arrondies.

Variété d'amateur et de commerce ; pour petites formes. A cueillir avant maturité. Tous porte-greffes. Exposition Est, à l'abri des vents. Tailler court. Résiste à la tavelure.



Beurré Hardy

Syn.: *Hardy*.

86 7
4.171.861
43 94


Fruits moyens ou surmoyens. Épiderme assez rude, mince, jaune verdâtre, rouillé, frappé ou non de rougeâtre. Pédicelle fort, à fleur de peau. Œil moyen, ouvert, dans cuvette très peu profonde, à bord ondulé. Chair blanche, sucrée, fondante. Très bonne. Arbre très vigoureux, érigé, très fertile. Rameaux forts, assez courts, brun verdâtre ou rouge verdâtre. Méritailles

courts. Lenticelles nombreuses, grosses, allongées, blanches. Yeux gros, un peu écartés. Feuilles épaisses, elliptiques-allongées, luisantes, creusées et arquées. Dents larges, peu marquées.

Variété de commerce et d'amateur. Réussit en tous terrains, même en montagne. Toutes formes et tous porte-greffes. Assez résistant à la tavelure.

Conférence


8
4.172.667
5 45 791



Fruits moyens, souvent réunis par 2 ou 3. Épiderme épais, jaune citrin, pointillé de vert, abondamment rouillé ou bronzé dans la moitié inférieure comme au sommet, frappé ou non de rouge. Pédicelle moyen, à fleur de peau, appuyé d'une très légère gibbosité, renflé à l'extrémité. Œil moyen, mi-clos, dans cuvette peu profonde, étroite, peu ou pas ondulée. Chair blanchâtre ou jaunâtre, parfois un peu saumonée, fondante légèrement parfumée, acidulée, juteuse, sucrée. Assez bonne ou bonne, mais blettit assez vite.

Arbre de vigueur modérée, érigé, moyennement fertile. Rameaux longs, brun-jaunâtre ou verdâtre. Lenticelles peu nombreuses, petites, rondes ou allongées, blanc-grisâtre. Yeux petits, coniques, écartés. Feuilles assez grandes, ovales, lisses, vert franc, luisantes, un peu arquées et creusées. Dents mi-aiguës. Boutons moyens, allongés. Fleurs moyennes en forme de coupe, hâtives.

Variété d'amateur ; pour petites formes.



Van Marum


Syn. : *Calebasse monstrueuse* ; *Calebasse du Nord* ; *Calebasse royale*.

5 9
4.172.886
5 8 69

Fruit gros, généralement éperonnée. Épiderme mi-rugueux, jaune foncé, plus ou moins abondamment taché et marbré de fauve y compris la base du pédicelle ; pointillé de roux. Pédicelle gros ou charnu, presque à fleur de peau. Œil petit, mi-ouvert, dans cuvette peu profonde, large, à peine ondulée. Chair jaunâtre acidulée. Bonne, cuite.

Arbre de vigueur moyenne, fertilité suffisante. Rameaux de grosseur et longueur moyennes, brun-grisâtre. Lenticelle, peu nombreuses, petites, rondes. Yeux courts, coniques, écartés. Feuilles moyennes, ovales-elliptiques, vert-franc, luisantes, lisses, étalées. Dents obtuses. Boutons petits, allongés.

Variété pour amateur.



Princesse

Syn. : *Pucelle de Saintonge* ; *Muscat Robert*.

5 7
4.174.294
51 661
8

Fruits gros ou surmoyens. Épiderme marbré de fauve et lavé de même autour du pédicelle, recouvert de petits points bruns ; souvent teinté de rose. Pédicelle fort ou charnu, oblique, implanté à fleur de peau ou dans une faible dépression avec

éperon d'un côté. Œil moyen, mi-ouvert, dans cuvette peu profonde à bord ondulé ou finement côtelé. Chair blanche, mi-fine, juteuse, sucrée, parfumée. Bonne.

Arbre de vigueur moyenne et de fertilité suffisante. Rameaux menus, rougeâtres, à lenticelles petites. Yeux moyens, appliqués. Feuilles petites, elliptiques, vert foncé ou luisant. Dents profondes.

Variété pour amateur ; à cultiver en moyennes formes ; à surgreffer si possible. Craint la tavelure.

Pierre Tourasse


4.174.896

41 6

Fruit moyen. Épiderme fin, lisse, jaune-citrin, parfois doré, entièrement pointillé et parfois marbré de roux, largement lavé de fauve vers le pédicelle, rarement nuancé de Saumon. Pédicelle gros, oblique, dans cuvette superficielle. Œil moyen, mi-clos, parfois saillant ou dans cuvette superficielle large, à peine plissée ; sépales charnus à la base. Chair blanc-jaunâtre. Bonne.

Arbre de vigueur modérée, peu fertile. Rameaux brun-rosé ou brun-jaunâtre. Lenticelles peu nombreuses, blanches, rondes ou longues. Yeux pointus et détachés. Feuilles moyennes, ovales arrondies, luisantes, vert franc, parcheminées. Dents fines, obtuses, peu profondes. Boutons petits, coniques.

Variété d'amateur.



Beurré Dumortier


Syn. : *Fondante de Tirlemont*.

4
4.177.746
5 84 6

Fruit assez gros. Épiderme lisse, jaune doré, entièrement couvert de petits points fauves et marbré de même ; ton plus chaud à l'insolation. Pédicelle gros, court, renflé à l'extrémité, à fleur de peau ou dans étroite cuvette. Œil moyen, ouvert dans cuvette peu profonde, large, ondulée. Chair blanche ou blanchâtre, ferme, juteuse, parfumée ; très bonne.

Arbre assez vigoureux, mi-érigé. Rameaux forts, brun-clair; mérithalles courts. Yeux écartés. Feuilles moyennes, ovales-lancéolées, vert-franc, luisantes. Dents peu marquées, fines, aiguës. Boutons minces, allongés.

Variété pour amateur.

Grosse Louise

Syn. : *Louise bonne Butin*.

4
4.181.681
77 59

Fruit gros, rétréci plutôt qu'étranglé. Épiderme lisse, mi-mince, jaune-paille, abondamment pointillé de roux, un peu marbré ou taché de roux vers les extrémités et au pourtour. Pédicelle charnu, oblique, dans petite cuvette. Œil moyen ou grand, ouvert, dans cuvette très peu profonde ou moyennement profonde, large, à bord uni ou ondulé. Chair blanche, mi-fine, mi-fondante, non graveleuse, sucrée, parfumée ; bonne.


Arbre vigoureux fertile. Rameaux nombreux, érigés, assez gros, courts, brun grisâtre. Lenticelles fines, peu nombreuses. Yeux moyens ou assez gros, ovoïdes, détachés. Feuilles grandes, nombreuses, ovales, aux dents bien marquées ; pétiole fort, court.

Variété pour amateur.

Beurré Gris

Syn. : *Beurré doré* ; *Beurré roux* ; *Beurré d'Automne* ; *Beurré d'Amboise* ; *Beurré d'Isembart*.

4 67
4.181.841
5 376 99



Fruit moyen. Épiderme lisse, mince, jaune doré ou foncé granité ou marbré de gris fauve à l'ombre, marbré roux ou rose à l'insolation et autour du pédicelle. Pédicelle fort, charnu à son extrémité dans cuvette presque inexistante. Œil moyen, ouvert, dans cuvette très superficielle à surface plissée ou dans cuvette étroite et bossuée. Chair blanche, acidulée, sucrée, très juteuse, agréablement parfumée, parfois un peu âpre. Très bonne.


Arbre de vigueur moyenne, étalé, fertile. Rameaux assez forts, coudés, brun verdâtre. Yeux allongés, pointus, écartés. Lenticelles assez nombreuses, rondes, brunes. Feuilles sous-moyennes, minces, ovales, souvent un peu arquées. Dents peu marquées, obtuses. Boutons moyens, coniques, assez gros. Fleurs petites, de moyenne saison.

Variété d'amateur ; sensible à la tavelure. Éviter les terrains froids. S'accommode de l'espalier.

**Beurré Auguste**

4 6
4.182.892
5 98 78
7 4

Fruit gros, parfois bosselé. Épiderme fin, jaune clair, abondamment ponctué de roux, bronzé et taché de roux vers le pédicelle comme au pourtour, un peu rosé à l'insolation. Pédicelle gros ou charnu, dans cuvette étroite, plus ou moins profonde, bosselé. Œil petit ou moyen, mi-clos, dans cuvette moyennement profonde, étroite, un peu plissée. Chair blanche, acidulé. Bonne. Arbre vigoureux, très érigé, fertile. Rameaux gros, brun-acajou, un peu coudés aux nœuds. Lenticelles rondes et allongées, grosses, mi-saillantes, abondantes. Yeux assez forts, larges, pointus, mi-écartés. Feuilles moyennes, ovales-aiguës, planes, lisses, mi-souples, mi-épaisses. Dents peu profondes, régulières. Boutons petits, ovoïdes, marron, luisants. Variété pour amateur.

**Directeur Hardy**

8
4.184.741
45 956
6

Fruits assez gros groupés par 2. Épiderme lisse, à fond jaune foncé teinté partiellement ou presque en totalité de bronzé ; cuivré ou rouge sombre à l'insolation. Pédicelle fort, un peu renflé à l'extrémité, à fleur de peau, souvent éperonné. Œil petit ouvert, dans cuvette étroite, peu profonde et régulière, parfois bosselé. Chair blanche jaunâtre fine, fondante, sucrée, juteuse, agréablement parfumée. Très bonne.


Arbre vigoureux, érigé, fertile. Rameaux brun-violacé rougeâtre. Lenticelles peu nombreuses, petites, rondes, saillantes.

Yeux petits, demi-écartés. Feuilles moyennes, ovales-elliptiques, rigides, vert gai. Dents demi-aiguës ou obtuses ; pétiole court. Bouton effilé.

Variété d'amateur et de marché. Tous porte-greffes, toutes formes. Assez résistante à la tavelure.

Joyau de Septembre

1 6
4.184.742
35 81




Fruits moyens, isolés ou par deux. Épiderme lisse, jaune clair légèrement maculé de roux vers l'œil et plus ou moins au pourtour, frappé de rose avec ou sans, stries. Pédicelle fort ou charnu, oblique, prolongeant le fruit ou implanté à fleur de peau, au pied d'un léger éperon. Œil moyen, ouvert, dans cuvette moyennement profonde et large, à bord régulier. Chair blanche, fondante, juteuse, peu sucrée. Bonne ou assez bonne.

Arbre de bonne vigueur, très fertile. Rameaux longs, brun clair. Lenticelles arrondies. Yeux courts. Feuilles petites, lancéolées, creusées en gouttière et arquées.

Variété pour amateur.

Saint-Michel Archange

72 3
4.184.746
393 26
47 9




Fruit moyen. Épiderme jaune citrin ; assez abondamment et régulièrement pointillé de roux, lavé de fauve vers le pédicelle, parfois marbré de fauve et frappé de rouge avec ou sans stries. Pédicelle gros, court, arqué presque à fleur de

peau ou dans légère cuvette étroite un peu gibbeuse. Œil petit, mi-clos, dans cuvette peu profonde, évasée, régulière ; sépales un peu charnus à leur base. Chair jaunâtre ; très bonne.

Arbre de vigueur moyenne, mi-étalé, suffisamment fertile. Rameaux assez forts, demi-courts, brun-rougeâtre. Méritalles courts. Lenticelles petites, rondes. Yeux courts, appliqués. Feuilles moyennes, elliptiques-lancéolées, planes, lisses. Dents peu profondes, obtuses. Boutons moyens, allongés, marron.

Variété d'amateur.



Enfant Nantais

75 9
4.144.841
81 8


Fruits moyens, isolés ou par 2. Épiderme rugueux, jaune foncé, abondamment ou entièrement bronzé. Pédicelle fort, implanté obliquement à fleur de peau ou dans légère cuvette gibbeuse ou à bord lisse et régulier. Œil petit ou moyen, mi-ouvert, dans cuvette peu profonde et étroite. Chair blanche, sucrée, juteuse, un peu âpre. Bonne.

Arbre érigé, vigoureux dans l'Ouest, peu vigoureux ailleurs, moyennement fertile. Rameaux gros, longs, brun-jaunâtre, à lenticelles elliptiques ou rondes, abondantes. Yeux courts, s'écartant du rameau. Feuilles moyennes ou petites, planes, ovales-arrondies. Dents obtuses, profondes. Bouton brun foncé, obtus, assez gros.

Variété pour amateur.

Beurré Superfin

4 3
4.184.891
37 98




Fruits moyens. Épiderme lisse ou brillant, jaune doré, abondamment ou presque entièrement bronzé, ponctué de roux et parfois carminé à l'insolation. Pédicelle gros ou charnu affleurant ou prolongeant le fruit, avec parfois une gibbosité. Œil moyen, mi-ouvert, dans cuvette peu profonde, régulière. Chair blanche, sucrée, très fondante, fine, acidulée parfumée. Très bonne.

Arbre de vigueur suffisante sur cognassier, semi-érigé, moyennement fertile. Rameaux moyens, brun rougeâtre. Lenticelles petites, rondes, peu saillantes. Yeux petits, coniques, détachés. Feuilles moyennes ou assez grandes, elliptiques, vert gai, mi-coriaces, à pointe arquée. Dents arrondies. Boutons gros, effilés, brun clair.

Variété pour amateur. Toutes formes ; moyennes de préférence.

Ellis


4.187.641
8



Fruits moyens. Épiderme mince, jaune clair ou citrin clair, abondamment recouvert de petits points roux, voilé ou plaqué de fauve. Pédicelle gros, au pied d'une forte gibbosité, dans cuvette étroite peu profonde. Œil moyen, ouvert, dans cuvette peu profonde, large, lavée ou légèrement maculée de fauve. Chair jaunâtre ou blanchâtre, fine, fondante, juteuse, sucrée, légèrement plus grossière vers les loges. Bonne.

Arbre vigoureux, fertile. Rameaux assez courts. Yeux appliqués. Lenticelles allongées. Feuilles moyennes, elliptiques allongées, tourmentées, arqués, luisantes. Dents peu profondes. Boutons moyens ; pointus, marron.

Variété pour amateur. Sensible à la tavelure.



**Marguerite
Marillat**

5

4.192.281

5 81 176


Fruit gros ou très gros, isolé. Épiderme lisse jaune-paille, entièrement pointillé de fauve, frappé ou non de rose, rouillé vers l'œil, taché ou marbré ailleurs. Pédicelle charnu dans cuvette nulle ou étroite et peu profonde ; éperon plus ou moins développé. Œil moyen, ouvert ou mi-ouvert dans cuvette peu profonde un peu côtelée ou plissée. Chair blanc-jaunâtre, fine, juteuse, sucrée, parfumée. Très bonne.

Arbre peu vigoureux sur cognassier ; moyennement fertile. Rameaux assez gros, courts, olivâtres ou rosés. Lenticelles peu nombreuses allongées. Yeux moyens, coniques, appliqués. Feuilles elliptiques, presque planes, rigides, assez aiguës. Dents peu profondes, obtuses. Boutons moyens, obtus. Fleurs moyennes, hâtives.

Variété d'amateur et d'apparat ; pour formes naines. Très résistante à la tavelure.

Le BrunSyn. : *Beurré Le Brun*.

8 6
4.196.591
85 645




Fruit gros, réunis par 2, 3 ou 4, tombant facilement. Épiderme lisse, jaune, finement ponctué et lavé de brun vers le pédicelle. Pédicelle moyen ou court, charnu, dans cuvette peu profonde, étroite, bossuée. Œil moyen, clos, dans cuvette moyennement profonde, régulière. Chair blanche, sucrée, juteuse. Bonne.

Arbre très vigoureux sur cognassier. Rameaux longs et gros, peu nombreux, bruns, brun-verdâtre. Lenticelles jaunâtres, grosses, saillantes, rondes et longues. Yeux courts, un peu détachés. Feuilles assez grandes, larges, elliptiques, épaisses, vert foncé, luisantes, légèrement creusées et arquées à l'extrémité. Dents obtuses. Boutons petits, coniques.


Variété pour amateur. Formes basses de préférence.

Doyenné de Mongeron

4.219.666
3 4 49



Fruit petit ou moyen. Épiderme lisse, jaune citrin, lavé de gris vers l'œil, couvert des petits points fauves très nombreux. Pédicelle grêle, oblique ou arqué, court ou de moyenne longueur, dans cuvette peu profonde et régulière. Œil ouvert, moyen ou grand, dans cuvette peu profonde et régulière. Chair jaunâtre, sucrée, Très juteuse. Bonne.



Beurré Dilly

Syn. : *Beurré Delannoy* : *Poire de Jollain*.

4.349.795
76.5 1

Fruits gros bien attachés, par 2 ou par 3. Épiderme un peu rude, mi-épais. jaune verdâtre, teinté de rouge brun au soleil, pointillé gris ou vert, lavé de fauve aux extrémités. Pédicelle grêle, fortement renflé à l'extrémité dans cuvette peu profonde légèrement côtelée. Œil moyen ou grand, mi-ouvert, dans cuvette peu profonde, large, un peu bosselée. Chair blanchâtre ou blanc-verdâtre, fine, fondante, très juteuse, légèrement acidulée et parfumée, un peu granuleuse au centre. Blettissant vite. Très bonne.

Arbre vigoureux. Rameaux moyens, nombreux, brun violacé. Lenticelles rondes ou ovales, saillantes, grises. Yeux moyens, pointus, mi-écartés. Feuilles moyennes, ovales, arrondies, un peu creusées, vert-brillant. Dents obtuses ou arrondies. Boutons petits.

Variété pour amateur. Toutes formes et tous porte-greffes. Peu sensible à la tavelure.



Boieldieu

49 25
4.353.592
5 226 68
7

Fruits moyens, isolés ou par 2. Épiderme jaune, rude, abondamment et finement pointillé de brun foncé, lavé de fauve aux extrémités et parfois rose foncé à l'insolation, avec ou sans stries. Pédicelle gros ou charnu quelquefois long et renflé aux deux extrémités, à fleur de peau, ou dans légère cuvette avec

léger éperon. Œil moyen, entr'ouvert, sépales charnus ou développés, dans cavité moyennement profonde ou profonde et évasée, à bord ondulé ou plissé ou côtelé. Chair blanche, ou blanchâtre, fine, fondante, acidulée, un peu jaunâtre et scléreuse vers le centre. Bonne.


Arbre vigoureux. Rameaux brun-verdâtre. Lenticelles rondes, jaunâtre,. Yeux coniques, un peu détachés. Feuilles elliptiques-allongées, aiguës, épaisses, vert franc, brillantes, un peu creusées et arquées. Boutons petits, obtus.

Variété pour amateur.

Docteur Desportes

4.357.731


68 4



Fruits moyens attachés par 2. Épiderme un peu rude, jaune clair, taché ou marbré de gris fauve et frappé de rouge vif, abondamment garni de petits points roux. Pédicelle gros, renflé à son extrémité, dans cuvette peu ou moyennement profonde, étroite, bosselée au pourtour. Œil moyen, ouvert, dans cuvette peu profonde, évasée. Chair blanche, fine, juteuse, sucrée ; bonne.

Arbre de vigueur moyenne, fertile. Rameaux courts, brun jaunâtre ; mérithalles courts. Lenticelles petites, rondes, jaune foncé. Yeux grêles, légèrement détachés. Feuilles grandes, elliptiques-allongées, vert franc, épaisses, luisantes, contournées. Dents arrondies, peu marquées. Pétiole long.

Variété d'amateur.

Doyenné Blanc


Syn. : *Beurré Blanc* ; *Doyenné du Seigneur* ; *Saint Michel* ; *Citron de septembre* ; *Valencia*.

14 58
4.359.731
147 29

Fruit moyen ou sous-moyen. Épiderme presque lisse, jaune clair lavé de rose-brique et gris autour du pédicelle, finement pointillé et légèrement marbré de roux. Pédicelle à fleur de peau. Œil petit dans cuvette superficielle. Chair blanche, juteuse, blettissant rapidement. Bonne.

Arbre de moyenne vigueur, très fertile. Rameaux brun jaunâtre ou brun rosé, gros et courts ; mérithalles courts. Lenticelles petites, rondes, nombreuses. Yeux ovoïdes, détachés. Feuilles petites, elliptiques, à pointe aiguë, Dent obtuses, peu marquées. Boutons moyens, marron.

Variété d'amateur. A greffer de préférence sur franc. Sensible à la tavelure.

Seigneur

Syn. : *Beurré Lucratif* ; *Fondante d'Automne* ; *Seigneur Esperen* ; *Grésillier*.

1 7
4.374.681
43 59

Fruit moyen. Épiderme mi-lisse, fin, jaune clair, granité, marbré de fauve ou de gris. Pédicelle renflé à la base et portant de petites verrues, dans cuvette moyennement profonde, peu accusée. Œil moyen, ouvert, dans cuvette superficielle, large. Chair blanche, très juteuse, sucrée, parfumée, fondante. Très bonne.


Arbre de grande vigueur. Très fertile. Rameaux minces.

brun jaunâtre. Lenticelles peu nombreuses, jaunâtres, rondes. Yeux moyens, aigus, s'écartant. Feuilles petites. Boutons moyens.

Variété d'amateur. A greffer indistinctement sur franc ou cognassier. Toutes formes. Assez résistante à la tavelure.

Jules d'Airoiles


5
5.134.541
387 73



Fruit gros. Épiderme lisse, jaune clair, bronzé, lavé de fauve autour du pédicelle et légèrement au pourtour, frappé de carmin. Pédicelle gros, renflé à l'extrémité, au pied d'un léger éperon, dans cuvette étroite. Œil moyen ou sous-moyen dans petite cuvette large, lavée de roux. Chair blanchâtre, juteuse, fondante, parfumée, un peu musquée ; bonne.

Arbre de vigueur modérée sur cognassier, moyennement fertile. Rameaux nombreux, brun-rougeâtre, coudés, étalés. Lenticelles peu nombreuses, petites, rondes. Yeux courts, ovoïdes, mi-écartés. Feuilles elliptiques, vert clair, planes ou à bord un peu ondulé. Boutons petits, obtus.

Variété d'amateur ; sensible à la tavelure.

**Foucouba**


5.141.393

6 54

Fruits moyens réunis par 2. Épiderme mince, rugueux, jaune citrin, un peu marbré de gris et pointillé de même, fortement frappé de rose foncé sombre ou de rouge clair. Pédicelle mince, long, garni de lenticelles saillantes. Œil petit, aux sépales absents, dans cuvette peu profonde et très étroite, à bord uni. Chair blanche, ferme, non parfumée, un peu granuleuse. Assez bonne.

Arbre peu vigoureux, régulièrement fertile. Rameaux gros, très courts, brun rougeâtre à un an et noirâtres à deux ans. Lenticelles grosses, allongées. Yeux allongés, appliqués. Feuilles grandes, très rigides, elliptiques, à pointe aiguë, planes ou creusées. Dents aiguës. Boutons allongés, noirâtres.

Variété d'amateur. A cultiver en cordon sur cognassier ; en fuseau ou en vase sur franc.

Épine du Mas

Syn. : *Belle Épine du Mas* ; *Belle Épine de Limoges* ; *Beurrée de Rochouard* ; *Colmar du Lot* ; *Duc de Bordeaux* ; *Triomphe du Restaurant*.

14

5.142.291

51 168

8

Fruits moyens ou petits, souvent par deux. Épiderme lisse, mince, jaune clair, régulièrement et finement pointillé de roux, souvent nuancé ou lavé de rouge à l'insolation. Pédicelle moyen ou mi-long, plutôt grêle, arqué ou oblique, un peu renflé à l'extrémité, à fleur de peau, avec ou sans gibbosité à


sa base. Œil moyen, ouvert, sépales minces étoilés, dans cuvette superficielle ou moyennement profonde. Chair blanche, juteuse, fondante, un peu musquée, sucrée. Bonne ou très bonne.

Arbre faible sur cognassier auquel il se soude imparfaitement, érigé, très fertile. Rameaux moyens, allongés, un peu coudés, brun légèrement violacé ou verdâtre. Lenticelles fortes, jaunâtres, arrondies ou ovales, saillantes. Yeux moyens coniques écartés. Feuilles moyennes ou sous-moyennes, elliptiques, lisses, mi-épaisses, légèrement arquées et creusées, vert gai. Dents obtuses ou arrondies. Boutons moyens, allongés, pointus. Pétiole court. Fleurs moyennes étalées, hâtives.

Variété pour restaurants et marchés. A greffer sur franc. A tailler court. Peu sujette à la tavelure. Réussit en montagne.

Comtesse de Paris

1 8
5.142.741
74 69
9




Fruits assez gros, assez souvent réunis par 2 et 3. Épiderme mince, mi-rugueux, jaune verdâtre, largement lavé de roux vers le pédicelle et l'œil, souvent même au pourtour, fortement pointillé de roux, parfois légèrement rosé. Pédicelle gros, arqué, quelquefois charnu aux extrémités; à fleur de fruit. Œil petit ou moyen, ouvert ou mi-clos, dans petite cuvette régulière. Chair blanchâtre, sucrée, juteuse, parfumée. Très bonne.

Arbre vigoureux, fertile. Rameaux moyens, brun grisâtre, coudés. Yeux gros, coniques, écartés. Lenticelles rondes, grosses, mi-saillantes, jaunâtres. Feuilles moyennes, ovales, luisantes, épaisses, creusées, un peu arquées, pétiole rose. Boutons assez gros, ovoïdes, aigus. Fleurs moyennes, hâtives.

Variété d'amateur ; pour toutes formes ; à tailler normalement, plutôt court.

Doyenné du ComiceSyn. : *Comice* ; *Fondante du Comice*.

7 58
5.144.241
357 79
8 6



Fruit gros. Épiderme lisse, jaune-paille ou doré, finement pointillé de roux, plus ou moins abondamment marbré de roux, même autour du pédicelle ; frappé plus ou moins de rouge vif. Pédicelle gros, souvent appuyé à une légère gibbosité, dans cuvette nulle ou peu profonde, bosselée. Œil petit, mi-ouvert, dans cuvette moyennement profonde et large, à peine ondulée au bord. Chair blanche, fine, sucrée, juteuse, parfumée. Très bonne.


Arbre très vigoureux, mi-érigé, de fertilité faible ou irrégulière. Rameaux forts, brun jaunâtre. Lenticelles, jaunes, rondes ou longues. Yeux coniques pointus, détachés. Feuilles moyennes, ovales, lisses, un peu creusées, épaisses, vert-brillant. Dents fines, obtuses.

Variété de commerce ; gagne à être surgreffée.

Délices d'Hardenpont

Syn. : *Archiduc Charles* ; *Fondante du Panisel* ; *Délices d'Angers*.

5
5.144.791
375 646



Fruit moyen. Épiderme rude, jaune citrin ou doré, abondamment et finement pointillé, partiellement voilé de roux, souvent frappé de rose à l'insolation. Pédicelle gros ou charnu, à fleur de peau ou dans cuvette peu profonde, mamelonnée. Œil petit, ouvert, dans cuvette large, peu profonde, régulière. Chair blanche ou jaunâtre, juteuse, sucrée, un peu granuleuse. Très bonne.


Arbre vigoureux, érigé, moyennement fertile. Rameaux brun, jaunâtre, forts ; mérithalles courts. Yeux courts, mi-appliqués. Feuilles petites, ovales, étalées, luisantes, un peu arquées. Dents peu profondes, obtuses. Boutons petits moyens, aigus.

Variété d'amateur.

Des Urbanistes

Syn. : *Beurré Piquery* ; *Louise d'Orléans*.

9 28
5.144.791
3 7 64




Fruits moyens, par 2 ou 3. Épiderme mi-lisse, épais, jaune citrin, plus ou moins taché de rouille au pourtour ou vers les extrémités, parfois un peu frappé de rouge. Pédicelle gros, à fleur de peau ou dans petite cuvette. Œil ouvert ou mi-clos, petit, dans cuvette peu profonde, lisse. Chair blanche, fine, très finement granuleuse, juteuse, sucrée, parfumée, fondante ; très bonne, mais blettit brusquement.

Arbre de vigueur moyenne, érigé, fertile. Rameaux moyens, longs, coudés, brun-violacé ou verdâtres. Lenticelles peu

nombreuses, arrondies, blanches, petites. Yeux gros, détachés. Feuilles petites, elliptiques, vert clair, étroites, un peu arquées, mi-rigides. Dents fines, serrées, obtuses. Boutons petits, obtus.

Variété pour amateur. Craint la tavelure.



Orpheline d'Enghien


Syn. : *Beurré Deschamps*.

55 5
5.144.881
6 77 646

Fruit moyen. Épiderme mi-lisse, jaune-paille, couvert de nombreux petits points roux, marbré ou lavé de roux, y compris le voisinage du pédicelle. Pédicelle fort ou charnu, renflé à l'extrémité ; à fleur de peau, plus rarement dans cuvette étroite et bossuée. Œil moyen ou petit, entrouvert, dans cuvette peu profonde, étroite. Chair blanchâtre, juteuse ; très bonne.

Arbre moyennement vigoureux, assez fertile. Rameaux nombreux, gros, longs. Lenticelles nombreuses. Yeux moyens courts, appliqués. Feuilles lancéolées. Dents profondes.

Variété d'amateur.



Général Tottleben

7
5.145.392
4 5 7 1

Fruit gros. Épiderme épais, lavé ou frappé de rouge, plus ou moins marbré de fauve, abondamment pointillé de gris. Pédicelle, long fort, arqué, charnu aux extrémités. Œil grand, ouvert ou mi-ouvert, dans cuvette peu profonde, large, à bord plus ou moins régulier, lisse, ou bosselé. Chair blanche, fondante, sucrée ; bonne.

Arbre vigoureux, moyennement fertile. Rameaux gros,


longs, brun jaunâtre. Lenticelles rares, petites, brunâtres. Yeux moyens, pointus, écarté. Feuilles moyennes, en gouttière, souples, ovales, vert foncé. Dents profondes.

Variété d'amateur et d'apparat. Sensible à la tavelure. A greffer sur cognassier. De préférence : moyennes et petites formes.

Van Mons

Syn. : *Léon Leclerc*.

5 4
5.145.995
74 6
8



Fruit gros. Épiderme lisse, blanchâtre ou jaune clair, pointillé fauve, lavé de brun vers le pédicelle, rose ou rose brun à l'insolation. Pédicelle moyen à fleur de peau. Œil petit, ouvert, dans cuvette superficielle et large. Chair blanc-verdâtre, sucrée, parfumée ; très bonne.


Arbre de vigueur modérée, peu fertile. Rameaux assez nombreux, gris verdâtre. Lenticelles rondes ou ovales, blanches. Yeux moyens, allongés, pointus, écartés. Feuilles moyennes, ovales-allongées, plissées ou planes, peu épaisses. Dents peu marquées, obtuses. Boutons étroits, allongés.

Variété pour amateur, à greffer sur franc; à tailler court.

Nec plus ultra Meuris

Syn. : *Nec plus Meuris ; Beurré d'Anjou ; Beurré rouge d'Anjou*.


2
84 81
5.151.781
46 62
17 5



Fruit assez gros, isolé. Épiderme mi-lisse mince, jaune clair à l'ombre et citrin au soleil, abondamment et finement

pointillé, lavé de gris-fauve dans les cuvettes, marbré ou plaqué de roux et souvent rosé ou saumoné à l'insolation. Pédicelle fort ou charnu, dans cuvette plus ou moins superficielle, étroite, bosselée. Œil petit, ouvert, dans cuvette superficielle, étroite et à bord uni ; sépales étoilés. Chair blanche, très juteuse, sucrée, parfumée, fondante, légèrement granuleuse. Très bonne.

Arbre de vigueur modérée sur cognassier, érigé, moyennement fertile. Rameaux de grosseur moyenne, assez courts brun-clair. Lenticelles petites, rondes ou allongées. Yeux gros, courts, légèrement écartés. Feuilles elliptiques allongées, assez aiguës, peu épaisses, légèrement creusées, arquée, parfois plissées. Dents faibles, obtuses. Boutons moyens, mi-aigus, brun-clair. Floraison hâtive. Variété d'amateur sensible à la coulure ; à greffer sur cognassier.



Certeau d'Automne

Syn. : *Bellissime d'automne* ; *Petit Certeau* ; *Vermillon* ; *Cuisse-Dame* (par erreur).

5.152.399
8 63

Fruits petits souvent par 2. Épiderme épais, un peu rude, jaune doré, pointillé de gris, un peu teinté et strié de rouge, parfois rouillé vers le sommet. Pédicelle grêle, de moyenne longueur, prolongeant le fruit. Œil moyen, ouvert, presque à fleur de fruit ou dans très légère dépression. Chair blanche, mi-fine, cassante, peu juteuse, âpre, sucrée. Très bonne à cuire.

Arbre de vigueur grande, érigé, de fertilité moyenne ou capricieuse. Rameaux moyens, longs, brun foncé. Lenticelles rondes, peu nombreuses, blanchâtres, saillantes. Yeux petits, ovoïdes, appliqués. Feuilles petites, ovales-aiguës, minces, vert franc ou foncé, luisantes, légèrement creuses, bord un peu ondulé. Dents aiguës. Boutons petits, courts.

Variété d'industrie (confiserie, confiterie, séchage) ; à élever sur franc, à haute tige.


De la Foresterie

6
5.152.741
6 85 58

Fruit assez gros. Épiderme épais, jaune clair, frappé de rose sombre, abondamment pointillé, marbré et taché de brun, notamment vers le pédicelle. Pédicelle gros ou charnu. Œil petit, ouvert, dans cuvette peu profonde, ondulée au bord. Chair blanchâtre juteuse, un peu ferme.

Arbre de vigueur faible, moyennement fertile. Rameaux bruns. Lenticelles fines, rondes. Yeux pointus, petits et détachés. Feuilles petites, rudes, elliptiques, étalées. Dents très peu marquées.


Variété d'amateur ; à greffer sur franc ou même à surgreffer.


**Louise bonne Saunier**

7
5.152.791
4 81 666

Fruit moyen. Épiderme rugueux, jaune citrin, abondamment et finement pointillé roux, marbré fauve, légèrement teinté rose. Pédicelle fort, à fleur de peau ou dans légère cuvette étroite à bord ondulé. Œil moyen, ouvert, sépales un peu charnus, dans cuvette peu profonde à bord ondulé. Chair blanchâtre, juteuse, sucrée, parfumée ; très bonne.

Arbre de vigueur modérée, très fertile. Rameaux gros, courts, brun-rougeâtre. Lenticelles rares, rondes, petites, jaunâtres. Yeux gros, courts, légèrement écartés. Feuilles moyennes, ovales, planes ou légèrement creusées, pointe courte. Dents peu profondes, obtuses. Boutons moyens, arrondis. Variété pour amateur ; sujette à la tavelure.





Sucrée de Montluçon

Syn. : *Sucrée verte* ; *Sucrin vert*.

85 1
5.152.796
348 369
7

Fruits moyens, solitaires ou réunis par 2 ou 3. Épiderme très épais mi-rugueux, jaune clair, fauve vers le pédicelle, irrégulièrement et grossièrement pointillé de brun, rosé ou frappé de rouge. Pédicelle fort, renflé à l'extrémité, dans cuvette peu profonde, étroite, régulière, souvent inexistante. Œil grand, ouvert ou mi-ouvert, aux sépales mi-charnus, dans cuvette peu profonde, large, à bord régulier. Chair blanchâtre ou jaunâtre, mi-fine, assez rarement âpre, serrée, juteuse. Bonne, mais blettit assez vite.


Arbre de bonne vigueur, très fertile. Rameaux courts, assez forts, vert-jaunâtre ou brun clair méritalles longs. Lenticelles longues et rondes, grosses. Yeux gros, coniques, écartés. Feuilles grandes, ovales-arrondies, planes ou légèrement creusées, épaisses, vert foncé, luisantes. Pétiole court. Dents peu profondes, arrondies ou obtuses. Boutons gros, pointus. Floraison prolongée, corymbes de 8 fleurs.

Variété d'amateur ; à feuillage délicat ; à tailler long, les premières années au moins.

Beurré d'Apremont

Syn. : *Beurré Bosc* ; *Beurré de Humboldt* ; *Paradis d'automne*.

4
5.152.891
81
7




Fruits gros ou moyens. Épiderme mince, demi-lisse à fond jaune citrin ou doré, presque entièrement brun rougeâtre avec voile et ponctuation brun clair et ton chaud ou légèrement cuivré à l'insolation. Pédicelle fort, à fleur de peau. Œil moyen ou assez grand, ouvert, dans cuvette nulle ou très peu profonde, lisse. Chair blanchâtre fine, juteuse, fondante, sucrée, agréablement parfumée ; très bonne.

Arbre vigoureux, mi-érigé, moyennement fertile. Rameaux moyens brun-rougeâtre. Lenticelles rondes ou ovoïdes, saillantes, blanc-grisâtre. Yeux courts, écartés. Feuilles moyennes, ovales, étalées, un peu plissées, mi-souples. Dents fines à peine marquées. Boutons petits, ovoïdes, foncés.

Variété d'amateur ; sensible à la tavelure des feuilles ; à greffer sur franc.

Éva Baltet

67
5.154.282
6 7




Fruit gros. Épiderme jaune citrin, lavé ou frappé de rouge, tigré ou marbré fauve, y compris le tour du pédicelle, finement pointillé de gris. Pédicelle gros, dans cuvette moyennement profonde, plissée. Œil petit, clos ou mi-clos,

dans cuvette étroite, bosselée. Chair blanche, en général peu sucrée. Assez bonne.

Arbre de vigueur moyenne, mi-érigé, fertile. Rameaux bruns ou brun rosé. Lenticelles petites, rondes, jaunâtres. Yeux appliqués. Feuilles moyennes, ovales, presque planes ou un peu creusées, vert franc. Dents peu profondes, aiguës Boutons petits.

Variété d'amateur.



Charles Ernest

1
27 7
5.154.291
386 54
4

Fruits surmoyen. Épiderme presque lisse, jaune citrin clair, légèrement frappé de rouge vernissé, finement pointillé de gris au soleil et de brun à l'ombre. Pédicelle fort, à fleur de peau, au milieu de quelques plis, ou dans cuvette superficielle et gibbeuse. Œil petit, mi-clos, dans cuvette peu profonde, plissée, ou légèrement côtelée. Chair blanche, juteuse, fondante, sucrée, parfumée. Bonne.


Arbre vigoureux sur cognassier, érigé, assez fertile, Rameaux moyens, assez courts, brun rosé, érigés. Lenticelles peu abondantes, petites, rondes, gris-jaunâtre, non saillantes, Yeux assez gros, pointus, mi-appliqués. Feuilles moyennes, ovales-aiguës, lisses, mi-épaisses, vert gai. Dents fines, aiguës. Boutons petits, coniques, assez longs.

Variété de commerce et d'amateur ; un peu sujette à la tavelure ; à cultiver de préférence en forme naine.

Beurré Diel

Syn. : *Beurré Magnifique* ; *Beurré Incomparable* ; *Beurré Royal* ; *Crosse Dorothée* ; *Melon* ; *Beurré Vert*.

1 72
5.155.561
328 69



Fruits gros. Épiderme jaune foncé, pointillé et marbré de roux, plus spécialement aux extrémités, parfois frappé de rouge sombre. Pédicelle fort, souvent gros à l'extrémité, dans cuvette étroite et bosselée. Œil moyen, mi-ouvert, dans cuvette étroite, à bord ondulé. Chair blanchâtre, juteuse, acidulée, sucrée, parfumée, mi-fondante, granuleuse au centre, parfois un peu âpre. Bonne.


Arbre très vigoureux, mi-étalé ou divergent, très fertile. Rameaux gros, longs, arqués, portant de nombreuses brindilles brun-jaunâtre ou brun-gris. Lenticelles peu nombreuses, petites, rondes, grisâtres. Yeux gros, coniques, aigus, écartés. Feuilles grandes, ovales, planes, épaisses, vert franc, brillantes. Dents mi-profondes, aiguës. Boutons gros, mi-obtus. Fleurs grandes, nombreuses, hâtives.

Variété de commerce et d'apparat; craint de plus en plus la tavelure ; pour moyennes formes et espalier; s'accommode, de tous porte-greffes. A tailler assez long et non sur rides.

Beurré d'Hardenpont

Syn. : *Beurré d'Arenberg* ; *Beurré de Kent* ; *Beurré Lombard*.

2
5.158.541
6 6 29




Fruit gros. Épiderme très mince, finement chagriné, jaune citrin, lavé et marbré de fauve y compris le pied du

pédicelle, frappé de rose saumoné ou légèrement violacé ; un peu pointillé de verdâtre. Pédicelle fort, dans légère cuvette étroite. Œil moyen ou petit, ouvert ou mi-ouvert, dans cuvette étroite assez profonde, côtelée. Chair jaunâtre juteuse, sucrée, parfumée, fine, fondante, un peu granuleuse. Très bonne.

Arbre vigoureux, mi-étalé, assez peu fertile. Rameaux forts, assez courts, coudés, brun-grisâtre. Lenticelles petites, arrondies, grisâtres, nombreuses. Yeux larges, appliqués. Feuilles moyennes, épaisses, ovales, convexes, plissées, coriaces, à bord souvent contourné. Dents grandes, arrondies. Boutons petits. Fleurs très nombreuses, grandes, sujettes à la coulure, tardives.

Variété pour amateur ; très sensible à la tavelure.



Jeanne d'Arc

4 63
5.158.541
87 29

Fruit gros. Épiderme épais, rugueux, jaune citrin, plus clair à l'ombre, finement pointillé, parfois veiné de roux, taché de fauve autour du pédicelle, légèrement frappé de rose ou de saumon à l'insolation. Pédicelle gros, renflé aux extrémités, inséré à fleur de peau dans cuvette superficielle bosselée, moyennement étroite. Œil moyen, ouvert à longs sépales, dans cuvette peu ou moyennement profonde, évasée, bosselée. Chair blanchâtre granuleuse au centre, juteuse, fondante, sucrée, acidulée ; bonne.

Arbre de vigueur moyenne sur cognassier ; moyennement fertile. Rameaux assez gros, brun-grisâtre. Lenticelles petites, rondes. Yeux courts, arrondis, légèrement écartés. Feuilles elliptiques-lancéolées, presque planes, épaisses, lisses, légèrement arquées, vert foncé, mi-luisantes. Dents régulières, peu profondes. Boulons gros, obtus.

Variété d'amateur ; sujette à la tavelure ; à tailler court.


Le Lectier

5 646
5.162.591
6 95 189

Fruits gros, attachés par 1, 2 et 3. Épiderme mi-mince, lisse, jaune-paille ou jaune verdâtre lavé de roux vers le pédicelle et quelquefois marbré de même au pourtour, finement et irrégulièrement pointillé de brun. Pédicelle gros, oblique, à fleur de peau ou au pied d'un éperon; ordinairement renflé ou charnu aux extrémités. Œil assez grand, mi-ouvert, sépales souvent charnus dans cuvette superficielle ou peu profonde plus ou moins entourée de côtes. Chair blanchâtre ou jaunâtre, fine, tendre, très juteuse, légèrement parfumée, sucrée, rarement âpre. Bonne ou assez bonne.


Arbre vigoureux sur cognassier, érigé, fertile. Rameaux longs, assez gros, coudés, brun olivâtre. Lenticelles peu visibles, rondes et longues. Yeux courts, aigus, légèrement écartés. Feuilles assez grandes, elliptiques, vert franc, brillantes, un peu arquées, à pointe courte, mi-rigides. Dents obtuses. Boutons gros, allongés, lisses. Fleurs grandes, mi-ouvertes, hâtives.

Variété d'amateur ; pour toutes formes et tous porte-greffes ; à tailler normalement.

**Beurré Six**

5.162.591
95 265

Fruit surmoyen plus court et mieux côtelé que le précédent. Épiderme lisse, fin, brillant, jaune clair-verdâtre, lavé de roux vers le pédicelle, granité de vert, finement pointillé de roux, quelquefois




frappé de rose. Pédicelle de longueur et de force moyennes, arqué ou contourné, prolongeant le fruit. Œil petit ou assez grand, mi-ouvert, dans cuvette inexistante ou peu profonde, étroite, bosselée ou légèrement plissée. Chair blanche ou blanc-verdâtre, très fine, fondante, sucrée, acidulée, agréablement parfumée, très juteuse. Bonne.

Arbre vigoureux, fertile. Rameaux moyens, brun-jaunâtre. Lenticelles abondantes, allongées, jaunâtres. Yeux gros, coniques, écartés. Feuilles moyennes, ovales-arrondies, épaisses, convexes et arquées, vert-clair. Dents peu marquées, arrondies. Boutons gros, obtus,

Variété d'amateur ; s'épuisant rapidement sur cognassier donne de gros fruits en espalier ; craint un peu la tavelure

Triomphe de Jodoigne

8 84
5.165.661
58 79




Fruits gros, souvent par 2. Épiderme mi-lisse, peu épais, jaune clair, frappé de rouge, marbré et lavé de roux, ponctué de même. Pédicelle moyennement fort, renflé à l'extrémité, à fleur de peau ou dans petite cuvette étroite et bosselée. Œil moyen, ouvert, dans cuvette moyennement profonde, mi-étroite, à bord plissé ou ondulé. Chair blanche, sucrée, fondante, parfumée, blettissant vite ; un peu granuleuse vers l'œil. Bonne.

Arbre très vigoureux, mi-étalé, très fertile. Rameaux assez forts, longs, étalés. Lenticelles rondes ou allongées, peu nombreuses, fauves. Feuilles grandes, elliptiques, planes ou légèrement ondulées, parcheminées, vert brillant. Dents obtuses, presque nulles. Boutons moyens, aigus, noirâtres. Fleurs grandes, mi-hâtives.

Variété d'amateur et de marché ; bonne pour verger ; à tailler un peu long, au moins les premières années, court ensuite ; convient à l'espalier, même au Nord.

Ferdinand Gaillard


4
71 66
5.165.741
54 58
9 9



Fruits surmoyens ou gros, par 1, 2 ou 3, finement côtelés ou arrondis. Épiderme rude, mi-lisse, jaune-paille, lavé de fauve autour du pédicelle, parfois marbré de même en d'autres points, abondamment et finement pointillé de roux, frappé ou non de rose à l'insolation. Pédicelle court, fort, oblique, affleurant et souvent appuyé à une légère gibbosité. Œil petit ou moyen, ouvert ou mi-ouvert dans cuvette moyennement, ou peu profonde, large. Chair blanche, mi-fine, fondante ou mi-croquante, sucrée, mi-juteuse, à peine granuleuse, blettissant brusquement. Bonne.

Arbre moyennement vigoureux sur cognassier, érigé, très fertile. Rameaux longs et forts, brun violacé. Lenticelles moyennement nombreuses, rondes, grises. Yeux courts, plissés. Feuilles grandes, elliptiques-allongées, épaisses, plissées. Dents peu profondes, obtuses. Fleurs hâtives.

Variété d'amateur et de marché ; peu sujette aux maladies même en terrain frais ou riche.




Sœur Grégoire

7
5.168.791
6 35 66

Fruits surmoyens, réunis par 2. Épiderme épais, rugueux, jaune ou jaune verdâtre, recouvert ou marbré de gris-roux, ponctué de gris ou de rose sur toute la surface, légèrement frappé de rouge terne. Pédicelle gros, long, renflé à l'extrémité, dans cuvette mamelonnée ou gibbeuse. Œil petit, mi-ouvert dans cuvette ondulée. Chair blanchâtre, parfumée, juteuse.

Arbre vigoureux sur cognassier, de fertilité capricieuse. Rameaux moyens brun jaunâtre. Lenticelles nombreuses, petites, rondes, jaunâtres. Yeux coniques, un peu détachés. Feuilles moyennes, elliptiques, aiguës, presque planes ou légèrement arquées, vert clair. Dents peu marquées, obtuses. Boutons petits.

Variété d'amateur ; à tailler normalement, assez résistante à la tavelure.



Duchesse Bérerd

354
5.168.981
99 844
7

Fruits gros ou assez gros, isolés ou par 2 et 3. Épiderme à fond jaune, bronzé, abondamment frappé de rouge foncé sombre, abondamment pointillé de gris. Pédicelle gros, renflé aux extrémités, à fleur de peau ou plus souvent dans cuvette moyennement profonde, large, à contour bosselé. Œil moyen, clos ou mi-clos, dans cuvette mi-large, évasée, un peu côtelée. Chair blanche un peu croquante, juteuse, sucrée très bonne.


Arbre moyennement vigoureux, érigé, fertile. Rameaux moyens, demi-longs, brun clair et violacés dans les extrémités. Yeux moyens, pointus, très détachés. Lenticelles assez nombreuses, rondes ou elliptiques, mi-saillantes. Boutons gros, pointus, marron. Feuilles petites ou sous-moyennes, ovales-elliptiques à pointe aiguë, lisses, peu rigides, vert franc, à peine creusées. Dents peu accusées, obtuses.

Variété d'amateur et de commerce ; tous porte-greffes ; formes basses, de préférence ; un peu sensible à la tavelure.

Duchesse d'Angoulême

Syn. : *De Pézenas* ; *Des Eparonnais* ; *Duchesse*.


57 1
5.169.743
388 696



Fruits gros ou très gros, isolés ou par 2. Épiderme assez épais, jaune clair, grossièrement ponctué et marbré de roux, souvent frappé de rose. Pédicelle gros dans cuvette moyennement profonde, assez large. Œil moyen ou petit, mi-ouvert ou clos dans cuvette moyennement profonde, large, plissée ou irrégulièrement bosselée. Chair blanc-jaunâtre, ferme, sucrée, fondante, parfumée, quelquefois granuleuse, Très bonne.

Arbre de vigueur modérée, érigé, fertile. Rameaux longs, brun-jaunâtre et jaune rosé à l'insolation, souvent terminés par un bouton. Lenticelles allongées et rondes. Yeux moyens coniques, écartés, duveteux. Feuilles vert-clair, planes, elliptiques, luisantes. Dents peu profondes, obtuses. Boutons assez gros, allongés, brun clair, assez fréquents sur les rameaux de l'année. Fleurs moyennes, nombreuses dans les corymbes, mi-hâtives.

Variété de commerce et d'amateur ; tous porte-greffes ; toutes formes ; en espalier de préférence, et au levant. De plus en plus sujette à la tavelure en plein vent.



Beurré Clairgeau

Syn. : *Clairgeau*.

85 6

5.171.741

42 964

Fruits gros, souvent par 2 ou 3. Épiderme mince à fond jaune clair, taché de roux aux extrémités et même au pourtour, entièrement couvert de points roux, abondamment frappé de rouge ou de rose terne ou violacé. Pédicelle gros ou fort, oblique, renflé aux extrémités, au pied d'un éperon ou d'une simple gibbosité. Œil assez gros ou moyen, ouvert, dans cuvette superficielle et régulière. Chair blanche, mi-fine, mi-ferme et mi-fondante, peu juteuse, peu sucrée, légèrement granuleuse au centre ; blettit parfois assez vite vers le pédicelle, assez bonne.

Arbre de vigueur faible sur cognassier, érigé, très fertile. Rameaux longs, de moyenne grosseur, brun-rougeâtre. Lenticelles moyennement nombreuses, assez, petites, rondes ou ovales, jaunâtres, très apparentes. Yeux allongés, pointus ; écartés. Feuilles moyennes, elliptiques, à pointe courte, vert clair ou vert franc, étalées, lisses, mi-épaisses. Dents très peu profondes, obtuses. Pétiole de 25 millimètres, assez fort.

Variété de commerce ; à greffer sur franc ; formes basses : taille courte ; peu sujette à la tavelure ; bonne pour montagne ; résiste aux gelées de printemps.

Armand Jandriot

5.171.782

82 54

Fruit moyen ou surmoyen. Épiderme jaune citrin, couvert de nombreux points roux de moyenne grosseur ; lavé de roux autour du pédicelle et veiné ou taché de même au pourtour. Pédicelle court, gros ou charnu, oblique, dans cuvette très faible, étroite, à bord accidenté. Œil moyen, mi-ouvert, dans cuvette moyennement profonde et mi-étroite. Chair blanche peu sucrée, acidulée.

Arbre de vigueur moyenne, port mi-érigé, moyennement ou peu fertile. Rameaux moyens, brun violacé. Lenticelles rondes et mi-longues. Yeux gros, coniques, écartés. Boutons petits. Feuilles assez grandes ; ovales-arrondies, épaisses, luisantes, presque planes ; dents peu profondes, régulières, arrondies ou obtuses, pétiole grêle.


Variété pour amateur.

**Curé**

Syn. : *Belle de Berry* ; *Bon Papa*.

5 7 2
5.172.161
6 84 29

Fruits gros, attachés par 1, 2 et 3, fréquemment marqués d'une couture. Épiderme lisse, épais, jaune marbré ou plaqué de roux, taché de même autour du pédicelle et de l'œil, ponctué ou granité de brun et de vert, frappé de rose pâle. Pédicelle fort, renflé à l'extrémité, à fleur de peau ou au pied d'un léger éperon. Œil moyen, très ouvert, dans cuvette peu profond, élargie, à bord ondulé, sépales développés. Chair




blanche, assez juteuse, mi-sucrée, mi-fine. Assez bonne, crue ; bonne, cuite.

Arbre très vigoureux, un peu pleureur, très fertile. Rameaux longs, forts, arqués vers le sol, brun olivâtre ou marron. Lenticelles grosses, rondes. Yeux gros, coniques, un peu écartés. Feuilles ovales, arrondies, étalées, lisses, luisantes, vert franc. Dents aiguës. Boutons petit.

Variété de marché, de séchage.

Président d'Osmonville

54 2 1
5.172.796
85 568
1




Fruits surmoyens. Épiderme lisse, mi-épais, jaune clair, maculé de fauve vers le pédicelle et parfois légèrement marbré de roux au pourtour ; frappé de rose ; assez abondamment ponctué de roux clair. Pédicelle fort, arqué, à fleur de peau. Œil moyen ou petit, mi-ouvert, dans cuvette peu profonde, plissée ou côtelée. Chair blanc-jaunâtre, juteuse ; très bonne.

Arbre moyennement vigoureux, érigé, fertile. Rameaux assez forts, brun-jaunâtre. Lenticelles allongées, jaunâtres. Yeux courts, mi-écartés. Feuilles ovales-lancéolées, planes, vert clair, peu épaisses. Dents obtuses. Boutons gros ou moyens, assez courts, aigus.

Variété d'amateur et d'apparat.

Soldat LaboureurSyn. : *Beurré Blumenbach*.

7
5.172.831
6 8 64



Fruit moyen, tombant facilement. Épiderme fin, lisse, jaune citrin, abondamment pointillé et marbré de roux y compris le voisinage du pédicelle. Pédicelle gros, à fleur de peau ou dans légère cuvette. Œil moyen ou assez gros, ouvert, dans cuvette très peu profonde ou superficielle. Chair blanc-jaunâtre, sucrée, très juteuse, parfumée ; très bonne.

Arbre vigoureux sur cognassier, érigé, moyennement fertile. Rameaux gros, longs, coudés, brun-clair. Lenticelles grosses, allongées, grisâtres. Yeux gros, coniques, détachés. Feuilles moyennes, elliptiques, presque planes, ou un peu arquées, vert gai. Dents mi-aiguës. Boutons gros, courts, brun foncé.

Variété d'amateur ; à mettre de préférence en espalier ou en fuseau ; à tailler court.

Président Héron

2
5.172.851
5 6




Fruit moyen, jaune, lavé de fauve autour de l'œil et du pédicelle, parsemé de gros points bruns. Pédicelle fort, renflé à l'extrémité, dans cuvette peu marquée. Œil grand, ouvert, dans cuvette peu profonde à bord régulier et lisse. Chair blanche sucrée.

Arbre assez vigoureux, érigé, moyennement fertile. Rameaux de longueur et de grosseur moyennes, brun verdâtre ; mérithalles allongés. Lenticelles rondes, petites, grisâtres. Yeux

gros, courts, très écartés. Boutons ovoïdes, brun foncé, allongés, terminant souvent les brindilles. Feuilles moyennes ou assez grandes, ovales-lancéolées, rigides, planes, vert foncé ; dents peu profondes, obtuses ; pétiole moyen.

Variété d'amateur.



Messire Jean


Syn. : *Marion* ; *Monsieur John*.

59
5.174.854
386 96

Fruit moyen. Épiderme épais, rude, jaune foncé, abondamment garni de points roux, voilé ou taché de roux y compris la base du pédicelle. Pédicelle moyen, au pied d'un léger éperon. Œil moyen ou assez grand, ouvert, dans cuvette peu profonde, étroite. Chair blanchâtre, croquante, juteuse, sucrée, parfumée, granuleuse, blettit assez vite. Très bonne cuite.

Arbre vigoureux, mi-étalé, fertile. Rameaux moyens assez courts, bruns. Lenticelles peu nombreuses, allongées. Yeux courts, appliqués. Feuilles ovales, assez grandes, plissées, vert foncé. Dents grandes, obtuses. Boutons petits, arrondis. Fleurs moyennes, mi-hâtives.

Variété de commerce, à cuire (compote et confitures, conserves au sirop) ; à greffer sur franc ; à cultiver sur tige ; de plus en plus sujette à la tavelure.



Pierre Corneille

4 62
5.177.891
6 48
2

Fruit assez gros ou moyen, ovoïde ou rétréci. Épiderme fin, lisse, à fond jaune doré, voilé de roux ou presque entièrement bronzé, parsemé de points roux-jaunâtre.

Pédicelle moyen, fort, oblique, rarement arqué, renflé aux extrémités, dans très petite cuvette, au pied d'une gibbosité. Œil petit, entr'ouvert, dans cuvette légère, bien évasée. Chair blanche ou blanchâtre, fine, fondante, assez juteuse, pas très sucrée, légèrement parfumée, légèrement musquée. Bonne.

Arbre vigoureux, moyennement fertile. Rameaux assez forts, rouges ; lenticelles nombreuses, grandes, parfois transversales. Yeux détachés. Feuilles moyennes ovales ou elliptiques, lisses, un peu creusées ; dents peu profondes, obtuses, vert franc ; pétiole fort. Bouton petit.

Variété pour amateur.

Columbia

Syn. : *Columbia Virgouleuse*.

5.182.193


5

Fruit, gros. Épiderme épais, jaune-citrin clair. Pédicelle fort, renflé à son extrémité. Œil moyen, très ouvert, à grands sépales étoilés dans cuvette peu profonde, évasée, à pourtour presque plan. Chair blanche, tendre, mais serrée, peu juteuse ; médiocre ou assez bonne.

Arbre vigoureux sur cognassier. Rameaux assez gros, brun foncé rougeâtre. Lenticelles nombreuses, fines, rondes. Yeux petits, courts, appliqués. Feuilles elliptiques, très rigides, creusées, ou contournées. Dents peu profondes, obtuses.

Variété d'amateur.






Beurré Luizet

4 8
5.182.341
55 2
9

Fruits gros ou surmoyen, attachés fréquemment par 2. Épiderme rugueux, épais, jaune pâle ou verdâtre, un peu taché de roux autour du pédoncule, frappé de rouge. Pédoncule fort, à fleur de peau. Œil moyen ou grand, ouvert, dans cuvette nulle ou peu profonde, un peu mamelonnée. Chair blanche, mi-ferme, mi-fine, sucrée, rarement âpre. Très bonne.

Arbre assez vigoureux, moyennement fertile. Rameaux peu nombreux, gros, longs, brun-clair ou olivâtres. Lenticelles petites, jaunâtres, rondes et allongées. Yeux ovoïdes, écartés. Feuilles moyennes, planes, ovales, rudes. Dents très fines. Boutons courts, aigus. Variété d'amateur; à greffer sur cognassier.



Roi Charles de Wurtemberg

1
5.183.692
96 78

Fruit gros. Épiderme jaune citrin, couvert de nombreux et gros points roux, plus ou moins marbré de rouille, teinté ou non de rose cuivré. Pédoncule charnu, oblique, au pied d'un éperon. Œil petit, mi-ouvert, à fleur de peau ou dans très légère cuvette plissée. Chair blanche, fondante, acidulée. Bonne.

Arbre vigoureux, fertile. Rameaux gros, demi-courts, jaunâtres. Yeux allongés, écartés. Lenticelles allongées. Feuilles moyennes, ovales, planes, lisses, moyennement épaisses. Dents arrondies ou obtuses. Boutons gros et pointus, marron.

Variété d'amateur; un peu sensible à la tavelure.


Président Mas

97 5
5.184.641
6 58 796

Fruit gros ou assez gros. Épiderme lisse, assez épais, rude, jaune citrin, fortement marbré de fauve, notamment vers l'œil, et frappé de rose terne, largement parsemé de gros points roux. Pédicelle gros, à fleur de fruit ou dans cuvette étroite, peu profonde avec légère gibbosité. Œil moyen ou petit, mi-ouvert, dans cuvette mi-profonde, large, à bord ondulé. Chair blanchâtre ou jaunâtre, fondante, fine, juteuse, sucrée, agréablement parfumée ; très bonne.

Arbre moyennement vigoureux les premières années ; vigoureux plus tard ; érigé, moyennement fertile. Rameaux moyens, demi-courts. Lenticelles fines, non saillantes, rondes, blanchâtres. Mérithalles courts. Yeux gros, ovoïdes, écartés. Feuilles moyennes ou petites, vert gai, lisses, planes ou un peu arquées, elliptiques. Dents obtuses. Boutons moyens, allongés.


Variété d'amateur et d'apparat ; à greffer indistinctement sur franc ou cognassier ; très rustique.

**Baltet père**

Syn.: *Beurré Ballet père*.

35
5.184.741
375 6


Fruit gros. Épiderme jaune clair, abondamment et finement pointillé de brun, lavé de même aux extrémités et plus ou moins frappé de rose



vif. Pédicelle charnu, oblique, à fleur de peau ou coudé au pied d'un éperon charnu. Œil petit ou moyen, clos ou mi-clos, à sépales un peu charnus dans petite cuvette plissée, à bord ondulé. Chair blanchâtre, juteuse, acidulée, granuleuse au centre ; bonne.

Arbre vigoureux, fertile. Rameaux assez gros, brun clair. Lenticelles rondes, mi-saillantes. Yeux coniques, plus ou moins écartés. Boutons assez gros, marron, pointus. Bourses très développées. Feuilles ovales-allongées et ovales-elliptiques, épaisses, lisses, peu dentées. Pétiole long et grêle.

Variété d'amateur ; à conduire en basse-tige.



Virginie Baltet

1
5.184.895
45 667

Fruits moyens ou surmoyens, attachés isolément, ou par 1. Épiderme lisse, mi-épais, jaune clair un peu verdâtre, maculé de brun autour du pédicelle et taché ou marbré de roux au pourtour. Pédicelle de moyenne longueur, fort, renflé aux extrémités, oblique ou arqué, implanté à fleur de fruit ou dans petite cuvette étroite et gibbeuse. Œil moyen ou petit, mi-ouvert, sépales courts, dans cuvette superficielle ou faible, plissée ou unie. Chair blanche ou blanc-verdâtre, fine, serrée, fondante, sucrée, peu parfumée, parfois nuancée de saumon ; blettit assez vite ; assez bonne.

Arbre de bonne vigueur, peu fertile, mi-érigé. Rameaux demi-longs, brun-clair. Yeux appliqués, petits. Lenticelles petites, rondes. Feuilles moyennes, ovales-aiguës, un peu convexes, minces, vert clair ; pétiole long, grêle. Boutons courts, coniques.

Variété pour amateurs.


Marie-Louise d'Uccle

94 5
5.185.691
351 82
7

Fruits gros, souvent attachés par 2. Épiderme rude, jaune, abondamment marbré ou plaqué de roux y compris les extrémités. Pédicelle assez long, gros, oblique ou arqué, à fleur de fruit. Œil assez grand ou moyen, mi-clos, sépales longs, dans cuvette moyennement profonde, large, régulière ou à bord un peu ondulé. Chair blanche, mi-fine, juteuse, sucrée. Bonne.


Arbre vigoureux même sur cognassier, moyennement fertile, érigé. Rameaux assez forts, brun foncé ; lenticelles rondes, saillantes. Yeux détachés. Boutons marron, assez gros. Feuilles elliptiques, moyennes ou assez grandes, épaisses, rigides, vert foncé ; un peu creusées, arquées. Dents obtuses peu marquées ; Pétiole fort et long (4 centimètres.)

Variété pour amateur.

**Bon Chrétien Napoléon**

Syn.: *Melon d'automne* ; *du Wurtemberg* ; *Beurré Napoléon* ; *Belle Caennaise*.

58 3
5.185.741
72 69
4




Fruits gros, attachés par 2 et 3. Épiderme mi-épais, rugueux, jaune clair, finement et abondamment pointillé de roux, frappé ou non de rose, maculé de roux vers le pédicelle et l'œil. Pédicelle gros, ou fort, renflé ou charnu vers son

extrémité ; implanté à fleur de peau ou dans cuvette étroite, bosselée ou gibbeuse. Œil moyen, mi-clos, aux sépales forts et mi-charnus, dans cuvette moyennement profonde, large, plissée. Chair blanche, grossière, très juteuse, un peu granuleuse, sucrée, mais acidulée et parfois un peu âpre ; assez bonne.

Arbre vigoureux, mi-érigé, fertile. Rameaux gros, courts, gris verdâtre ou brun clair ; mérithalles allongés. Lenticelles petites, rondes, longues, abondantes, jaunes. Yeux coniques, blanchâtres, écartés ou semi-appliqués. Feuilles moyennes, épaisses, vert foncé, luisantes, planes, ovales-elliptiques. Dents aiguës, régulières, peu profondes. Boutons gros, allongés, pointus, brun foncé. Variété pour amateur.

Duchesse bronzée

8
5.186.981
375 8




Fruit gros, ordinairement isolé sur la bourse. Épiderme épais, mi-rugueux, à fond jaune dissimulé sous une teinte bronzée générale, avec légère teinte rose à l'insolation ; abondamment et grossièrement ponctué de roux. Pédicelle gros, court, oblique, voire même charnu, renflé aux extrémités, dans cuvette superficielle ou peu profonde, élargie au sommet et à bord ondulé. Œil sous-moyen ou petit, entr'ouvert dans petite cuvette moyennement ou peu profonde à bord un peu ondulé. Chair blanchâtre, assez ferme, grossière, granuleuse au centre, juteuse, sucrée, parfumée. Bonne.

Arbre de vigueur modérée, mi-érigé, moyennement fertile. Rameaux droits, de moyenne grosseur, brun clair. Lenticelles rondes, non saillantes. Yeux longs, pointus, s'écartant nettement du rameau. Boutons gros, brun-clair. Feuilles moyennes, ovales-elliptiques, épaisses, rudes, lisses ; dents peu profondes.

Variété d'amateur.

Beurré Dumont

46 8
5.187.941
93 6
77




Fruit gros. Épiderme rugueux, jaune, presque entièrement voilé de rouille avec teinte rougeâtre, marbré de gris vers le pédicelle. Pédicelle gros, renflé à ses extrémités ; à fleur de peau ou dans cuvette étroite, bosselée. Œil moyen, ouvert, dans cuvette peu profonde, large, plissée. Chair blanche, acidulée, parfumée, juteuse, fondante ; bonne.

Arbre assez faible sur cognassier, fertile. Rameaux gros, assez courts, brun jaunâtre. Yeux gros, pointus, mi-appliqués. Lenticelles peu nombreuses. Feuilles moyennes, ovales, planes, vert clair, lisses, terminées en pointe. Bouton allongé, fin. Fleurs nombreuses, moyennes, tardives.

Variété pour amateur ; à greffer sur cognassier ; à conduire en formes basses ; à tailler normalement.

Bon Chrétien Bonnamour

5.188.597
4 74 64




Fruits surmoyens ou gros. Épiderme jaune verdâtre abondamment pointillé de gris, marbré ou voilé partiellement de roux, plus spécialement aux extrémités, frappé de rouge-brique. Pédicelle assez gros, à fleur de peau. Œil moyen, ouvert ou mi-ouvert, dans cuvette large et peu profonde. Chair saumonée, fondante, juteuse, parfumée, sucrée. Très bonne.

VERCIER. — *Comment reconnaître les fruits.*

Arbre d'assez faible vigueur sur cognassier, érigé, très fertile. Rameaux brun-clair, grêles, coudés. Lenticelles, rondes peu nombreuses, blanchâtres. Yeux petits, allongés, pointus, écartés du rameau. Feuilles assez grande, ovales-lancéolée, un peu arquées, Dents larges et arrondies. Boutons petits.

Variété pour amateurs ; pour formes naines ; à tailler normalement au début, court ensuite.



Beurré Bachelier

Syn. : *Bachelier* ; *Chevalier*.

6
74
5.189.641
57 9
95


Fruit gros. Épiderme lisse, mince, jaune clair, finement ponctué de roux, veiné ou taché de rouille, rarement frappé de rouge. Pédicelle gros, dans petite cuvette étroite et bosselée. Œil moyen ou petit, ouvert ou mi-clos, sépales mi-longs dans cuvette moyennement profonde, large, irrégulière. Chair blanche, fine, juteuse, mi-sucrée, mi-acidulée, agréablement parfumée, fondante. Bonne ou très bonne.

Arbre de vigueur modérée, érigé, assez fertile. Rameaux assez gros, arqués, brun clair ou brun rougeâtre. Lenticelles rondes, grisâtres. Yeux assez gros, pointus, s'écartant. Feuilles ovales, planes ou légèrement convexes, mi-épaisses, lisses, vert terne. Boutons gros, assez longs, marron foncé.

Variété d'amateur ; sujette à la tavelure ; tailler plus long sur franc que sur cognassier ; à conduire en formes naines.

Prémices Lesueur

8
5.189.891
394 65
3



Fruit moyen ou surmoyen. Épiderme assez lisse, à fond jaune clair pointillé et plus ou moins marbré ou plaqué de roux. Pédicelle gros ou fort, parfois charnu, dans cuvette peu profonde à bord ondulé ou gibbeux. Œil ouvert, ou mi-ouvert dans cuvette demi-profonde à bord ondulé. Chair blanchâtre, mi-fine, très juteuse, légèrement parfumée. Bonne.


Arbre de vigueur suffisante, buissonnant, peu ou moyennement fertile. Rameaux assez courts, forts, brun clair. Lenticelles rondes et petites. Feuilles moyennes, ovales ou elliptiques, planes, parcheminées ; dents mi-aiguës. Yeux petits légèrement écartés du rameau. Boutons moyens.

Variété d'amateur.

Figue d'Alençon

Syn. : *Bonissime de la Sarthe* ; *Figue d'hiver*.

7
5.191.985
8 7 6




Fruit moyen ou sous-moyen. Épiderme épais, uni sans être lisse, jaune paille, plus ou moins marbré de roux y compris vers le pédicelle, finement pointillé, frappé de rose vif. Pédicelle charnu, prolongeant le fruit. Œil moyen ou petit, ouvert, dans cuvette superficielle. Chair verdâtre ou jaunâtre, très juteuse, légèrement âpre, sucrée ; assez bonne.

Arbre moyennement vigoureux, mi-étalé, moyennement

fertile. Rameaux moyens, coudés, brun rougeâtre. Lenticelles peu nombreuses, fines, rondes, bien apparentes. Yeux petits, allongés, mi-écartés. Feuilles assez grandes, ovales, creusées, légèrement arquées, plissées, vert foncé, luisantes. Dents obtuses. Boutons moyens minces.

Variété d'amateur ; à cultiver en espalier sur cognassier ; à tailler un peu long.



Madame Bonnefond

2
1 67
5.192.291
85 766
4 8

Fruits gros. Épiderme mince, jaune clair teinté de verdâtre, abondamment et finement pointillé de roux, légèrement marbré de roux, frappé carmin vif. Pédicelle gros, renflé à son extrémité, charnu à la base. Œil grand, mi-ouvert, dans cuvette peu profonde large, à bord ondulé. Chair blanchâtre ou jaunâtre, tendre, juteuse, parfumée, sucrée, verdâtre sous la peau, rarement âpre ; bonne.

Arbre moyennement vigoureux sur cognassier, érigé, assez fertile. Rameaux moyens, bruns. Lenticelles fines, rondes, peu apparentes. Yeux coniques, écartés. Feuilles petites, elliptiques, presque planes, lisses. Dents peu profondes, obtuses ou arrondies. Boutons moyens, ovoïdes, aigus.

Variété pour amateur ; à tailler normalement.


Marguerite Brandon

1
5.193.295
7 4

Fruits gros. Pédicelle fort, gros à son extrémité dans cuvette presque inexistante, étroite, plissée. Œil petit aux sépales très réduits, dans cuvette profonde, à bord ondulé. Chair blanc verdâtre.

Arbre vigoureux, érigé, peu fertile. Rameaux gros, assez longs, verdâtres. Lenticelles peu nombreuses, rondes. Yeux, moyens, appliqués. Feuilles moyennes, elliptiques, vert franc, étalées. Dents peu marquées. Boutons moyens ou petits.

Variété d'amateur.

**Mère Périer**


71
5.194.886
85 45


Fruits assez gros ou moyens. Épiderme jaune, lisse, abondamment bronzé ou rouillé, parsemé de gros points roux. Pétiole fort, gros, aux extrémités, implanté à fleur de peau ou dans une très légère cuvette. Œil moyen, ouvert ou mi-ouvert, dans cuvette peu profonde, étroite, bosselée. Chair juteuse.

Arbre de belle vigueur, mi-érigé, moyennement fertile. Rameaux forts, coudés, brun grisâtre ou brun clair. Lenticelles rondes et allongées, assez nombreuses, mi-saillantes ; yeux détachés. Boutons moyens ou petits, pointus.

Feuilles assez grandes, elliptiques-allongées, épaisses, coriaces, luisantes, un peu creusées, légèrement arquées ; dents peu profondes mi-aiguës ; pétiole long, fort. Stipules développées.

Variété d'amateur.





Légi pont


Syn. : *Fondante de Charneux* ; *Délices des Charmeuses* ; *Waterloo* ; *Fondante des Carmes* ; *Désirée Van Mons*.

4 5
5.195.391
4 82 7
6

Fruit surmoyen rétréci aux deux extrémités, un peu étranglé et bosselé au pourtour. Épiderme mi-lisse, mince, jaune citrin, abondamment et finement pointillé de roux, un peu maculé de fauve aux extrémités ou au pourtour, parfois rose cuivré à l'insolation. Pédicelle mi-long, mi-grêle, arqué, presque à fleur de peau; au pied d'une gibbosité. Œil moyen ou assez grand, ouvert, sépales mi-charnus, dressés, dans cuvette étroite peu profonde ou même superficielle, plissée et parfois côtelée. Chair blanche ou blanchâtre, fine ou mi-fine, fondante, sucrée, juteuse. Bonne.

Arbre moyennement vigoureux, érigé, assez fertile. Rameaux brun-verdâtre; lenticelles allongées, très visibles, assez nombreuses. Yeux petits, courts, légèrement écartés du rameau. Feuilles petites, elliptiques, allongées, minces, à pointe plus ou moins développée; dents peu profondes; pétiole grêle.

Variété belge, de commerce et d'amateur.



Colmar d'Arenberg

Syn. : *de Kartoffel*.

4
55 4
5.199.891
387 969

Fruit gros au très gros. Épiderme jaune d'ocre abondamment lavé ou voilé de roux, un peu rougeâtre

à l'insolation. Pédicelle fort ou charnu, dans cuvette nulle ou peu profonde et bosselée. Œil moyen ou assez gros, mi-ouvert, dans cuvette profonde à bord ondulé. Chair blanche fréquemment, pierreuse ; bonne.

Arbre vigoureux, fertile. Rameaux gros, courts, brun-jaunâtre. Lenticelles nombreuses. Yeux gros, pointus, écartés. Feuilles grandes, ovales ou arrondies. Dents aiguës profondes.


Variété d'amateur et d'apparat; à greffer indistinctement, sur franc ou sur cognassier ; formes basses sensible à la tavelure.

Bergamote Crassane

Syn.: *Crassane* ; *Beurré plat* ; *Poire plate*.

5.229.696


356 86



Fruit moyen. Épiderme mi-rugueux, chagriné, jaunâtre, ponctué de fauve. Pédicelle mi-grêle renflé aux extrémités, dans cuvette mi-évasée, largement lavée de roux, plissée. Œil petit, mi-ouvert ou clos, dans cuvette peu profonde, large, à bord ondulé. Chair blanc-jaunâtre très juteuse, sucrée, acidulée, bien parfumée, parfois astringente. Bonne ou très bonne.

Arbre vigoureux, divergent, moyennement fertile. Rameaux assez longs, de moyenne grosseur, brun-jaunâtre. Lenticelles ovales, grises. Yeux petits, légèrement écartés. Feuilles moyennes ou assez grandes, épaisses, ovales, vert clair, planes. Dents arrondies. Boutons petits. Fleurs de moyenne grandeur, mi-tardives.

Variété d'amateur et de commerce ; à tailler long, en ménageant les brindilles ; sensible à la tavelure ; à cultiver en espalier.



Doyenné gris

Syn. : *Doyenné roux* ; *Doyenné Galleux* ; *Saint-Michel gris* ; *Saint-Michel crotté*.

5.311.831

4

Fruit moyen. Épiderme lisse, épais, jaune doré pointillé de gris, abondamment taché, marbré de gris-roux. Pédicelle gros, dans cuvette moyennement profonde. Œil moyen, mi-ouvert, dans cuvette peu profonde. Chair blanche, sucrée, parfumée, fondante ; très bonne.

Arbre moyennement vigoureux, érigé, moyennement fertile. Rameaux de longueur et de force moyennes, brun-violacé. Lenticelles rondes ou ovales, grisâtres. Yeux petits, mi-écartés. Feuilles petites, elliptiques, presque planes, vert franc. Dents grandes, peu profondes, obtuses. Boutons moyens, coniques.

Variété pour amateur ; sensible à la tavelure ; à greffer sur franc ; à cultiver en espalier.



Maude

7 9
5.343.396
256 24

Fruit petit, légèrement éperonné. Épiderme épais, rugueux, jaune grisâtre, teinté de fauve aux deux extrémités, frappé de rouge terne, couvert de nombreux petits points fauves. Pédicelle fort, assez long, charnu à l'extrémité, souvent garni de petites verrues, implanté à fleur de peau ou dans légère cuvette bosselée. Œil grand, ouvert, dans cuvette peu profonde, étroite, à bord ondulé. Chair jaunâtre, ferme, un peu cassante, juteuse et âpre. Mauvaise pour la table.


Arbre très vigoureux, élancé, aux branches retombantes sous la charge des nombreux fruits. Rameaux gros et longs, brun clair. Lenticelles abondantes, grisâtres. Yeux gros,

écartés. Boutons moyens, allongés, à pointe aiguë, terminant souvent les brindilles. Feuilles grandes, elliptiques, à pointe aiguë, planes, rudes au toucher, vert foncé luisant. Dents arrondies ou obtuses.

Variété à cidre ; recommandable pour routes et en pépinière, pour jouer le rôle d'intermédiaire.

La France


6
2 85
5.357.131
1 9 646



Fruits surmoyens, de forme irrégulière, attachés par 2, 3 et 4. Épiderme mince, jaune clair abondamment et finement pointillé, rouillé aux extrémités ; parfois largement bronzé. Pédicelle fort ou charnu, oblique, à fleur de peau ou dans légère cuvette bosselée. Œil petit ou moyen ; clos ou mi-clos, dans cuvette étroite et plissée. Chair blanchâtre ou verdâtre, fine, fondante, sucrée, juteuse, un peu granuleuse. Bonne.

Arbre de vigueur modérée, étalé ou légèrement pleureur, assez fertile. Rameaux demi-forts, ramifiés, brun-rougeâtre. Yeux courts, appliqués. Lenticelles très petites, rondes, grises. Feuilles petites, ovales, un peu creusées, vert brillant. Boutons petits. Fleurs moyennes, mi-hâtives.

Variété d'amateur ; sensible à la tavelure et aux gros hivers.

**Kiefer Seedling**


5.357.732

6

Fruit moyen. Épiderme lisse, jaune clair, abondamment pointillé de gris, plus ou moins rouillé, soit aux extrémités, soit ailleurs, frappé ou même strié de rouge à l'insolation. Pédicelle gros, assez court, droit ou oblique, à fleur de peau ou dans cuvette peu profonde à bord ondulé. Œil mi-ouvert ou mi-clos, sous-moyen, dans cuvette peu profonde, étroite, plissée ou ondulée. Chair blanche, tendre, peu sucrée, acidulée, souvent médiocre.

Arbre vigoureux sur franc, de moyenne vigueur sur cognassier, mi-érigé, fertile. Rameaux moyens, brun clair, droits. Lenticelles allongées, très visibles, mais peu saillantes. Yeux brun foncé, appliqués. Boutons petits fusiformes, brun foncé. Feuilles grandes, ovales-aiguës, lisses, épaisses, à peine creusées ; dents peu profondes, obtuses ; pétiole gros, court.

Variété pour amateur.

**Doyenné Guillard**

3

5.376.681

184 84


Fruit, gros ou très gros. Épiderme lisse, jaune citrin, abondamment bronzé ou rouillé, y compris le voisinage du pédicelle, parsemé de petits points roux clair. Pédicelle charnu, le plus souvent à fleur de peau. Œil moyen, ouvert, dans cuvette à bord presque régulier. Chair blanche, sucrée. Bonne ou très bonne.

Arbre vigoureux, assez fertile. Rameaux brun-clair coudés ; mérithalles mi-courts. Lenticelles petites, rondes, mi-saillantes. Yeux ovoïdes mi appliqués. Feuilles moyennes elliptiques, à pointe très courte, presque planes, vert foncé, mi-parcheminées ; dents peu profondes, obtuses ; pétiole grêle de 2 centimètres. Bouton petit, aigu.

Variété d'amateur.

Bonne de Beugny


5 7 8
5.396.691
44 964



Fruit, assez, gros. Épiderme rugueux, jaune clair abondamment pointillé, parfois frappé de rose, mais presque entièrement bronzé. Pédicelle charnu, à fleur de peau. Œil moyen, ouvert, dans cuvette peu profonde, évasée, à bord ondulé. Chair blanche croquante, juteuse, sucrée, sans parfum spécial, un peu verdâtre sous l'épiderme. Bonne.

Arbre vigoureux, mi-érigé, fertile. Rameaux moyens, coudés, brun-violacé. Lenticelles moyennement abondantes, rondes. Yeux petits, pointus, écartés. Feuilles petites, allongées, plissées, brillantes. Dents abondantes, bien marquées. Boutons petits, marron, aigus.

Variété pour amateur ; peu sensible à la tavelure ; toutes formes naines.




Martin Sec

Syn. : *De Saint-Martin* ; *Rousselet d'hiver*.

5
6.122.994
7 15 856

Fruits petits, souvent par 2. Épiderme mince, bronzé, plus ou moins doré ou lavé de rouge sombre ponctué de gris au soleil. Pédicelle long, à fleur de peau. Œil moyen ou grand, ouvert ou mi-ouvert, sépales charnus, dans cuvette peu profonde, évasée, et entourée de bosses. Chair jaunâtre, cassante, sucrée, agréablement parfumée. Bonne.

Arbre vigoureux, fertile. Rameaux moyens, coudés, rougeâtres. Lenticelles petites, saillantes. Yeux moyens ou petits, coniques, écartés. Feuilles moyennes, ovales ou arrondies, vert foncé. Dent aiguës. Variété d'amateur et d'industrie (confiserie) ; à greffer sur franc, pour tige ; résistante à la tavelure.



Beurré gris d'Enghien


85 34
6.141.793
72 22
4

Fruit surmoyen. Épiderme épais, rugueux, jaune citrin ou foncé, plus ou moins taché de roux aux extrémités, un peu marbré de même au pourtour, abondamment mais irrégulièrement et finement pointillé de brun ; légèrement rose à l'insolation. Pédicelle long, fort, à fleur de peau, un peu renflé aux extrémités. Œil grand, ouvert en étoile, affleurant ou dans cuvette peu profonde, lisse ; sépales larges et rigides. Chair blanche, ferme, peu juteuse, un peu

granuleuse au centre ; loges et pépins très menus. Médiocre pour la table, mais bonne à cuire. Arbre de moyenne vigueur.

Merveille Ribet

83 1
6.141.943
77 82
4 9



Fruits gros, attachés par 2 et 3. Épiderme épais, mi-rugueux, bronzé, plus ou moins foncé, cuivré ou légèrement rouge à l'insolation. Pédicelle gros, renflé à l'extrémité, à fleur de peau ou dans cuvette très faible, bosselée. Œil moyen, entrouvert, aux sépales mi-charnus, dans cuvette peu profonde, plissée, un peu ondulée. Chair jaunâtre tendre, fine, sucrée. Bonne ou très bonne.


Arbre vigoureux. Assez fertile. Rameaux gros, mi-courts, gris-verdâtre. Lenticelles grosses, rondes et elliptiques, jaunâtres, peu nombreuses. Yeux larges, écartés. Feuilles grandes allongées, vert franc, luisantes, légèrement creusées. Dents peu profondes, fines, serrées. Boutons moyens, courts, obtus.

Excellente variété d'amateur et de commerce.

Bonne de Malines

Syn. : *Colmar Nélis* ; *Nélis d'hiver* ; *Beurré de Malines*.

9
18 6
6.144.841
355 936
7




Fruit moyen ou surmoyen. Épiderme mi-lisse, mi-épais, jaune-verdâtre frappé ou non de rouge, largement plaqué et pommelé de fauve et à peine pointillé de gris foncé. Pédicelle

fort, dans cuvette nulle ou petite, étroite et gibbeuse. Œil moyen ou assez gros, ouvert, dans cuvette large, peu profonde à bord uni. Chair blanchâtre, sucrée à peine acidulée, très juteuse, fine ; à peine granuleuse au centre et bien parfumée, parfois un peu musquée. Très bonne.

Arbre de vigueur modérée. Rameaux moyens, érigés, brun-jaunâtre. Lenticelles saillantes, arrondies. Yeux moyens, aigus, écartés. Feuilles petites, elliptiques-lancéolées, vert brillant. Dents fines, peu profondes. Boutons moyens, aigus.

Variété d'amateur ; sujette au chancre, et très peu à la tavelure. Tous porte-greffes ; toutes formes.



Beurré Rance

Syn. : *Beurré d'hiver* ; *Beurré d'Hardenpont de Printemps* ; *Bon Chrétien de Rance* ; *Beurré de Noirchain* ; *Beurré de Pentecôte* ; *Beurré du Rhin*.

3

6.145.595

52 6 1

Fruit gros ou surmoyen. Épiderme rude, épais, vert terne, bronzé, ponctué et fortement marbré de gris clair, maculé de fauve autour de l'œil et du pédicelle. Pédicelle fort, renflé à son extrémité, dans cuvette rarement profonde à bord accidenté. Œil moyen, mi-clos, dans faible cuvette. Chair blanc-verdâtre, juteuse, granuleuse au centre, parfumée, parfois légèrement âpre. Assez bonne (à la main) ; bonne, cuite.


Arbre d'assez faible vigueur ; fertilité un peu insuffisante. Rameaux étalés. Lenticelles peu nombreuses, petites. Yeux moyens, ovoïdes, duveteux. Feuilles elliptiques. Dents profondes.

Variété d'amateur ; à deux fins.

Doyenné d'Alençon

Syn. : *Doyenné d'hiver nouveau* ; *Doyenné gris d'hiver nouveau* ; *Doyenné Marbré* ; *Saint-Michel d'hiver*.

4
6.149.796
7 27 84




Fruit moyen. Épiderme assez épais, rude, jaune, abondamment pointillé de gris ; plus ou moins voilé de fauve ou de roux, légèrement frappé de rose. Pédicelle gros à fleur de peau ou dans légère cuvette à bord ondulé. Œil petit, ouvert dans faible cuvette, étroite, plus ou moins ondulée. Chair jaunâtre, sucrée, acidulée, fondante. Très bonne. Blettit assez facilement.

Arbre moyennement vigoureux, érigé, moyennement fertile. Rameaux sous-moyens, brun-jaunâtre. Lenticelles fines, rondes, demi-saillantes, grisâtres. Yeux ovoïdes, écartés. Feuilles moyennes, elliptiques, planes ou arquées, vert franc. Dents obtuses. Boutons petits, obtus.

Variété d'amateur ; très sujette à la tavelure ; à greffer de préférence sur franc.

Louis Pasteur

7
6.151.891
3 3 68
4




Fruit moyen. Épiderme lisse, jaune doré presque entièrement bronzé. Pédicelle fort, renflé aux extrémités, implanté à fleur de peau ou dans cuvette irrégulière. Œil moyen, ouvert, dans cuvette peu profonde, large, régulière. Chair blanche, juteuse, sucrée, acidulée, musquée, fondante. Bonne.

Arbre peu vigoureux sur cognassier ; fertile. Rameaux

moyens, coudés, rougeâtres. Yeux courts appliqués. Lenticelles peu nombreuses, fines, rondes. Feuilles petites, allongées, vertes, luisantes, légèrement arquées. Dents peu profondes, obtuses. Bouton assez gros, ovoïde, aigu.

Variété d'amateur.



Passe-Colmar

Syn. : *Ananas d'hiver* ; *Fondante de Paris* ; *Impératrice* ; *Passe Colmar doré* ; *Passe Colmar tardif*.

6 56
6.152.791
85 64


Fruits moyen sou sous-moyens, souvent attachés par 2 ou 3. Épiderme rude, jaune citrin taché ou marbré de roux, souvent teinté de rouge carmin. Pédicelle moyen, prolongeant le fruit. Œil grand, ouvert, dans cuvette superficielle ou peu profonde. Chair blanche, juteuse, sucrée, agréablement parfumée. Très bonne.

Arbre moyennement vigoureux, mi-étalé, fertile. Rameaux moyens ou grêles, brunâtres. Mérithalles courts. Lenticelles peu abondantes, rondes, gris-jaunâtre, non saillantes. Yeux courts, aigus, écartés. Feuilles petites, elliptiques-allongées, planes ou mi-creusées, lisses, peu épaisses, vert gai. Dents aiguës, peu profondes. Boutons moyens, pointus.

Variété d'amateur ; souvent sujette à la tavelure ; se prête à toutes formes.

Duchesse de Mouchy

84 26
6.153.594
7 341 641




Fruits moyens ou surmoyens, isolés ou par 2 et 3. Épiderme jaune citrin, mi-mince, mi-lisse, fortement lavé de roux vers le pédicelle, souvent voilé ou marbré de même au pourtour, garni de nombreux petits points bruns. Pédicelle assez fort, à fleur de peau ou dans cuvette superficielle, gibbeuse ou bosselée. Œil petit, ouvert ou mi-ouvert, dans cuvette étroite, peu profonde ; sépales assez longs. Chair blanchâtre, ferme, fine, serrée, parfumée et sucrée. Bonne.

Arbre de vigueur moyenne, mi-érigé, moyennement ou assez fertile sur franc. Rameaux assez courts, bruns. Yeux courts, moyens, coniques, légèrement détachés du rameau. Lenticelles petites, rondes. Feuilles petites, elliptiques, planes bien nervées, luisantes. Dents peu profondes, obtuses. Boutons petits.

Variété d'amateur ; à greffer sur cognassier ; à conduire en petite forme.

Ministre Viger

6.154.284
41 6



Fruit moyen. Épiderme lisse, jaune doré, légèrement frappé de rose ; teinté de fauve autour du pédicelle ; finement pointillé de roux. Pédicelle fort, implanté à fleur de peau. Œil moyen, mi-ouvert, dans cuvette peu profonde, entourée de bosses. Chair blanche ; bonne.

Vercier. — *Comment reconnaître les fruits.*


Arbre moyennement vigoureux, érigé, moyennement fertile. Rameaux gros, rouge violacé. Lenticelles rares, allongées. Yeux moyens, écartés. Feuilles moyennes, rudes au toucher, elliptiques, vert foncé. Dents obtuses. Boutons moyens, obtus.

Variété d'amateur

Saint-Germain d'hiver

Syn. : *Saint-Germain vert*.

4 6
6.154.791
5 85 65




Fruits moyens attachés par 2, 3 ou 4. Épiderme épais, rugueux, jaune citrin clair, finement pointillé de gris, légèrement rosé, parfois marbré de gris ou de roux. Pédicelle gros à son extrémité, implanté à fleur de peau. Œil moyen ou assez grand, ouvert, dans cuvette étroite, peu profonde, bosselée au pourtour. Chair blanche, mi-tendre, juteuse, sucrée, graveleuse au centre. Bonne.

Arbre peu vigoureux, mi-érigé, peu fertile. Rameaux moyens, brun clair. Lenticelles rares, rondes, blanchâtres. Yeux moyens, coniques, écartés. Feuilles petites, vert gai, légèrement arquées. Dents obtuses.

Variété d'amateur ; sujette à la tavelure ; convient pour espalier ; exige un terrain sain.

Madame Ballet


2
71 68
6.154.791
7 45 246
87 3



Fruits gros ou surmoyens, attachés par 1, 2 ou 3. Épiderme mi-mince, mi-rude, jaune clair, finement et abondamment pointillé de gris, parfois marbré de fauve au pourtour, mais toujours maculé aux extrémités ; généralement un peu frappé de rose. Pédicelle gros, renflé à son extrémité ; à fleur de peau ou dans légère cuvette à pourtour bosselé. Œil petit, ouvert, dans cuvette peu profonde, légèrement bosselée ; sépales mi-charnus à la base. Chair blanchâtre et jaune au centre, fine, serrée quoique fondante, juteuse, sucrée, légèrement parfumée ; très bonne ou bonne.

Arbre assez vigoureux sur cognassier, érigé, mi-fertile. Rameaux longs, assez forts, brunâtres. Lenticelles moyennement nombreuses, petites, rondes, gris-jaunâtre, saillantes, Yeux ovoïdes, appliqués. Feuilles moyennes, elliptiques lancéolées, un peu arquées, vert franc, luisantes. Dents peu profondes. Boutons assez gros, ovoïdes. Fleurs moyennes, mi-hâtives.

Variété de commerce et d'amateur ; toutes formes, surtout de contre-espallier ; assez résistante à la tavelure.




Beurré Vauban

6.155.781
394 4

Fruits assez gros, souvent réunis par 2. Épiderme mince, mi-rugueux, jaune clair abondamment pointillé de fauve, marbré de même, et brun-clair autour du pédicelle, légèrement frappé de rose. Pédicelle charnu, surtout à sa base, à fleur de peau. Œil petit, ouvert, dans cuvette moyennement profonde, à bord assez ondulé. Chair blanche, tendre, juteuse, parfumée, un peu granuleuse au centre. Bonne.

Arbre suffisamment vigoureux sur cognassier, mi-érigé, fertile. Rameaux faibles, coudés, brun rougeâtre. Lenticelles rares, petites, rondes. Yeux allongés, aigus, écartés. Feuilles grandes, elliptiques, convexes, et arquées, plissées, épaisses. Dents aiguës. Boutons petits, pointus, marron.

Variété pour amateur ; à tailler court; convient pour cordons et espaliers.



Doyenné de Montjean

Syn. : *Doyenné Perreau* ; *Doyenné gris de Montjean*.

1
6.159.731
7 346 4

Fruit surmoyen ou gros. Épiderme épais, rugueux, à fond jaune clair, régulièrement et abondamment pointillé, teinté de roux, y compris le tour du pédicelle, frappé de rouge terne. Pédicelle gros, court, droit, renflé à son extrémité, à fleur de fruit. Œil petit, clos ou mi-clos, aux sépales charnus, dans cuvette moyennement, profonde, étroite. Chair


blanche, un peu jaunâtre au centre, un peu graveleuse vers l'œil, mi-juteuse, finement parfumée. Bonne.

Arbre de vigueur et de fertilité moyennes. Rameaux de grosseur et de longueur moyennes, vert-jaunâtre, noueux. Mérithalles courts. Lenticelles abondantes, petites, rondes, jaunes. Yeux gros, pointus, très saillants. Feuilles petites, ovales, planes, vert clair. Bouton moyen.

Variété d'amateur; tous porte-greffes ; formes moyennes de préférence. A récolter tardivement.

Fondante Fougère


8 7
6.161.291
7 39 62



Fruit assez gros. Épiderme lisse, jaune pâle, finement pointillé de roux et marbré de même, teinté et frappé de rose carminé. Pédicelle gros, renflé aux extrémités, dans cuvette très superficielle à bord bosselé. Œil moyen, entr'ouvert, dans cuvette superficielle ou peu profonde, plissée ou légèrement bosselée. Chair blanche, fondante, juteuse, sucrée, agréablement parfumée ; très bonne.

Arbre peu vigoureux, mi-érigé, fertile. Rameaux gros, courts brunâtres. Lenticelles abondantes, rondes, grisâtres. Yeux gros, courts, écartés. Feuilles petites, elliptiques, vert foncé, lisses, étalées, légèrement convexes. Dents fines, obtuses. Boutons de volume variable.

Variété pour amateur, sujette à la tavelure. A cultiver en formes basses.



Zéphirin Grégoire

8
6.164.591
396 62

Fruit moyen ou surmoyen, asymétrique, ovoïde, ou rétréci, à contour irrégulier ou bosselé. Épiderme jaune verdâtre à l'ombre, jaune citrin au soleil, lisse, mi-mince, résistant, marbré et finement ponctué de roux, taché de brun autour du pédicelle. Pédicelle fort, assez long, renflé aux extrémités, arqué ou oblique, implanté à fleur de peau. Œil assez grand ou moyen, ouvert; sépales assez longs, parfois mi-charnus, dans cuvette peu profonde ou superficielle, lisse, mais à bord un peu mamelonné. Chair blanchâtre, mi-fine, sucrée, juteuse, un peu granuleuse au centre, parfois musquée. Bonne ou assez bonne.

Arbre de vigueur et de fertilité moyennes. Rameaux nombreux, mi-étalés, un peu coudés, jaune verdâtre. Lenticelles peu abondantes. Yeux gros coniques, allongés, écartés. Feuilles ovales-arrondies, à dents irrégulières.



Besi de Chaumontel

Syn. : *Beurré d'hiver*

54
6.165.693
9 66

Fruit gros ou surmoyen. Épiderme jaune doré, ponctué et marbré de fauve y compris le voisinage du pédicelle, frappé de rouge terne. Pédicelle fort, à fleur de peau. Œil grand, ouvert, aux sépales très réduits, dans cuvette à bord régulier et lisse. Chair blanche, juteuse, acidulée, pierreuse, mi-fine. Mi-cassante, bonne


Arbre assez peu vigoureux, moyennement fertile, mi-étalé. Rameaux grêles, rougeâtres. Lenticelles peu nombreuses, moyennes ou petites. Yeux courts, écartés. Feuilles ovales allongées, légèrement ondulées, vert jaunâtre, parfois légèrement lavées de rougeâtre. Dents profondes, aiguës.

Variété pour amateur ; à greffer sur cognassier, convient pour la haute tige et pour l'espalier.

Bon Chrétien d'hiver

Syn. : *Panchresta* ; *De Chrétien* ; *Bon Chrétien* ; *De Saint-Martin*.


55 5
6.168.292
7 97 761
8



Fruit gros ou surmoyen, de forme variable, finement ou grossièrement côtelé. Épiderme assez épais, jaune clair ou entièrement pointillé de brun pâle, quelquefois avec taches ou marbrures fauves ; frappé ou non d'orangé ou de rouge. Pédicelle mi-grêle, arqué ou contourné, assez long, renflé à l'extrémité, dans cuvette négligeable ou mi-profonde, mi-large, bosselée. Œil assez grand, parfois petit, ouvert ou mi-ouvert ; sépales mi-charnus dans cuvette plus ou moins profonde, étroite, à bord ondulé, ou parfois fortement gibbeux. Chair blanche, ou blanchâtre, mi-fondante ou mi-cassante, juteuse, parfois pierreuse ou avec zone jaunâtre. Passable crue ; bonne pour compote.

Arbre de faible vigueur sur cognassier. Rameaux gros, courts, brun clair ou brun roux. Lenticelles assez grosses, abondantes, rondes, gris-jaunâtre. Yeux gros, écartés. Feuilles ovales-allongées, aiguës, légèrement arquées. Pétiole long, fort.

Variété ancienne, d'amateur ; préfère le franc et l'espalier.

**Saint-Rémy**

3
6.181.494
7 3 4 46


Fruit surmoyen. de forme variable. Épiderme rude, épais, jaune terne, très légèrement verdâtre, abondamment et finement pointillé de brun ; plus ou moins taché ou un peu voilé de gris brun aux extrémités et au pourtour. Pédicelle fort, de moyenne longueur et arqué ou court, oblique, renflé aux extrémités ; implanté presque à fleur de fruit, au pied d'une gibbosité dans une cuvette superficielle ou petite. Œil grand, mi-clos, aux sépales courts, mi-charnus, presque à fleur de fruit ou dans cuvette très peu profonde, large et plissée. Chair blanc crème, veinée de jaune au centre, très pleine, granuleuse, croquante, peu ou mi-juteuse, mi-sucrée. Très bonne cuite.

Arbre très vigoureux, étalé, fertile. Rameaux longs, assez forts, brun-violacé foncé ; lenticelles rondes, assez nombreuses très apparentes, peu saillantes. Yeux assez développés, coniques, mi appliqués. Feuilles moyennes, ovales-arrondies à pointe aiguë, étalées, épaisses ; dents régulières, peu profondes, mi-aiguës.

Variété de bonne conservation ; à cuire. Bien connue et appréciée en Belgique.

Professeur Opoix

52
6.181.591
44 6



Fruit moyen. Épiderme mince, jaune lavé de brun autour du pédicelle, marbré de fauve, bronzé ou cuivré à l'insolation. Pédicelle fort ou grêle, à fleur de peau ou prolongeant le fruit. Œil moyen, ouvert, dans cuvette nulle ou peu profonde, à bord régulier. Chair blanche, juteuse, sucrée. Bonne.


Arbre vigoureux, érigé, moyennement fertile. Rameaux brun jaunâtre. Lenticelles peu nombreuses, rondes, petites, Yeux gros, allongés, écartés. Feuilles petites ou moyennes, légèrement creusées, un peu arquées. Dents très faibles, obtuses. Bouton moyen, allongé, à pointe aiguë.

Variété pour amateur; à greffer indistinctement sur franc ou sur cognassier, à conduire en formes naines.

Anna Audusson

Syn. : *Doyenné Anna Audusson*.

3 6
6.181.792
5 4 64
7



Fruits moyens, attachés par 2 ou 3. Épiderme lisse, jaune verdâtre, abondamment mais finement pointillé de roux, plus ou moins marbré de même, rarement frappé ou nuancé de rose. Pédicelle fort, renflé aux extrémités, arqué ou oblique, à fleur de peau ou dans cuvette faible ou bosselée. Œil moyen, ouvert ou mi-ouvert dans cuvette peu profonde, large. Chair blanche ou blanchâtre, tendre, fine, acidulée,

peu sucrée, granuleuse au centre, souvent, farineuse ; blettit assez vite ; assez bonne ou médiocre.


Arbre vigoureux, érigé, irrégulièrement fertile. Rameau moyens, gros, brun violacé. Lenticelles grosses, rondes ou mi-allongées, saillantes. Yeux ovoïdes, mi-appliqués. Feuilles sous-moyennes, ovales-elliptiques, lisses, épaisses, vert-franc, luisantes, un peu arquées. Dents peu marquées, obtuses. Pétiole grêle. Boutons petits, ovoïdes, brun-foncé.

Variété pour amateur.

Beurré Sterkmans

Syn.. : *Doyenné Sterkmans*.

41 2
6.182.392
5 358 6
7




Fruits moyens, souvent attachés par 2 ou 3. Épiderme rugueux, épais, jaune citrin, parfois taché de fauve vers le pédicelle. Abondamment et finement ponctué, fouetté, strié de rouge terne ou de rose vif. Pédicelle mi-grêle, dans cuvette peu profonde, presque inexistante, à bord accidenté. Œil petit ou moyen, à sépales courts, mi-charnus à la base, ouvert ou entrouvert dans cuvette peu profonde, large, un peu bosselée. Chair blanche, mi-fine ou fine, juteuse, acidulée ; assez bonne ou bonne.

Arbre de vigueur et de fertilité moyennes, érigé. Rameaux assez gros, longs, brun-rougeâtre. Lenticelles rondes et elliptiques, assez grosses, nombreuses, jaunâtres. Yeux gros, coniques ou globuleux, écartés. Feuilles moyennes, luisantes, elliptiques. Dents peu profondes, arrondies ou à peine marquées ; pétiole grêle. Boutons gros, ovoïdes, brun foncé

Variété d'amateur ; sujette à la tavelure.

Président Drouard


7 13
6.188.241
354 79



Fruits gros ou surmoyens, isolés ou par 2. Épiderme rugueux, épais, jaune-verdâtre, finement pointillé de fauve, mais parfois marbré de roux et frappé de rose ou de rouge. Pédicelle fort, court, légèrement oblique, à peine arqué, renflé aux extrémités, tantôt à fleur de fruit, tantôt dans cuvette étroite, moyennement profonde, bossuée ou gibbeuse. Œil petit, ouvert, aux sépales mi-charnus, dans cuvette plus ou moins profonde, régulière. Chair blanche, ou blanchâtre, grossière, juteuse, sucrée, agréablement parfumée, fine, fondante ; loges assez grandes ; pépins gros, brun foncé. Très bonne ou bonne.

Arbre peu vigoureux sur cognassier ; moyennement fertile. Rameaux mi-courts, brun-jaunâtre. Lenticelles grosses, longues et rondes, blanc-grisâtre. Yeux petits, courts, appliqués. Feuilles assez grandes, elliptiques, presque étalées ou un peu arquées, épaisses, vert-clair, luisantes. Dents grandes. Boutons assez gros, mi-allongés, marron. Fleurs hâtives.

Variété d'amateur ; sujette à la tavelure ; à tailler normalement.



Nouvelle Fulvie

86
6.192.781
65 946

Fruit moyen. Épiderme fin, lisse, jaune citrin, lavé de roux autour du pédicelle, finement pointillé et plus ou moins voilé de roux, parfois presque bronzé et teinté de rougeâtre à l'insolation. Pédicelle charnu à la base, prolongeant le fruit. Œil moyen, ouvert, dans faible cuvette étroite, à bord ondulé. Chair blanc-jaunâtre, juteuse, sucrée, parfumée ; très bonne.

Arbre d'assez faible vigueur, moyennement fertile. Rameaux brun rosé ou brun-jaunâtre, assez grêles. Lenticelles ovales et rondes, saillantes. Yeux gros et détachés. Feuilles petites, ovales ou elliptiques, planes. Dents arrondies ou obtuses.

Variété d'amateur ; à greffer sur franc pour grandes et moyennes formes ; tailler assez long les premières années.



Virgouleuse

Syn. : *Chambrette* ; *de Glace* ; *Paradis d'hiver* ; *Virgoulette*.

6.194.691
5 3 6

Fruit moyen. Épiderme lisse, onctueux, brillant, verdâtre, finement pointillé et un peu marbré de brun, frappé de rouge. Pédicelle un peu charnu à sa base, à fleur de peau. Œil petit, ouvert ou mi-clos, dans cuvette très superficielle, large, plissée. Chair blanchâtre ou jaunâtre, sucrée, mi-fondante ; très bonne.

Arbre assez vigoureux sur cognassier, moyennement fertile. Rameaux érigés, moyens, gris-violacé. Lenticelles assez nombreuses, rondes. Yeux courts, écartés. Feuilles moyennes.

ovales, luisantes, parfois convexes, vert gai. Dents fines, aiguës.

Variété d'amateur; un peu sujette à la tavelure ; à greffer sur cognassier ou même à surgreffer ; petites formes de préférence, voire même cordon.

Beurré Dubuisson


6.194.841


8 98

Fruit assez gros, asymétrique. Épiderme mi-épais, mi-rugueux, à fond, jaune clair, abondamment voilé, ponctué et taché de rouille squameuse, y compris tout le voisinage du pédicelle ; parfois un peu cuivré au soleil. Pédicelle gros, court, oblique, rarement charnu, au pied d'un éperon, dans une faible cuvette ou en prolongement du fruit. Œil moyen ou assez grand, mi-clos, dans cuvette peu profonde, large et à bord côtelé. Chair blanche, sucrée, mi-fine, un peu graveleuse autour des loges, juteuse, parfumée. Très bonne.

Arbre vigoureux, moyennement ou peu fertile. Rameaux de moyenne force, coudés, brun-clair ; lenticelles moyennement allongées, grosses, saillantes, jaunâtres. Yeux ovoïdes, appliqués. Feuilles moyennes, ovales, planes ou légèrement arquées, vert franc brillant ; dents peu profondes arrondies ; pétiole long, grêle. Bouton moyen, obtus.

Variété pour amateur.




**Directeur Alphand**

6
6.195.736
7 84 4

Fruit très gros ou gros et bossué. Épiderme jaune abondamment pointillé de gris, frappé de rouge. Pédicelle gros, renflé aux extrémités, parfois charnu à la base. Œil petit, fermé, dans cuvette moyennement profonde, étroite, plissée et côtelée. Chair jaunâtre. Assez bonne.

Arbre assez vigoureux, moyennement fertile. Rameau jaunâtres. Lenticelles allongées, grisâtres. Yeux coniques, aigus, écartés. Feuilles moyennes ou petites, en gouttière. Dents nulles ou peu marquées.

Variété d'apparat et d'amateur, petites ou moyennes formes ; sur cognassier de préférence.

**Dorset**

6
2 6
6.195.793
7 388 641
3

Fruit gros. Épiderme mi-mince, mi-rugueux, jaune clair à l'ombre et doré au soleil, assez fortement voilé de rouille, abondamment et finement pointillé de roux, frappé, de rose cuivré ou de rouge sombre à l'insolation. Pédicelle fort, renflé à l'extrémité, à fleur de peau, au pied d'un éperon ou dans petite cuvette étroite, mamelonnée ou gibbeuse. Œil petit, clos ou mi-clos, aux sépales mi-charnus, dans cuvette superficielle ou peu profonde, étroite, à peine ondulée. Chair


blanchâtre, veinée de jaune, peu juteuse, fine, fondante, un peu sucrée, sans parfum spécial. Assez bonne.

Arbre de vigueur moyenne, mi-érigé, fertile. Rameaux forts, brun clair. Lenticelles peu nombreuses, petites, rondes. Yeux courts, écartés. Feuilles elliptiques, vert franc, parcheminées, un peu creusées ou arquées. Dents peu profondes, obtuses. Boutons petits.

Variété d'amateur.

Prince Napoléon

87
6.196.941
7 364 89
9



Fruit moyen, asymétrique. Épiderme mi-épais, rugueux, à fond jaune clair ou jaune d'or presque entièrement bronzé ou brun, teinté ou non de rouge brun à l'insolation. Pédicelle gros, renflé à son extrémité, à fleur de peau ou appuyé par une gibbosité, rarement dans une cuvette bossuée. Œil assez grand, entr'ouvert, dans cuvette large peu profonde, cernée de bosses ; sépales généralement charnus et menus. Chair blanchâtre ou blanc-jaunâtre, un peu granuleuse au centre, tendre, juteuse, fondante, sucrée, parfumée. Bonne, mais blettissant assez vite.

Arbre de vigueur modérée. Rameaux bruns ; lenticelles petites, rondes, jaunes. Yeux allongés, pointus, très détachés. Feuilles moyennes ou sous-moyennes, elliptiques-allongées, lisses, planes, mi-aiguës ; dents à peine marquées ; pétiole grêle. Bouton moyen, ovoïde.

Variété d'amateur.



Belle sans pépin de Riha

6.198.743


664



Fruit assez gros, asymétrique. Épiderme rugueux, jaune maculé de brun vers le pédicelle et au pourtour, abondamment pointillé de roux au soleil et légèrement nuancé de rose à l'insolation. Pédicelle court, oblique, mi-ligneux, dans faible cuvette, au pied d'une légère gibbosité. Œil moyen mi-ouvert ou mi-clos, sépales charnus à la base, dans cuvette étroite, peu profonde, à bord inégal. Chair blanche, grossière, mi-ferme, cassante, mi-juteuse, un peu granuleuse autour des loges, sucrée ; assez bonne crue ; bonne cuite.

Arbre de vigueur modérée, fertile. Rameaux peu nombreux, mi-gros, mi-courts, bruns. Lenticelles rondes ; yeux ovoïdes, coniques, brun foncé, écartés. Boutons assez gros, effilés, brun foncé. Feuilles moyennes, elliptiques ou ovales-elliptiques, mi-rigides, presque planes ; pétiole grêle, long.

Variété pour amateur.



Bergamote Sannier

8

6.239.881

7 26 63




Fruit moyen. Épiderme rude, jaune, abondamment marbré et taché de roux, y compris les extrémités. Pédicelle gros, charnu ou très renflé à l'extrémité, dans cuvette peu profonde, étroite, ondulée. Œil moyen, ou assez grand, entr'ouvert, dans cuvette mi-profonde, mi-étroite, ondulée. Chair blanche, juteuse, très bonne.

Arbre vigoureux, assez érigé, fertile. Rameaux moyens, coudés, brun-rosé. Lenticelles fines, rondes. Yeux coniques, détachés. Feuilles moyennes, elliptiques-allongées, vert foncé, épaisses. Dents arrondies ou obtuses. Boutons courts, petits. Variété d'amateur.

Joséphine de Malines

751
6.268.596
7 387 267




Fruit petit ou moyen. Épiderme assez épais, jaune citrin, pointillé de rouille à l'insolation et vers le pédicelle, marbré de brun fauve, teinté de jaune cuivré au soleil. Pédicelle assez gros, renflé aux extrémités, dans légère cuvette bosselée. Œil petit, ouvert, dans légère cuvette évasée. Chair blanc-jaunâtre ou blanc-rosé, très fine, fondante, sucrée, parfumée, très juteuse, très bonne.

Arbre peu vigoureux, mi-étalé, peu fertile. Rameaux moyens, assez courts, rougeâtres. Lenticelles peu nombreuses, très petites, rondes. Yeux ovoïdes, appliqués. Feuilles petites, elliptiques, terminées en pointe. Dents peu profondes, fines, aiguës. Boutons petits, courts. Fleurs moyennes, tardives.

Variété d'amateur ; à tailler long en conservant les brindilles ; à greffer sur franc ou sur cognassier.

Bergamote La Gantoise

6.286.592
3 4 68




Fruits moyens généralement isolés, quelquefois par 2. Épiderme jaune doré grossièrement ponctué de brun plus ou moins abondamment bronzé, tigré ou veiné de fauve. Pédicelle fort ou charnu implanté à fleur de peau, renflé aux extrémités. Œil petit ou moyen, ouvert, dans cuvette peu profonde, plissée, à bord ondulé. Chair blanche acidulée. Bonne.

Arbre moyennement vigoureux, mi-érigé, moyennement

fertile. Rameaux moyens, brun jaunâtre. Lenticelles nombreuses, rondes. Yeux moyens, pointus, écartés. Feuilles petites, elliptiques-lancéolées, planes, mi-souples, vert clair. Boutons courts, menus.

Variété d'amateur ; sensible à la tavelure. A cultiver en moyennes formes.



Bergamote dorée


Syn. : *Bergamote rouge*.

6.289.731
5 5 64
8

Fruits moyens, par 2 et 3. Épiderme lisse, jaune foncé, assez fortement marbré de fauve, pointillé et souvent lavé de brun fauve, au pourtour et aux extrémités, frappé ou non de rose. Pédicelle assez gros dans petite cuvette étroite, à bord ondulé. Œil petit, ouvert, dans cuvette assez large. Chair blanche, fondante, juteuse, sucrée, parfumée ; bonne ou très bonne.

Arbre de vigueur modérée, mi-étalé, assez fertile. Rameaux sous-moyens, coudés, bruns. Lenticelles peu nombreuses, petites, rondes. Yeux petits, coniques, écartés. Feuilles petites, ovales-allongées, aiguës, creusées. Dents nombreuses, bien marquées, aiguës. Boutons petits.

Variété d'amateur ; peu sujette à la tavelure ; à tailler court.



Bergamote Philippot

5
4
6.316.716
229 53

Fruits sur-moyens, isolés ou par 2. Épiderme lisse, mais rude, jaune, frappé de rose cuivré à l'insolation, assez fortement lavé de brun autour du pédicelle et marbré de même


au pourtour et vers l'œil. Pédicelle fort, de moyenne longueur, oblique, ou arqué, renflé à une ou aux deux extrémités, implanté parfois à fleur de fruit ou dans légère cuvette ; parsemé de petits points gris brun. Œil grand, ouvert, dans cuvette moyennement ou très peu profonde, évasée, à bord régulier. Chair un peu jaunâtre, fine, mi-juteuse, granuleuse ; bonne.

Arbre vigoureux sur cognassier, moyennement fertile. Rameaux brun clair, érigés. Lenticelles rondes ou peu allongées, saillantes, grisâtres. Yeux courts, coniques, un peu détachés. Feuilles moyennes ou petites, elliptiques, arquées ou convexes. Dents régulières, obtuses ou mi-aiguës, pétiole fin, stipules fines et longues. Bouton moyen, marron.

Variété pour amateur.

Suzette de Bavay


67 5
6.359.591
196 6
4



Fruit petit. Épiderme rugueux, jaune clair marbré de fauve y compris vers les extrémités, pointillé de verdâtre. Pédicelle gros à ses extrémités, dans cuvette profonde, large, plissée. Œil moyen, ouvert, dans cuvette à bord régulier ou ondulé. Chair blanche, parfumée, juteuse, assez bonne.

Arbre vigoureux, érigé, fertile ou moyennement fertile. Rameaux forts, coudés, brun-verdâtre. Lenticelles rares, rondes. Yeux écartés. Feuilles sous-moyennes, ovales-arrondies, vert clair, peu épaisses, planes. Boutons moyens.

Variété d'amateur.



Duchesse de Bordeaux

Syn. : *Beurré Perrault*.

49 2
6.377.891
183 743
6

Fruit moyen ou gros. Épiderme très rugueux, épais, jaune clair, légèrement teinté de rose clair ou saumon, rayé ou marbré de fauve, légèrement pointillé de roux. Pédicelle gros, surtout aux extrémités, dans cuvette très superficielle, large, ondulée. Œil moyen ou sous-moyen, mi-ouvert, dans cuvette peu profonde, large, à bord régulier ou peu ondulé. Chair blanchâtre, ferme, mi-sucrée, mi-juteuse, légèrement acidulée, finement parfumée, granuleuse. Assez bonne.

Arbre vigoureux sur cognassier, moyennement fertile. Rameaux gros et courts, brun-jaunâtre. Lenticelles assez nombreuses. Yeux gros, allongés, écartés. Feuilles moyennes elliptiques, vert gai, luisantes, mi-coriaces, à pointe obtuse, un peu tourmentées. Dents aiguës, peu profondes. Boutons moyens, ovoïdes.

Variété d'amateur ; à greffer de préférence sur franc.



Beurré de Luçon

Syn. : *Beurré d'hiver* ; *Doyenné Marbré* ; *Saint-Michel d'hiver du Loiret* ; *Beurré gris d'hiver nouveau* ; *Beurré gris de Luçon*.

6.393.941
191.835

Fruit gros. Épiderme peu épais, garni de gros points roux, marbré de fauve, frappé de rouge clair. Pédicelle gros dans cuvette peu profonde, large, à bord irrégulier. Œil petit,

ouvert, dans cuvette peu profonde à bord ondulé. Chair blanc-verdâtre, sucrée, acidulée, fondante ; bonne.

Arbre de vigueur moyenne ; fertilité suffisante, mi-étalé. Rameaux moyens, brun-foncé. Lenticelles rondes et longues. Yeux petits, appliqués. Feuilles moyennes, elliptiques, un peu creusées, vert-brillant. Dents peu profondes, obtuses. Boutons moyens, allongés.


Variété d'amateur ; peu sensible à la tavelure ; à greffer de préférence sur franc et à conduire en formes naines ; appliquer une taille courte.

Royale d'hiver

Syn. : *Duchesse de Montebello*.

6.398.396


5 6 65



Fruit gros. Épiderme rude, fin, jaune citrin, lavé de rouge, ponctué et rayé de roux fauve, largement maculé autour du pédicelle. Pédicelle mince, gros aux extrémités, dans cuvette bosselée. Œil moyen, ouvert dans cuvette large et irrégulière. Chair blanc-jaunâtre, juteuse, sucrée, acidulée, fine, fondante ; bonne.

Arbre vigoureux, étalé, peu ou moyennement fertile. Rameaux longs, gros, arqués, brun-violacé, ou verdâtre. Lenticelles assez nombreuses, apparentes, rondes, blanchâtres. Œil petit, ovoïde, écarté. Feuilles grandes, elliptiques, planes ou un peu plissées, vert foncé, luisantes, assez épaisses. Dents à peine marquées. Boutons petits.

Variété d'amateur ; sujette à la tavelure.




Triomphe de Tournai

9
7.151.671
6 4 43
4

Fruit moyen. Épiderme épais, très rugueux vert foncé, puis jaune verdâtre lavé ou plus ou moins plaqué de gris au pourtour. Pédicelle moyen, renflé à l'extrémité ou charnu, prolongeant le fruit, ou dans légère cuvette étroite. Œil ouvert ou mi-ouvert, sépales mi-charnus. Chair blanche, grossière autour des loges, sucrée, juteuse, fondante, bien qu'un peu ferme. Bonne.

Arbre peu vigoureux, érigé, peu fertile. Rameaux assez forts, brun-rosé. Lenticelles peu nombreuses, petite, ronde. Yeux saillants. Feuilles petites, ovales, aiguës, planes. Dent, fines, nombreuses. Boutons assez gros, pointus.

Variété d'amateur; sensible à la tavelure.



Beurré de Naghin

7
6
7.153.691
6 89 18
4

Fruits gros ou surmoyens, isolés ou par 2, ovoïdes, tronqués aux deux extrémités, ou parfois larges et rétrécis. Épiderme jaune citrin clair, mi-rugueux, assez abondamment pointillé de roux, marbré parfois de même et légèrement lavé de brun vers le pédicelle et l'œil. Pédicelle fort, renflé aux extrémités, inséré à fleur de peau ou dans légère cuvette côtelée. Œil moyen entr'ouvert, dans cuvette régulière, moyennement. profonde,


légèrement ondulée. Chair blanche, juteuse, tendre, un peu acidulée, peu parfumée. Assez bonne ou bonne.

Arbre vigoureux sur cognassier, érigé, fertile. Rameaux forts, demi-longs, brun-clair ou gris-verdâtre. Lenticelle moyennement nombreuses, rondes, non saillantes. Yeux gros, courts, détachés. Feuilles moyennes, elliptiques, vert foncé, planes ou convexes, lisses, luisantes, mi-rigides à pointe courte et arquée. Dents aiguës, peu marquées. Boutons courts, petits ou assez gros.

Variété d'amateur ; ne craint pas la tavelure ; à greffer sur cognassier ; à cultiver en formes naines.

Belle des Abrès


68 2
7.154.691
6 85 72



Fruits gros, isolés ou attachés par 2 ou 3, plus ou moins tronqués ou obtus, bosselés. Épiderme rude, jaune clair, plus ou moins marbré ou non de roux, abondamment et finement pointillé de roux, frappé de rose à l'insolation. Pédicelle fort, long, tantôt à fleur de peau, tantôt dans cuvette étroite, plissée et bosselée. Œil petit, ouvert, dans cuvette peu ou moyennement profonde, mamelonné au pourtour. Chair très blanche, sucrée, parfumée. Bonne.

Arbre de vigueur moyenne sur cognassier; moyennement fertile. Rameaux moyens brun-jaunâtre. Lenticelles rondes, jaunes. Yeux petits, pointus, bien détachés. Feuilles petites, arrondies, vert gai, semi-épaisses. Dents arrondies, pétiole court. Boutons moyens, aigus, brun clair.

Variété d'amateur et d'apparat ; à cultiver en formes moyennes.



Notaire Lepin


Syn. : *Doyenné Georges Boucher*.

17 64
7.154.894
6 348 723
8

Fruit surmoyen, conique-tronqué. Épiderme presque lisse, mi-épais, jaune, pointillé et marbré de roux ou de fauve, même autour du pédicelle, parfois rosé à l'insolation. Pédicelle assez long, fort, renflé à une ou à deux extrémités, dans cuvette superficielle ou un peu accentuée et bosselée. Œil petit presque clos, dans cuvette peu profonde, plissée. Chair blanche, très ferme, à grain grossier autour des loges, plus ou moins juteuse, légèrement parfumée. Assez bonne.

Arbre vigoureux, peu fertile sur franc, moyennement fertile sur cognassier. Rameaux brun-rougeâtre ou brun-grisâtre. Lenticelles demi-nombreuses, longues ou rondes, grisâtres Yeux courts, détachés. Feuilles ovales-elliptiques planes, assez grandes, à pointe très courte, vert-gai. Dents mi-aiguës, pétiole fort, rosé. Boutons moyens, aigus.

Variété d'amateur ; pour formes basses ; à greffer sur cognassier; à placer en espalier pour éviter la tavelure ; à tailler un peu long.



Doyenné Gabriel


2 6
7.157.241
3 3 7 2

Fruit moyen ou surmoyen. Épiderme très épais, mi-rugueux, légèrement pointillé et marbré de roux, frappé de rose à l'insolation. Pédicelle gros, renflé à l'extrémité, souvent implanté à fleur de peau. Œil moyen,

dans cuvette peu profonde, large, légèrement ondulée. Chair blanche, acidulée, sucrée, fondante. Bonne ou très bonne.

Arbre moyennement vigoureux. Rameaux forts, demi-courts, bruns. Lenticelles ovales et arrondies. Yeux courts, écartés. Feuilles petites ou moyennes, elliptiques-allongées, creusées, un peu arquées. Dents peu profondes, obtuses.

Variété d'amateur.




Alexandrine Mas

18 4
7.157.291
44 8
2

Fruit gros ou très gros. Épiderme rugueux, jaune citrin clair, abondamment et finement pointillé de brun, frappé de rose. Pédicelle fort, charnu à l'extrémité, dans cuvette superficielle ou moyennement profonde, évasée, bosselée. Œil petit, clos ou mi-clos dans cuvette peu profonde, bosselée. Chair blanche, juteuse, parfumée, très bonne.

Arbre vigoureux, assez fertile. Rameaux gros et longs brun-jaunâtre ou rougeâtres. Lenticelles nombreuses, petites rondes, blanchâtres. Yeux gros, écartés. Feuilles moyennes ovales, planes. Dents petites, aiguës. Boutons allongés terminant souvent les brindilles.

Variété d'amateur et d'apparat ; à greffer de préférence sur cognassier ; sensible à la tavelure.



Doyenné d'hiver


Syn. : *Beurré de Pâques* ; *Bergamote de Pentecôte* ; *Pastorale de Louvain*.

4 88
7.159.541
6 324 636
7

Fruit gros ou surmoyen. Épiderme assez rude, mi-épais, jaune clair, rouillé vers le pédicelle et l'œil, abondamment et finement pointillé de brun, parfois légèrement frappé de rose au soleil. Pédicelle gros, dans cuvette étroite, assez profonde, accidentée. Œil moyen ou assez gros, clos ou mi-clos, dans cuvette large, moyenne, à bord côtelé ; sépales parfois charnus. Chair blanche ou blanchâtre, fine, sucrée, juteuse, parfumée, parfois un peu granuleuse au centre. Très bonne.

Arbre de moyenne vigueur, mi-érigé, fertile. Rameaux moyens, rougeâtres. Mérithalles courts. Lenticelles rondes, mi-saillantes, grises. Œil court, conique, écarté. Feuilles moyennes, elliptiques, obtuses, creusées, légèrement arquées, un peu plissées, vert-clair. Dents aiguës ou obtuses. Boutons petits. Fleurs nombreuses, moyennes, hâtives.

Variété de commerce ; gagne à être surgreffée ; sujette à la tavelure ; à placer en espalier.



Sénateur Belle

4 3
7.159.791
83 64
6

Fruit moyen ou surmoyen, ovoïde ou légèrement rétréci, plus ou moins symétrique. Épiderme rugueux, épais, jaune clair, abondamment recouvert de marbrures rouillées et rugueuses. Grossièrement ponctué de brun ; nuancé ou non

de rose à l'insolation ; rarement maculé dans les cuvettes. Pédicelle fort, arqué ou oblique, renflé à l'extrémité, dans cuvette plutôt superficielle, large et mamelonnée. Œil assez grand, ouvert ou mi-ouvert; sépales courts et charnus, dans cuvette presque superficielle, large, à bord un peu mamelonné. Chair blanchâtre grossière, sucrée, peu juteuse. Bonne.

Arbre de vigueur moyenne ou faible sur cognassier, érigé. Rameaux moyens, longs, gris. Lenticelles rondes, débordantes. Yeux petits, appliqués. Feuilles sous-moyennes, allongées, creusées et fortement arquées, vert clair, brillantes ou lisses, teintées généralement de rose en automne.

Variété de collection et d'amateur.

Belle Angevine


Syn. : *Belle de Jersey* ; *Bolivard* ; *Duchesse de Berry d'hiver* ; *Très grosse de Bruxelles*.


7.162.799

91 92

Fruits très gros, souvent réunis par 2. Épiderme lisse, jaune verdâtre, abondamment pointillé de roux, lavé de gris fauve aux extrémités, souvent marbré de même au pourtour ; frappé de rouge plus ou moins sombre. Pédicelle grand, fort, gros à l'extrémité, presque affleurant. Œil assez grand, mi-clos, dans cuvette superficielle et bosselée. Sépales mi-charnus. Chair blanchâtre, ferme, cassante, peu juteuse, sans parfum, un peu âpre ; médiocre, même cuite.

Arbre vigoureux, mi-étalé, peu fertile. Rameaux forts, brun-violacé. Lenticelles petites, rondes. Yeux courts, appliqués. Feuilles elliptiques, à pointe aiguë, vert foncé, brillantes, presque planes, mi-épaisses. Dents fines, aiguës. Boutons petits, courts. Variété d'apparat; à cultiver sur cognassier en espalier; greffer au besoin quelques boutons à fruit.





Catillac


Syn. : *Cadillac* ; *Gros Monarque* ; *Chartreuse*.

8
7.165.669
358 294

Fruit gros ou très gros. Épiderme mi-rugueux, épais, jaune clair, pointillé de gris, marbré de rouille, quelquefois frappé de rouge sombre. Pédicelle assez fort, renflé aux extrémités dans cuvette plus ou moins profonde, étroite et mamelonnée. Œil grand, ouvert ou mi-clos, dans cuvette large, moyennement profonde, ondulée. Chair blanche, grossière, cassante, peu juteuse, peu sucrée, peu parfumée, mais acidulée et âpre ; bonne à cuire.

Arbre vigoureux, étalé, très fertile. Rameaux nombreux assez longs, gros, brun-rosé. Lenticelles mi-allongées et rondes. Yeux gros, courts, mi-appliqués. Feuilles grandes, ovales-arrondies, à pointe légèrement arquée, vert-clair, lisses, peu épaisses. Dents aiguës, peu profondes. Boutons gros, courts, pointus.

Variété de verger ; pour amateur.



Saint-Germain Vauquelin

Syn. : *Vauquelin* ; *De la Pentecôte* ; *Connétable de Clisson*.

53 4
7.181.696
6 42 76

Fruit moyen ou surmoyen, irrégulier, bosselé, asymétrique. Épiderme épais, mi-lisse, jaune verdâtre, abondamment pointillé, marbré et taché de roux surtout


autour de l'œil et à la face ensoleillée, parfois même frappé de rose. Pédicelle fort, arqué, noueux, gros aux extrémités, à fleur de peau ou dans légère cavité. Œil petit ou moyen, à fleur de peau ou dans cuvette étroite, plissée ou un peu bosselée. Chair blanc-jaunâtre, ferme quoique fondante, assez juteuse, granuleuse au centre, sucrée, mais souvent astringente ; bonne ou assez bonne.

Arbre de vigueur modérée, moyennement ou peu fertile. Rameaux brun-clair, longs. Lenticelles petites, peu serrées. Yeux assez courts, mi-appliqués. Feuilles sous-moyennes, ovales-lancéolées, vert foncé, luisantes, un peu arquées. Dents fines, mi-aiguës. Boutons moyens, courts.

Variété d'amateur; craint la tavelure ; se forme bien en fuseau, mais préfère l'espalier; tous porte-greffes.

Marie Benoist


83
7.185.641
6 9 766
8



Fruit gros. Épiderme jaune citrin, abondamment bronzé, légèrement frappé de rose ou de rouge. Pédicelle fort, à fleur de peau. Œil moyen, ouvert, dans cuvette étroite, plus ou moins profonde, entourée de bosses ou d'ondulations. Chair blanche, juteuse, acidulée.

Arbre de vigueur modérée, de fertilité moyenne. Rameaux mi-courts, brun-rosé. Bourgeons assez gros, coniques, détachés du rameau. Lenticelles petites, rondes et longues, grisâtres, peu abondantes. Stipules allongés. Feuilles ovales-elliptiques, petites, planes, vert-clair. Dents obtuses. Pétiole court, rose à la base. Boutons moyens, renflés, foncés.

Variété pour amateur.

**Comte de Wurtemberg**

7.185.78


4 8

Fruit très gros, au contour irrégulier. Épiderme à fond jaune abondamment parsemé de gros points roux, assez fortement lavé de bronzé surtout aux extrémités. Pédicelle charnu, oblique ou droit. Œil petit, ouvert, dans cuvette large, peu profonde, mamelonnée.

**Hoover**

7.189.441

Fruit assez gros, d'origine américaine. Épiderme verdâtre ou jaune, abondamment pointillé de roux. Pédicelle gros, charnu à l'extrémité, planté obliquement dans une cuvette mi-profonde, plus ou moins étroite. Œil moyen ou petit, dans cuvette fortement plissée. Chair blanche, juteuse, légèrement parfumée, un peu granuleuse au centre.

**Souvenir de Jules Guindon**

2 75
7.195.896
84 66
8

Fruits gros, isolés ou par 2. Épiderme rude, jaune clair, légèrement marbré de gris-fauve, abondamment et finement pointillé de roux, maculé de brun vers le pédicelle,

et légèrement frappé de rose clair ou terne. Pédicelle fort, ou charnu, oblique, un peu arqué, renflé aux extrémités, dans cuvette faible et bosselée. Œil petit, ouvert, souvent sans sépales, ou à sépales charnus, dans cuvette petite, étroite, à bord accidenté. Chair fine, blanc-jaunâtre, juteuse, sucrée, parfumée. Bonne.

Arbre assez vigoureux, suffisamment fertile. Rameaux assez gros, souvent arqués et retombants, brun-olivâtre. Lenticelles rondes et ovales, grisâtres. Yeux courts, coniques, mi-détachés. Boutons moyens ou gros, courts, pointus. Feuilles moyennes ovales-arrondies, presque planes, vert sombre. Dents peu profondes, légèrement aiguës. Pétiole court. Fleurs moyennes, en forme de coupes, tardives.

Variété d'amateur ; à cultiver en formes naines.

Charles Cognée

8
54 32
7.197.741
6 389 69
5 56




Fruits moyens, par 2 ou solitaires. Épiderme un peu rude, mi-épais, jaune citrin ou clair, légèrement marbré et taché de rouille, notamment vers le pédicelle, frappé ou non de rouge vif, finement et irrégulièrement ponctué de roux. Pédicelle gros, renflé aux extrémités, implanté à fleur de peau, au pied d'un éperon ou dans cuvette étroite et peu profonde. Œil moyen, mi-ouvert ou fermé aux sépales parfois charnus et érigés, dans cuvette moyennement profonde, large et bosselée au pourtour. Chair blanche granuleuse et jaunâtre autour des loges, juteuse, sucrée, fine, fondante ; légèrement parfumée. Bonne ou très bonne.

Arbre assez faible sur cognassier, érigé, fertile. Rameaux gros, courts. Yeux moyens ; aigus, écartés. Feuilles elliptiques-arrondies, à peu près sans pointes, vert-franc. Lisse, mi-rigides,

étalées ou un peu creusées. Dents peu profondes obtuses. Boutons assez gros, pointus. Fleurs moyennes, demi-hâtives.

Variété d'amateur ; à greffer sur cognassier à tailler court ; très sensible à la tavelure.




Rémy Chatenay

54 8
7.199.741
87 336

Fruit gros. Épiderme rugueux, jaune légèrement tigré de gris, abondamment et finement pointillé de roux ; un peu frappé de rose. Pédicelle gros, renflé à son extrémité, dans cuvette bosselée. Œil assez gros, clos ou mi-clos ; sépales charnus, dans cuvette profonde, large, à bord ondulé. Chair blanchâtre, acidulée, un peu granuleuse au centre, sucrée, un peu croquante, bonne.

Arbre vigoureux, moyennement fertile. Rameaux courts, vert-brun ou bronze-noirâtre. Lenticelles abondantes, rondes, jaunes ; mérithalles courts. Yeux courts, écartés. Feuilles elliptiques, vert foncé, brillantes. Dents peu profondes, mi-aiguës. Boutons très courts.

Variété d'amateur ; sujette à la tavelure ; pour formes naines et espalier.



Bergamote Fortunée

Syn. : *Beurré de Remme* ; *de Bonheur*.

4
7.227.836
6 31 5

Fruit moyen ou petit. Épiderme mi-rugueux, jaune, presque entièrement voilé et lavé de gris bronzé y compris les extrémités, parfois un


peu cuivré au soleil. Pédicelle fort, dans cuvette mi-profonde, étroite, côtelée. Œil petit, ouvert, dans cuvette mi-profonde, étroite, ondulée. Chair jaunâtre, légèrement âpre, de bonne conservation. Bonne.

Arbre de vigueur moyenne, mi-érigé, de fertilité capricieuse. Rameaux bruns ou brun-rosé, de moyenne longueur, coudés. Yeux moyens, coniques, légèrement écartés. Lenticelles petites, rondes. Feuilles petites, ovales ou elliptiques. Dents obtuses. Boutons moyens, pointus, marron.

Variété peu méritante, souvent confondue avec Passe-Crassane. A greffer indistinctement sur franc ou cognassier.

Olivier de Serres


8
7.229.831
4



Fruit moyen. Épiderme rugueux, jaune foncé recouvert plus ou moins de roux bronzé. Pédicelle gros, renflé à l'extrémité dans cuvette évasée, à bord ondulé. Œil petit, clos, dans cuvette profonde, bordée de côtes. Chair blanche, fine, sucrée, juteuse, parfumée ; très bonne.

Arbre de vigueur suffisante, érigé, mais peu fertile. Rameaux gros, noueux, olivâtres. Lenticelles petites, rondes, jaunes. Yeux courts, écartés. Feuilles elliptiques-allongées, à pointe obtuse, rigides, vert sombre. Dents fines, aiguës. Boutons courts, aigus.

Variété d'amateur ; à greffer sur cognassier; à conduire de préférence en petite formes ; sujette à la tavelure.




Bergamote Esperen

Syn. : *Esperen*.

86 7
7.243.696
6 359 54
5
4

Fruits moyens ou surmoyens, attachés isolément ou le plus souvent par 2, 3 ou 4. Épiderme épais, jaune clair, finement pointillé, taché et voilé de roux, parfois doré ou plus rarement frappé de rouge à l'insolation. Pédicelle gros, souvent noueux, à fleur de peau ou dans très étroite cuvette mamelonnée. Œil moyen, mi-clos ou un peu ouvert, dans cuvette peu profonde, large, à bord ondulé. Chair blanc-jaunâtre, fondante, sucrée, parfumée ; pépins assez gros, brun-foncé ; bonne ou très bonne.

Arbre vigoureux même sur cognassier, érigé, fertile. Rameaux assez forts, nombreux, brun-jaunâtre. Lenticelles peu nombreuses, rondes, grises et saillantes. Mérithalles longs. Yeux courts, écartés. Feuilles moyennes, elliptiques, lisses ou un peu creusées, vert gai, luisantes. Dents obtuses, peu profondes. Boutons courts, obtus. Fleurs moyennes, tardives. Variété d'amateur, de marché ; tous porte-greffes ; toutes formes ; réussit même en montagne.



Bergamote Hertrich

Syn. : *Bergamote de Strycker*.

4 7
7.256.662
6 349 55

Fruits moyens, attachés par deux. Épiderme jaune, plus ou moins marbré ou taché de roux, plus spécialement vers le pédicelle, abondamment pointillé de fauve, frappé de rouge terne. Pédicelle moyen, presque

à fleur de peau, dans cuvette large, très peu profonde. Œil moyen, dans cuvette peu profonde, assez régulière. Chair blanche, peu sucrée, juteuse, grossière. Assez bonne.

Arbre de vigueur modérée sur cognassier, mi-étalé, mi-fertile. Rameaux assez courts, rougeâtres. Méritalles courts. Lenticelles peu nombreuses, petites, rondes. Yeux moyens, ovoïdes, écartés. Feuilles petites, elliptiques, étalées, minces. Dents peu profondes, mi-aiguës. Boutons petits.


Variété d'amateur ; sensible à la tavelure.

Broom Park

Syn. : *Croom Park*.

7.269.891


36 65



Fruit moyen, genre Olivier de Serres. Épiderme mi-lisse, mi-épais, fond jaune citrin, tantôt presque entièrement recouvert de roux, tantôt abondamment et grossièrement pointillé et plaqué de roux. Pédicelle moyen, arqué ou droit, dans cuvette large et peu profonde, souvent aussi à fleur de peau. Œil moyen, ouvert, dans cuvette élargie, moyennement profonde, à bord ondulé. Chair blanche ou blanchâtre, mi-fine, mi-ferme, juteuse, sucrée. Assez bonne.

Arbre de vigueur modérée, mais de bonne fertilité. Rameaux peu nombreux, étalés, gros, longs, coudés, brun-jaunâtre. Lenticelles peu nombreuses, fines. Yeux petits, ovoïdes-obtus, écartés. Feuilles moyennes, vert jaunâtre, parfois rosées, ovales-arrondies. Pétiole gros, court.

Variété d'amateur.




Souvenir de Cronstadt

6
7.287.83
6 399

Fruits moyens ou surmoyens, assez semblables à Passe-crassane, attachés par 2 et 3. Épiderme mi-épais, mi-lisse, jaune clair largement lavé de brun autour du pédicelle et voilé de même sur le reste du fruit. Pédicelle fort, de 25 millimètres, droit ou légèrement arqué, renflé à son extrémité, implanté à fleur du fruit ou dans petite cuvette étroite, à bord un peu mamelonné. Œil moyen, ouvert ou entr'ouvert, aux sépales charnus et étroits, dans cuvette moyennement profonde et large. Chair blanche, fine, serrée, un peu croquante, sucrée ; loges petites, pépins assez gros, brun-foncé. Assez bonne ou bonne, de longue conservation.

Arbre moyennement vigoureux, mi-étalé, très fertile. Rameaux brun-rougeâtre-violacé, de moyenne longueur. Lenticelles rondes et elliptiques au sommet. Yeux petits très détachés. Boutons moyens, globuleux ou obtus. Feuilles petites, ovales-aiguës, planes, minces. Dents peu profondes, régulières, arrondies. Variété de collection.



Doyenné Madame Levasseur

98
7.289.649
6 357 796


Fruits surmoyens attachés par 2 ou 3. Épiderme assez épais, parcheminé, jaune doré et plus clair à l'ombre, abondamment pointillé, taché, marbré de rouge y compris les extrémités ; quelquefois frappé de rose à l'insolation. Pédicelle fort, plus ou moins arqué, renflé à son extrémité, implanté dans petite cuvette étroite, irrégulièrement

bosselée. Œil grand, ouvert, aux sépales un peu charnus, dans cuvette peu profonde, évasée, accidentée. Chair mi-fine, blanc-jaunâtre ou blanchâtre, veinée de jaune, mi-ferme, mi-juteuse, sucrée, légèrement âpre ; pépins allongés et noirâtres. Médiocre crue, bonne cuite ou en compote.

Arbre de vigueur suffisante sur cognassier; très fertile. Rameaux longs, bruns. Lenticelles abondantes, rondes, grisâtres. Yeux gros, appliqués. Feuilles moyennes, ovales, lisses, coriaces, planes ou légèrement arquées, vert foncé, luisantes. Dents peu profondes, obtuses. Boutons gros. Fleurs moyennes, hâtives. Variété à deux fins. A greffer sur cognassier pour petites formes ; peut remplacer Messire Jean.


Madame Millet

4
7.289.841
6



Fruits moyens on surmoyens, arrondis, un peu rétrécis, à contour irrégulier. Épiderme épais, très rugueux, jaune clair ou jaune-verdâtre ponctué de roux, voilé de bronzé au soleil et de fauve à l'ombre, roux vers les extrémités. Pédicelle gros, court, fortement renflé à l'extrémité, implanté à fleur du fruit ou dans cuvette étroite, bossuée. Œil assez grand ou moyen, ouvert, sépales parfois mi-charnus, dans cuvette peu profonde et régulière. Chair blanche, fine, quelque peu veinée de jaune, un peu cassante, juteuse, sucrée, acidulée, parfumée ; pépins gros et plats. Assez bonne ou bonne.

Arbre de vigueur modérée, mi-érigé, fertile. Rameaux peu nombreux, mi-courts, légèrement arqués. Lenticelles longues et allongées, mi-saillantes. Yeux gros, coniques, détachés. Boutons petits, obtus, brun clair. Feuilles moyennes elliptiques, épaisses, creusées, un peu plissées. Dents irrégulières, larges, peu profondes, arrondies ; pétiole mi-long, stipules longue. Variété ancienne ; pour amateur


**Alexandre III**

8 7
7.317.893
6 49 781
5
4

Fruit moyen ou surmoyen. Épiderme lisse, assez mince, jaune, abondamment pointillé de gris, marbré de roux, frappé ou non de rose. Pédicelle très fort, dans cuvette large peu profonde, à bord lisse. Œil moyen, ouvert, dans cuvette peu profonde, évasée, lisse ; sépales longs. Chair blanche, grossière, serrée, ferme, acidulée, juteuse, légèrement granuleuse au centre ; bonne, cuite ; assez bonne, crue.

Arbre peu vigoureux sur cognassier. Rameaux plutôt courts, brun-rougeâtre. Lenticelles peu nombreuses, petites. Yeux écartés. Feuilles moyennes, elliptiques, planes, souples, vert clair. Dents obtuses. Pétiole long. Boutons minces, effilés.

Variété à cuire.

**Bergamote de Parthenay**

Syn. : *Beurré de Parthenay*.

79
7.321.872
217 78

Fruit moyen. Épiderme jaune, fortement bronzé aux extrémités, abondamment pointillé de rouille. Pédicelle fort ou gros, dans cuvette à peine creusée, bosselée. Œil grand, ouvert, dans cuvette moyennement profonde, large, ondulée. Chair blanchâtre, acidulée. Bonne.


Arbre vigoureux. Rameaux gris-verdâtre. Lenticelles grosses, rondes, blanchâtres. Yeux mi-appliqués. Feuilles moyennes, ovales, vert foncé, étalées et plissées, à bord parfois ondulé. Dents mi-aiguës. Boutons moyens, brun-jaunâtre.

Variété d'amateur.

Passe-Crassane

Syn. : *Passe-Crassane Boisbunel*.

6
7.359.511
6 21 899




Fruit assez gros, parfois très gros, solitaire. Épiderme rude, épais, jaune foncé, largement lavé de roux vers le pédicelle, légèrement pointillé et marbré de roux, rarement rosé au soleil. Pédicelle assez gros, un peu renflé à l'extrémité, dans cuvette peu profonde et bosselée. Œil moyen, ouvert ou mi-ouvert dans cuvette moyennement profonde, évasée, irrégulière. Chair blanche, fine, fondante, juteuse, sucrée, parfois légèrement âpre, mi-acidulée, parfumée, très bonne.

Arbre de vigueur moyenne, érigé, suffisamment fertile. Rameaux gros et courts, brun-noirâtre. Lenticelles assez nombreuses, brunes. Mérithalles courts. Yeux gros, courts, appliqués. Feuilles elliptiques, surmoyennes, lisses, étalées, ou un peu creusées et légèrement arquées, vert franc. Boutons gros, courts, arrondis. Fleurs peu nombreuses, moyennes, étalées.

Variété de commerce, à greffer indistinctement sur franc ou sur cognassier; à planter en sol sain, profond et riche ; en contre-espalier à l'Est. Tailler court.

Mi-résistante à la tavelure.



Souvenir de Pierre Achard

4
7.386.883
6 99 9
7

Fruits surmoyens plus ou moins bosselés, attachés par 2 et 3. Épiderme mi-lisse, jaune citrin très fortement lavé de brun clair et marbré de rouille sur toute la surface y compris les cuvettes. Pédicelle charnu ou gros, moyen ou court, oblique ou arqué, planté à fleur de fruit ou dans légère cuvette gibbeuse ou à bord inégal. Œil moyen ou assez grand, fermé ou mi-clos, aux sépales charnus, dans cuvette peu ou moyennement profonde, large ou mi-étroite, à bord généralement uni, rarement plissée. Chair blanche, fine, serrée, croquante quoique souple, sucrée ; loges et pépins très réduits. Assez bonne, ou bonne, mais flétrit à maturité, même cueillie tardivement.

Arbre vigoureux sur cognassier, érigé, suffisamment fertile. Rameaux forts, longs, brun clair. Lenticelles assez nombreuses, arrondies, mi-saillantes. Yeux détachés, pointus. Feuilles moyennes ovales-lancéolées, vert luisant, très épaisses, rigides ; dents peu profondes, mi-rigides. Boutons assez gros, allongés, marron.

Variété pour amateur.

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION (1) | Page |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| Alexandre III. | | | 166 |
| Alexandrine Douillard. | Poire Douillard. | Vallée du Rhône | 68 |
| Alexandrine Mas | | | 153 |
| Amanlis. | Beurré d'Amanlis. | Aube, Cantal. Loire-Inférieure. | 54 |
| Ananas d'hiver. | Passe-Colmar. | | 128 |
| Anderson. | Belle Angevine. | | 155 |
| André Desportes. | | | 46 |
| Anna Audusson. | Doyenné Anna Audusson | | 137 |
| Archiduc Charles. | Délices d'Hardenpont. | | 87 |
| Arenberg. | Orpheline d'Enghien. | | 88 |
| Armand Jandriot | | | 103 |
| Aurore. | Beurré Capiaumont. | | 56 |
| Bachelier. | Beurré Bachelier. | | 114 |
| Baltet Père | Beurré Baltet père. | | 109 |
| Baronne de Mello. | Beurré Van Mons. | Région parisienne. | 67 |
| Barry. | De Lestumières. | | |
| Baud à la Cour. | Conseiller à la Cour. | | 59 |
| Beau présent d'été. | Epargne. | | 43 |
| Beauté de Flandres. | Fondante des Bois. | | 60 |
| Bec d'oie. | Beurré d'Angleterre. | Nord ; Ouest. | 60 |
| Belle Angevine | Anderson ; Beauté de Tervueren. | Puy-de-Dôme. | 155 |
| Belle Caennaise. | Bon Chrétien Napoléon | | 111 |
| Belle de Berry | Curé. | Alpes, Centre, Vallées de la Loire, Haute- Garonne. | 103 |
| Belle de Bruxelles. | Belle sans pépin. | | 49 |
| Belle des Abrès. | | | 151 |
| Belle des Bois. | Fondante des Bois. | | 65 |
| Belle Epine de Limoges. | Epine du Mas. | Loiret ; Maine-et-Loire. | 84 |

(1) Régions où sont plus particulièrement répandues certaines variétés dites locales ou de commerce ; les variétés d'amateurs ou cultivées un peu partout en France ne font l'objet d'aucune mention.

Liste des Poires par ordre alphabétique

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Belle Epine Fondante. | Monsallard. | | 51 |
| Belle et bonne des haies. | Bonne d'Ezée. | | 53 |
| Belle Guérandaise. | | | 66 |
| Belle Lucrative. | Seigneur. | | 82 |
| Belle sans pépin. | Belle de Bruxelles. | | 49 |
| Belle sans pépin de Riha. | | | 144 |
| Bellissime d'automne. | Certeau d'automne. | | 90 |
| Bergamote Crassane | Beurré plat. | | 119 |
| Bergamote de Parthenay. | Beurré de Parthenay. | | 166 |
| Bergamote de Pentecôte. | Doyenné d'hiver. | Ardèche, Eure, Loire- Inférieure Seine-et-Oise, Maine-et-Loire. | 154 |
| Bergamote d'été. | Beurré blanc d'été. | | 48 |
| Bergamote dorée. | Bergamote rouge. | | 146 |
| Bergamote Fortunée. | Esperen. | | 162 |
| Bergamote Esperen. | De bonheur. | | 160 |
| Bergamote Hertrich. | Bergamote de Strycker. | | 162 |
| Bergamote La Gantoise. | | | 154 |
| Bergamote Philippot. | | | 146 |
| Bergamote précoce. | Bergamote d'été. | | 48 |
| Bergamote rouge. | Bergamote dorée. | | 146 |
| Bergamote Sannier. | | | 144 |
| Besi de Chaumontel | Beurré de Chaumontel ; Beurré d'hiver. | | 134 |
| Beurré Auguste. | | | 47 |
| Beurré Aurore | Beurré Capiaumont. | | 56 |
| Beurré Bachelier. | Bachelier. | Maine-et-Loire, Gironde. . . | 114 |
| Beurré Baltet, père. | Baltet père. | | 109 |
| Beurré blanc d'automne. | Doyenné blanc. | | 82 |
| Beurré blanc d'été. | Bergamote d'été. | | 48 |
| Beurré Blumenback. | Soldat Laboureur. | | 105 |
| Beurré Bosc. | Beurré d'Apremont. | | 93 |
| Beurré Boussoc. | Doyenné de Mérode. | | 56 |
| Beurré Capiaumont. | Beurré de la Glacière. | | 56 |
| Beurré Davy. | Fondante des bois. | | 65 |
| Beurré de,Chaumontel. | Bési de Chaumontel. | | 134 |

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Beurré Clairgeau | Clairgeau de Nantes ; Clairgeau | Ardèche, Haute-Garonne, Drôme, Gironde, Maine-et-Loire. | 102 |
| Beurré d'Amanlis | Amanlis ; de Thiessé. | Aube, Cantal, Loire-Inférieure. | 54 |
| Beurré d'Angleterre | Bec d'oeie; de Finois. | Nord, Ouest, Aube. | 60 |
| Beurré d'Anjou. | Nec plus Ultra Meuris. | | 89 |
| Beurré d'Apremont | Beurré Bosc ; Paradis d'automne. | | 93 |
| Beurré d'Avranches. | Louise bonne d'Avranches. | Ardèche, Calvados, Drôme, Bas-Rhin Lozère, M.-et-Moselle, S.-et-O., Pyr.-Orientales. | 58 |
| Beurré d'Arenberg. | Beurré d'Hardenpont. | M.-et-L., Seine- Infér., Pyrénées orientales. | 95 |
| Beurré de la Pentecôte. | Doyenné d'hiver. | Ardèche, Eure, Loire-Inf S.-et-O, M.-et-Loire. | 154 |
| Beurré de l'Assomption. | De l'Assomption | | 48 |
| Beurré de Luçon | Beurré gris de Luçon. | | 148 |
| Beurré de Malines. | Bonne de Malines. | Nord, Belgique. | 125 |
| Beurré de Mérode. | Doyenné de Mérode. | | 56 |
| Beurré de Naghin | | | 150 |
| Beurré de Paris. | Epargne. | Aube, Landes, Moselle. | 43 |
| Beurré de Parthenay. | Bergamote de Parthenay. | | 166 |
| Beurré de Remme. | Bergamote Fortunée. | | 160 |
| Beurré de Saintonge. | Beurré Gris. | | 73 |
| Beurré Deschamps. | Orpheline d'Enghien. | | 88 |
| Beurré d'Hardenpont | Beurré d'Arenberg ; Beurré de Kent. | Maine-et-Loire, Seine- Inférieure, Pyr.-Orientales, Belgique. | 95 |
| Beurré Diel | Beurré Magnifique ; B. Incomparable. | Eure, Bas-Rhin. | 95 |
| Beurré Dilly | De Jolain ; de Launay. | | 80 |
| Beurré doré. | Beurré gris. | | 73 |
| Beurré Drapiez. | Des Urbanistes. | | 87 |
| Beurré Dubuisson | | | 141 |

Liste des Poires par ordre alphabétique

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Beurré Dumont. | | | 113 |
| Beurré Dumortier. | Fondante de Tirlement. | | 72 |
| Beurré Durondeau. | De Tongres. | Nord, Oise, Belgique. | 64 |
| Beurré Fouqueray. | | | 65 |
| Beurré Giffard. | Giffard. | Loiret, Loire-Inf., M.-et-L., Nord, Savoie, Vaucluse. | 40 |
| Beurré gris. | Beurre doré. | | 73 |
| Beurré gris de Luçon. | Beurré de Luçon. | | 148 |
| Beurré gris d'Enghien | | | 124 |
| Beurré Hardy. | Hardy. | Cantal, Drôme, Bas-Rhin, Lozère, M.-et-Loire, Rég. parisienne. | 68 |
| Beurré incomparable. | Beurré Diel. | | 95 |
| Beurré Kent. | Beurré d'Hardenpont. | | 95 |
| Beurré Le Brun | Le Brun. | | 79 |
| Beurré Lucratif. | Seigneur. | | 82 |
| Beurré Luizet. | | | 108 |
| Beurré Magnifique. | Beurré Diel. | Eure, Bas-Rhin. | 95 |
| Beurré Napoléon. | Bon Chrétien Napoléon. | | 111 |
| Beurré Perrault. | Duchesse de Bordeaux. | Maine-et-Loire. | 148 |
| Beurré Piquery. | Des Urbanistes | | 87 |
| Beurré plat. | Bergamote Crassane. | | 119 |
| Beurré rance. | Beurré d'Hardenpont. | M.-et-L., Seine-Inf., Pyr.- Orient. | 162 |
| Beurré-roux. | Beurré Gris. | | 73 |
| Beurré royal. | Beurré Diel. | | 95 |
| Beurré St-Nicolas | Saint-Nicolas. | | 59 |
| Beurré Six. | Six. | | 97 |
| Beurré Sterkmans. | Doyenné Sterkmans. | | 138 |
| Beurré Superfin. | | Maine-et-Loire. | 77 |
| Beurré Van Marum. | Van Marum. | | 70 |
| Beurré Van Mons. | Baronne de Mello. | Rég. parisienne. | 67 |
| Beurré Vauban. | | | 132 |
| Boieldieu. | | | 80 |
| Bolivar. | Belle Angevine. | | 155 |

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bon Chrétien | Bon Chrétien d'hiver | | 135 |
| Bon Chrétien Bonnamour | | | 113 |
| Bon Chrétien d'Hiver | Bon Chrétien de Tours | | 135 |
| Bon Chrétien Napoléon | Belle Caennaise | | 111 |
| | | Ain, Ardèche, Calvados, Corrèze, Drôme, Eure, Isère, Gironde, Indre-et-Loire, Loiret, Loire-nf., Cher, Lozère M.-et-L., Ile-de-France, Puy-de-Dôme, Rhône, Pyr.-Or., Vendée. . | |
| Bon Chrétien Williams | William | | 52 |
| Bonne d'Avranches | Louise bonne d'Avranches | | 58 |
| Bonne de Beugny | | | 122 |
| Bonne de Longueval | Louise bonne d'Avranches | | 58 |
| Bonne de Malines | Bonne Malinoise | | 125 |
| Bonne d'Ezée | Bonne des haies | | 53 |
| Bonne Louise | Louise bonne d'Avranches | | 58 |
| Bonnissime | Figue d'Alençon | | 115 |
| Bon Papa | Curé | Alpes, Ardèche, Puy-de-Dôme, Corrèze, Indre-et-Loire | 103 |
| Bosc | Beurré d'Apremont | | 93 |
| Bouteille | Van Marum | | 70 |
| Broom Park | Croom Park | | 163 |
| Bujaleuf | Virgouleuse | | 140 |
| Cadillac | Catillac | | 156 |
| Calebasse du Nord | Calebasse Royale ; Van Marum | Nord | 70 |
| Carlisse | Doyenné blanc | | 82 |
| Casentina | Royale d'hiver | | 149 |
| Catillac | De livre, Cadillac | | 156 |
| Certeau d'Automne | Bellissime d'automne | Htes-Alpes, Haute-Loire. . | 90 |
| Charles Cognée | | | 159 |
| Charles Ernest | | Maine-et-Loire, Gironde. . | 94 |
| Chaulis | Messire Jean | | 106 |
| Chopine | Epargne | | 432 |
| Citron de septembre | Doyenné Blanc | | 82 |

Liste des Poires par ordre alphabétique

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| Clairgeau de Nantes | Beurré Clairgeau | | 102 |
| Clapp's Favourite | Favourite de Clapp | Isère, Bas-Rhin, Rég. parisienne. | 42 |
| Colmar d'Arenberg | De Kartoffel | | 118 |
| Colmar d'Hardenpont. | Passe Colmar. | | 128 |
| Colmar du Lot. | Epine du Mas | | 84 |
| Colmar Gris. | Passe Colmar. | | 128 |
| Colmar Nelis. | Bonne de Malines. | | 15 |
| Columbia | Columbia Virgouleuse. | | 107 |
| Comte de Chambord | | | 57 |
| Comte de Wurtemberg | | | 158 |
| Comtesse de Paris | | | 85 |
| Conférence | | Bas-Rhin, Pays-Bas. | 68 |
| Conseiller à la Cour | Duc d'Orléans. | | 119 |
| Crassane d'automne. | Bergamote d'automne. | | 43 |
| Cuisse dame. | Epargne. | | 90 |
| Cuisse dame (à Lyon) | Certeau d'automne, Ardèche, Corrèze, Basses- Alpes, Drôme, Hautes- Alpes, Haute-Garonne Hte-Loire, Haute-Savoie, Indre et Loire, Puy-de- Dôme. | Aube, Landes, Moselle. | 103 |
| Curé | Belle de Berry ; de Curé. . . | | 118 |
| De Charneu. | Légipont, de Légipont. . . . | Belgique. | 56 |
| De Chartraux. | Beurré Capiaumont. | | 140 |
| De glace. | Virgouleuse. | | 91 |
| De la Foresterie | | Limousin. | 156 |
| De la Pentecôte. | St-Germain Vauquelin. | | 48 |
| De l'Assomption | Beurré de l'Assomption. . . | | 118 |
| Délices des Charneuses. | Légipont. | | 87 |
| Délices d'Hardenpont | Archiduc Charles ; Fondante du Panisel; Délices d'Hard. d'Angers . . | | 101 |
| De Pèzenas. | | | 135 |
| De Saint-Martin. | Duchesse d'Angoulême. . . | | 64 |
| De Tongres. | Bon Chrétien d'hiver. | | |
| | Beurré Durondeau. | Nord, Belgique. | |

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Des Urbanistes. | Beurré Piquery | | 87 |
| Directeur Alphan. | | | 142 |
| Directeur Hardy. | | | 74 |
| Docteur Desportes. | | | 81 |
| Docteur Jules Guyot. | | Moselle. | 52 |
| Dorset. | | | 142 |
| Double Philippe. | Doyenné de Mérode. | | 56 |
| Doyenné Anna Audusson. | Anna Audusson. | | 137 |
| Doyenné Blanc. | Carlisse ; Doyenné St-Michel; Citron de septembre. Beurré blanc d'automne. | | 82 |
| Doyenné Boussoch. | Doyenné de Mérode. | | 56 |
| Doyenné d'Alençon. | Doyenné marbré. | Bas-Rhin. | 127 |
| Doyenné d'été. | Doyenné de Juillet. | | 39 |
| Doyenné de Juillet. | Jolimont ; Doyenné d'été. | | 39 |
| Doyenné de Mérode. | Beurré de Mérode ; Beurré Boussoch ; Double Philippe. | | 56 |
| Doyenné de Montjean. | Doyenné Perreau. | | 132 |
| Doyenné de Mongeron. | | | 79 |
| Doyenné d'Hiver. | Bergamote de la Pentecôte. | Ardèche, Eure, Loire-Inférieure, Seine-et-Oise, Maine-et-Loire. | 154 |
| Doyenné doré. | Bergamote d'été. | | 48 |
| Doyenné du Comice. | Comice ; Fondante du Comice. | Anjou, Ardèche, Rég. Parisienne, Eure, Pyrénées-Orientales. | 86 |
| Doyenné Gabriel | | | 152 |
| Doyenné Georges Boucher. | Notaire Lepin. | | 152 |
| Doyenné gris. | Saint-Michel Gris. | | 120 |
| Doyenné Guillard. | | | 122 |
| Doyenné Mme Levasseur. | | | 164 |
| Doyenné marbré. | Doyenné d'Alençon. | | 127 |
| Doyenné Perreau. | Doyenné de Montjean. | | 132 |
| Doyenné St-Michel. | Doyenné blanc. | | 82 |
| Doyenné Sterkmans. | Beurré Sterkmans. | | 138 |
| Duc de Bordeaux. | Epine du Mas. | | 84 |
| Duc de Brabant | Légipont. | Nord, Belgique. | 118 |

Liste des Poires par ordre alphabétique

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Duc d'Orléans. | Conseiller à la Cour | | 59 |
| Duchesse. | Duchesse d'Angoulême. | | 101 |
| Du Canada | | | 45 |
| Duchesse Bererd | | | 100 |
| Duchesse Bronzée | | | 112 |
| Duchesse d'Angoulême | Des Eparonnais ; de Pèzenas. | Ardèche, Bas-Rhin, Eure, Gironde, Loiret, L.-Inf.- M.-et-L., Seine-et-Oise, S- et-Marne, Seine. | 101 |
| Duchesse de Berry d'hiver. | Belle Angevine. | | 155 |
| Duchesse de Bordeaux | Beurré Perrault. | Maine-et-Loire. | 148 |
| Duchesse de Montebello. | Royale d'hiver. | | 149 |
| Duchesse de Mouchy | | | 129 |
| Duchesse Panachée | | | 63 |
| Ellis | | | 77 |
| Enfant Nantais | | Loire-Inférieure. | 76 |
| Epargne | Beau Présent d'été Grosse cuisse dame. | Aube, Landesv Moselle. | 43 |
| Epine du Mas | Duc de Bordeaux ; Triomphe du Restaurant ; Belle Epine de Limoges. . . | Loiret, Maine-et-Loire. . . . | 84 |
| Epine fondante. | Monsallard. | | 51 |
| Esperen. | Bergamote Esperen. | | 162 |
| Eva Baltet | | | 93 |
| Favorite de Clapp. | Clapp's Favourite. | | 42 |
| Favorite Morel | | | 58 |
| Ferdinand Gaillard | | | 99 |
| Figue d'Alençon | Bonnissime. | | 115 |
| Figue d'hiver. | Figue d'Alençon. | | 115 |
| Fin Juillet | | | 43 |
| Fondante de Charneux. | Légipont. | Belgique. | 118 |
| Fondante de Maubeuge. | Seigneur. | | 82 |
| Fondante des Bois | Belle des Flandres ; Gros Quessois d'été; Beurré Davy. | | 65 |
| Fondante de Tirlemont. | Beurré Dumortier. | | 72 |

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Fondante des Emmurés. | | | 41 |
| Fondante du Comice. | Doyenné du Comice. | Anjou ; Région parisienne. | 86 |
| Fondante du Panisel. | Délices d'Hardenpont. | | 87 |
| Fondante Fougère. | | | 133 |
| Fondante Thirriot. | | | 62 |
| Foucoubà. | | | 84 |
| France. | | | 120 |
| Général Tottleben. | | | 88 |
| Gentil Bianca. | | | 39 |
| Grosse Cuisse Madame. | Epargne. | | 43 |
| Grosse Louise. | Louise bonne Butin. | Nord. | 72 |
| Guillaume. | William. | | 52 |
| Hoover. | | | 159 |
| Illinka. | | | 45 |
| Jeanne d'Arc. | | | 96 |
| Jolimont. | Doyenné de juillet. | | 39 |
| Joséphine de Malines. | | Belgique, Bord. | 145 |
| Joyau de septembre. | | | 75 |
| Jules d'Airolles. | | | 83 |
| Kieffer Se edling. | | | 121 |
| La France. | France. | | 120 |
| Lawson. | | | 46 |
| Le Brun. | Beurré Le Brun. | | 79 |
| Légipont. | Fondante de Charneu ; Waterloo ; Délices des Charneuses ; Fondante des Carmes | Nord, Belgique. | 118 |
| Le Lectier. | | Maine-et-Loire. | 97 |
| Léon Leclerc. | Van Mons. | | 89 |
| Louise bonne d'Avranches. | Bonne Louise ; Bonne Ardèche, de Longueval. . . | Calvados, Bas - Rhin, Drôme, Lozère, M.-et-L., S.-et-O., S.-et-M., Pyr.- Orientales. | 58 |
| Louise bonne Saunier. | | | 91 |
| Louis Pasteur. | | | 127 |
| Madame Ballet. | | | 131 |
| Madame Bonnefond. | | | 117 |
| Madame Millet. | | | 165 |
| Madame Treyve. | Souvenir de Madame Treyve. | | 50 |

Liste des Poires par ordre alphabétique

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Marguerite Brandon | | | 11 |
| Marguerite Marillat | | Seine-Inférieure, Rég. parisienne..... | 78 |
| Marie Stuart. | Légipont. | | 118 |
| Marie Benoist | | | 157 |
| Marie-Louise d'Uccle | | | 111 |
| Marion. | Messire Jean. | | 106 |
| Martin Sec (de Hte-Savoie) | Rousselet d'hiver. | Basses-Alpes, Drôme, Hautes-Alpes, Haute- Savoie, M.-et-L. | 124 |
| Maude | | Haute-Savoie. | 120 |
| Mère Périer | | | 117 |
| Merveille Ribet | | | 126 |
| Messire Jean | Marion ; Chaulis. | | 106 |
| Meuris d'hiver. | Nec plus Ultra Meuris. | | 89 |
| Ministre Viger | | | 129 |
| Monsallard | Epine fondante. | | 51 |
| Mouillebouche d'été. | Bergamote d'été. | | 48 |
| Muscate rouge. | Certeau d'automne. | | 90 |
| Nec plus Ultra Meuris | Nec plus Meuris ; Beurré d'Anjou | | 89 |
| Notaire Lepin | Doyenné Georges Boucher | | 151 |
| Nouveau Poiteau | Retour de Rome. | | 63 |
| Nouvelle Fulvie | | | 140 |
| Olivier de Serres | | Belgique. | 161 |
| Orpheline d'Enghien | Beurré Deschamps. | | 88 |
| Paradis d'Automne. | Beurré d'Apremont. | | 93 |
| Passe Colmar | Ananas d'hiver. | Nord. | 128 |
| Passe Crassane | Passe Crassane Boisbunel | Ardèche, Calvados, Cantal, Gironde, Indre-et-Loire, B.-Alpes, Htes-Alpes, M.- et-L., Région paris., Rhône, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales. | 167 |
| Perdreau musqué. | Rousselet de Reims. | | 51 |
| Petit Rousselet musqué. | Rousselet de Reims. | | 51 |
| Philippe. | Doyenné de Mérode. | | 56 |
| Philippot. | Bergamote Philippot. | | 169 |

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| Pierre Corneille | | | 106 |
| Pierre Tourasse | | | 71 |
| Pitmaston Duchesse | William-Duchesse | | 61 |
| Précoce de Trévoux | | Moselle | 41 |
| Prémices d'Ecully | | | 66 |
| Prémices Lesueur | | | 115 |
| Président d'Osmonville | | | 104 |
| Président Drouard | | Pyr.-Orientales | 139 |
| Président Héron | | | 105 |
| Président Mas | | | 109 |
| Président Roosevelt | | | 61 |
| Prince Impérial d'Autriche | Beurré d'Hardenpont | | 95 |
| Prince Impérial | | | 49 |
| Prince Napoléon | | | 143 |
| Princesse | Pucelle de Saintonge ; Muscat Robert | | 70 |
| Professeur Opoix | | | 137 |
| Rémy Chatenay | | | 160 |
| Roi Charles de Wurtemberg | | | 108 |
| Roi Jolimont | Doyenné de Juillet | | 39 |
| Rousselet d'hiver | Martin sec | Centre | 124 |
| Rousselet de Reims | Rousselet musqué ; Perdreau musqué ; Petit rousselet | | 51 |
| Royale d'Hiver | Duchesse de Montebello ; Spina di carpi | | 149 |
| Sainte-Anne | | | 47 |
| Saint-Germain d'Hiver | Saint-Germain vert | | 130 |
| Saint-Germain Vauquelin | Vauquelin | | 156 |
| Saint-Léonard | Virgouleuse | | 107 |
| Saint-Michel Archange | | | 75 |
| Saint-Michel blanc | Doyenné blanc | | 82 |
| Saint-Michel d'hiver | Doyenné d'Alençon | | 127 |

Liste des Poires par ordre alphabétique

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Saint-Nicolas | Sucré vert d'automne | | 59 |
| Saint-Rémy | | Belgique | 136 |
| Sans pépin | Belle de Bruxelles | | 49 |
| Seigneur | Seigneur Espéren ; Beurré Lucratif | | 82 |
| Sénateur Belle | | | 153 |
| Six | Beurré Six | | 97 |
| Sœur Grégoire | | | 100 |
| Soldat Laboureur | Beurré Blumenbach | Moselle | 105 |
| Souvenir de Cronstadt | | | 164 |
| Souvenir de Jules Guindon | | | 158 |
| Souvenir de Mme Treyve | Mme Treyve | | 50 |
| Souvenir du Congrès | | | 54 |
| Souvenir de Pierre Achard | | | 168 |
| Sucrée de Montluçon | Sucrin vert | Cantal | 92 |
| Sucré vert d'automne | Saint-Nicolas | | 50 |
| Sucrin vert | Sucrée de Montluçon | | 92 |
| Suzette de Bavay | | | 147 |
| Triomphe de Jodoigne | | Aube | 98 |
| Triomphe de Tournay | | | 150 |
| Triomphe de Vienne | | Aube; Gironde | 54 |
| Valencia | Doyenné blanc | | 82 |
| Van Marum | Calebasse Monstrueuse | | 70 |
| Van Mons | Léon Leclerc | | 89 |
| Vauquelin | Saint-Germain Vauquelin | | 156 |
| Vigoureuse | Virgouleuse | | 107 |
| Virginie Baltet | | | 110 |
| Virgouleuse | De Glace | Limousin, Htes-Alpes, B.- Alpes | 140 |
| Waterloo | Légipont | Belgique | 118 |
| Wilder | | | 45 |
| Williams | Bon Chrétien Williams | Ile-de-France, Lyonnais, Centre-Est, Touraine, Pyr.- Orientales | 52 |
| Williams Duchesse | Pitmaston Duchesse | | 61 |
| Zéphirin Grégoire | | | 134 |

TROISIÈME PARTIE

ÉTUDES DES VARIÉTÉS

DE

POMMES

| Diagnostics | NOMS | Pages | Diagnostics | NOMS | Pages |
|------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------------|----------------------------|-------|
| 1.161.851 3 929 | Rougeur de pêche | 192 | 67 7 1.293.894 82 988 | Polystica | 198 |
| 1.212.827 3 | Rose de Virginie. | 192 | 5 4 2.234.871 21 87 | Grand Alexandre | 199 |
| 1.214.141 2 | Transparente blanche. | 193 | 54 2.235.881 | Rambour franc. | 199 |
| 1.215.958 8 9 | Beauty of Bath. | 193 | 1 27 93 6 | | |
| 2 1.217.743 24 51 | Astracan rouge. | 194 | 6 39 2.254.168 3 385 75 28 | Transparente de Croncels | 200 |
| 67 1 1.222.962 353 836 | Framboise d'Oberland | 195 | 6 2.257.191 3 385 3 | Calville de Boskoop. . . . | 201 |
| 8 1.224.851 85 23 6 | Borovistky. | 195 | 2.257.891 3 68 8 | Elisa Rathke. | 201 |
| 6 1.227.969 55 851 | Fraise. | 196 | 29 671 2.262.393 3 353 48 25 | Codlin Hollandais. | 202 |
| 1.254.161 2 65 39 | Antonowka. | 197 | 4 2.267.951 25 84 1 | Wilson June. | 203 |
| 1.285.761 2 4 57 | Rose. | 197 | 2.275.853 3 47 1 | Norfolk Beauty. | 203 |
| 1.292.841 64 97 | Rose de Bohême. | 198 | 2.281.152 46 | Zurich. | 204 |
| | | | 2.292.989 1 | Mignonne d'été. | 204 |

| Diagnostics | NOMS | Pages | Diagnostics | NOMS | Pages |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 7 5 2.391.897 264 8 | Jaune Hâtive. | 205 | 65 47 3.254.641 2 21 857 | Président Defaye Dumonceau. | 211 |
| 3.187.833 4 5 | Pigeon de Jérusalem. ... | 205 | 3.254.849 | De Lande. | 212 |
| 5 3.214.267 25 3 | Sans pareille de Peasgood. | 206 | 5 46 3.254.887 4 361 658 | Royale d'Angleterre. ... | 213 |
| 5 3.215.969 4 24 731 | Mac Intosh. | 207 | 22 8 3.255.893 4 84 568 67 | Merveille de Chelmsford. | 214 |
| 8 5 3.225.881 2 51 77 | Gravenstein. | 207 | 3.257.986 4 6 | Cœur-de-bœuf. | 214 |
| 96 64 3.227.751 2 3 86 7 | Glogirowka. | 208 | 3.261.697 4 3 1 | Chailleux. | 215 |
| 3.232.281 4 6 79 | Jubilé d'Argovie. | 208 | 3 7 3.264.672 4 57 48 | Ménagère. | 216 |
| 55 3.232.997 2 367 761 94 | Calville rouge du Mont-d'Or. | 209 | 7 64 3.264.787 4 355 391 3 | Calville Duquesne. | 216 |
| 8 3.246.871 4 72 947 | Cellini. | 209 | 3.264.859 4 9 6 | Titowka. | 217 |
| 1 3.247.891 75 6 | La Fameuse. | 210 | 6 3.285.575 54 | Reinette Grise d'automne. | 218 |
| 2 6 3.251.951 9 8 8 | Dantziger Kantapfel. ... | 211 | 3 3.394.763 165 859 | Rose de Saint Florian. ... | 218 |
| | | | 3 4.137.865 65 9 1 | Calville rayée de Remperheim. | 219 |

| Diagnostics | NOMS | Pages | Diagnostics | NOMS | Pages |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------|-------|
| 5 5 4.145.828 5 317 66 3 | Adam's Pearmain..... | 220 | 4 4.217.914 85 | Reinette de Mauss..... | 227 |
| 2 8 4.147.258 31 46 | Reinette Ananas..... | 220 | 44 4.222.141 3 57 763 | Calville des femmes.... | 228 |
| 8 4.153.651 8 9 4 | Friandise..... | 221 | 14 7 4.222.851 51 945 | Bismarck..... | 229 |
| 8 4.155.864 282 93 | Pigeon rouge..... | 222 | 47 4 4.224.653 55 768 7 | Reinette franche..... | 229 |
| 2 2 4.165.267 334 7 7 | Linnéous Pippin..... | 222 | 4 4.224.886 1 | Grosse Mignonne d'Herbassy..... | 230 |
| 43 62 4.185.761 3 54 83 | Kandil Sinap..... | 223 | 5 9 4.225.233 3 37 54 | Reinette de Cantorbery... | 231 |
| 4.197.891 5 8 | Calville rouge d'automne..... | 224 | 2 6 4.225.581 5 54 93 7 4 | Reinette dorée..... | 231 |
| 4.212.267 3 7 51 | Reinette de Zaccmaglio... | 224 | 7 1 6 4.225.628 5 5 536 4 | Pépin gris de Parker..... | 232 |
| 4 4.214.684 2 3 8 | Jules Labitte..... | 225 | 4 4 4.225.884 5 5 93 | Belle fille..... | 233 |
| 4.217.58 | Reinette grise de Browlée..... | 225 | 2 54 4.225.885 54 921 | Cramoisie de Gascogne... | 233 |
| 72 8 4.217.867 3 44 9 | Cox's Orange Pippin..... | 226 | 7 4.226.684 5 54 59 8 | La Clermontoise..... | 234 |
| 4.217.878 5 4 9 | Court pendu noir..... | 227 | 4.227.791 55 37 | Cusset..... | 234 |

| Diagnosics | NOMS | Pages | Diagnosics | NOMS | Pages |
|----------------------|--------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|-------|
| 43 8 4.234.751 | Minister Von Hammerstein..... | 235 | 4.247.863 | Suisse Van Mons..... | 242 |
| 65 847 2 | | | 64 4.247.873 | Reinette de Bleinheim.. | 243 |
| 51 3 4.234.847 | Jeanne Hardy..... | 236 | 3 75 1 | | |
| 65 352 2 | | | 4.247.949 | Reinette étoilée..... | 244 |
| 86 4.241.971 | Faros..... | 236 | 1 8 | | |
| 5 52 88 | | | 14 81 4.247.997 | Reinette des Carmes..... | 244 |
| 2 4.242.671 | Reinette dorée de Versailles..... | 237 | 7 448 7 | | |
| 3 374 7 5 | | | 4 4.251.868 | Reinette de France..... | 245 |
| 6 8 4.242.788 | Ribston Pippin..... | 238 | 5 67 7 8 | | |
| 317 65 | | | 4.252.683 | Reinette de Metz..... | 246 |
| 7 4.243.557 | Reinette d'Angleterre.... | 238 | 754 | | |
| 17 641 | | | 3 4.252.697 | Reinette de Bretagne.... | 246 |
| 1 4.243.872 | Bovarde..... | 239 | 3 867 8 | | |
| 82 | | | 8 4.252.691 | Reinette Desplanches... | 247 |
| 4.244.753 | Kansas Queen..... | 239 | 5 67 | | |
| 3 5 942 | | | 4.252.693 | Bonne Hotture..... | 247 |
| 5 61 4.244.883 | Calville d'Oullins..... | 240 | 3 84 587 | | |
| 3 51 98 2 | | | 63 4.252.798 | Haloren..... | 248 |
| 27 1 4.245.848 | Reine des Reinettes..... | 240 | 5 87 67 9 | | |
| 3 54 53 | | | 6 74 4.252.877 | Newton Wonder..... | 249 |
| 7 28 4.245.852 | Ben Davis..... | 241 | 5 47 95 3 | | |
| 3 4 63 7 | | | 32 4 7 4.254.241 | Reinette de Demptézieu.. | 250 |
| 2 4.245.853 | Hoover..... | 242 | 3 25 372 6 7 | | |
| 3 5 966 | | | | | |

| Diagnostics | NOMS | Pages | Diagnostics | NOMS | Pages |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------|--------------------------------------------|----------------------------|-------|
| 4.254.364 5 6 6 | Reinette Suisse..... | 250 | 2 7 4.254.881 345 657 | Rambour d'hiver..... | 358 |
| 6 7 4.254.571 5 85 683 9 | Reinette Vignat..... | 252 | 4.254.882 3 42 977 | Ravillac..... | 259 |
| 2 4 4.254.587 3 7 | Ohio's Russet..... | 253 | 2 4.255.568 84 56 | Reinette grise d'hiver.... | 260 |
| 91 4.254.597 5 65 68 8 | Reinette du Canada grise..... | 252 | 1 4.255.657 64 861 | Bedforshire Fundling.... | 261 |
| 4.254.598 5 22 48 | Frémy..... | 251 | 7 9 4.255.783 5 67 72 4 | Groseille..... | 261 |
| 2 1 4.254.648 65 85 8 | Belle de Boskoop..... | 254 | 68 4.255.797 5 4 56 | Reinette de Bréda..... | 262 |
| 41 553 4.254.791 5 25 667 6 | Champ Gaillard..... | 254 | 4 4.255.867 5 352 9 1 | Sanguine du Rhin..... | 263 |
| 1 4.254.841 21 7 4 | Belle de Pontoise..... | 255 | 8 72 9 4.255.873 5 24 688 | Court pendu gris..... | 263 |
| 22 2 4.254.844 5 65 79 | Citron d'hiver (Suisse)... | 256 | 2 4.255.881 3 67 35 | Beauty of Kent..... | 264 |
| 98 4.254.853 361 944 77 | Winesap..... | 256 | 9 4.255.988 2 5 | Arkansas Black..... | 264 |
| 2 6 4.254.858 5 384 | Reinette de Chênée..... | 257 | 6 82 68 4.257.765 5 43 391 7 7 | Barbe..... | 265 |
| 4.254.878 3 3 5 44 | Blenheim pippin..... | 258 | 1 5 4.257.845 25 456 | Pearmain Herefordshire.. | 265 |


| Diagnostics | NOMS | Pages | Diagnostics | NOMS | Pages |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------|------------------------------------------|----------------------------|-------|
| 4.257.848 3 85 45 | Margille..... | 266 | 4 4.264.794 55 8 | Galantine..... | 274 |
| 8 44 65 4.257.884 5 25 976 6 | Châtaignier..... | 266 | 5 27 4.264.863 3 31 95 1 9 | Jonathan..... | 275 |
| 85 38 4.261.677 5 54 441 9 7 | Reinette du Canada blanche..... | 267 | 9 4 4.264.892 3 51 95 | Géante d'exposition..... | 275 |
| 5 5 4.261.882 94 96 | Reinette Parmentier..... | 269 | 52 75 4.264.986 31 89 | Belle fleur longue..... | 276 |
| 5 4.262.673 4 84 | Impériale ancienne..... | 269 | 2 74 4.265.161 94 397 | Calville Lesens..... | 277 |
| 35 58 4.262.861 326 23 54 3 | Délicieux..... | 270 | 4.265.761 9 | Dorée de Bœdiker..... | 277 |
| 4.264.153 5 51 74 | Reinette blanche de Champagne..... | 271 | 9 4.265.764 5 35 | Pigeonnet blanc d'hiver... | 278 |
| 3 7 4.264.187 3 21 34 | Belle Joséphine..... | 271 | 7 4.265.872 41 981 | Sainte-Barbe..... | 278 |
| 1 9 4.264.381 5 32 757 | Reinette de Cuzy..... | 272 | 9 4.265.883 57 766 | Brabant Belle-fleur..... | 279 |
| 81 7 4.264.648 5 357 53 8 | Baldwin..... | 273 | 2 83 4.267.767 5 5 55 | Winter Banana..... | 280 |
| 4.264.766 52 6 3 | Quertier..... | 273 | 8 25 8 4.267.853 5 54 984 92 | Reinette Baumann..... | 281 |

| Diagnostics | NOMS | Pages | Diagnostics | NOMS | Pages |
|-------------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------------------------|----------------------------|-------|
| 4.271.593 5 65 | Fenouillet gros..... | 282 | 94 6 1 4.287.793 55 3 4 61 | Grand'mère..... | 290 |
| 57 8 4.271.774 5 84 4 3 9 | Franc roseau..... | 283 | 5 4.287.877 7 7 3 | Bon pommier..... | 291 |
| 1 4.275.593 5 7 68 | Parangon de Dowiuny.... | 284 | 155 4.294.361 361.79 | Belle fille normande..... | 292 |
| 1 7 4.275.994 3 4 788 | Franc Rougeot..... | 285 | 1 16 4.294.751 5 65.327 | Calville blanc..... | 292 |
| 54 8 4.277.674 5 45 5 6 | Reinette de France..... | 285 | 3 6 4.295.381 67 7 | Doux d'argent..... | 293 |
| 5 4.281.871 4 87 | Double bon pommier..... | 286 | 1 4.361.752 25 63 9 | Calville Saint-Sauveur.... | 294 |
| 4.281.888 5 73 | Court pendu rouge..... | 287 | 5 8 2 4.364.961 23 739 | Calville rouge d'hiver.... | 294 |
| 4.282.872 71 | Nouvelle France..... | 287 | 221 36 4.385.686 5 137 778 92 6 | De l'Estre..... | 295 |
| 7 6 4.283.794 5 52 368 4 3 | Cravert..... | 288 | 6 6 4.392.771 167 2 2 | Fleiner du roi..... | 296 |
| 6 4.284.551 11 47 | Grand'mère bronzée..... | 289 | 5 5.215.734 4 27 6 | Api..... | 296 |
| 5 5 4.284.886 5 9 9 6 | Carrel..... | 289 | 5 3 5.215.828 4 44 54 | Reinette de Caux..... | 297 |
| 57 7 4.285.847 72 688 41 1 | Reinette Descardre..... | 299 | 5 5.215.852 47 2 2 | Rome's Beauty..... | 298 |
| | | | 6 5 9 5.215.853 4 87 968 2 8 | La Nationale..... | 298 |

| Diagnostics | NOMS | Pages | Diagnostics | NOMS | Pages |
|-------------|-------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------|-------|
| 5.217.79 | Prince Impérial..... | 299 | 9 | | |
| 62 | | | 5.254.733 | Cartaut..... | 308 |
| 5.221.533 | Reinette de Dieppedalle.. | 300 | 4 65 35 | | |
| 4 55 76 | | | 8 | | |
| 3 4 | | | 7 | | |
| 5.222.856 | Bohnapfel..... | 300 | 5.255.773 | Teint frais..... | 308 |
| 357 65 | | | 4 24 4 | | |
| 9 | | | 24 8 | | |
| 16 8 | | | 5.257.393 | Rose de Benaugé..... | 310 |
| 5.222.894 | Vérité..... | 301 | 4 45 264 | | |
| 43 63 | | | 8 4 | | |
| 4 | | | 5.257.884 | Belle de Magny..... | 310 |
| 83 72 | | | 4 42 973 | | |
| 5.222.858 | Calville d'Angleterre..... | 302 | 5.262.288 | Reinette Daniel..... | 311 |
| 54 98 | | | 4 5 35 | | |
| 4 | | | 1 | | |
| 17 8 | | | 57 27 | | |
| 5.225.875 | Gendreville..... | 302 | 5.264.351 | Gros Locard..... | 311 |
| 4 354 952 | | | 4 95 785 | | |
| 53 8 | | | 2 8 | | |
| 5.241.764 | Double rose..... | 303 | 5 697 | | |
| 14 5 | | | 5.264.758 | Ontario..... | 312 |
| 2 7 | | | 4 31 863 | | |
| 17 2 | | | 9 | | |
| 5.244.658 | Sturmer's pippin..... | 340 | 9 | | |
| 55 484 | | | 2 35 | | |
| 45 991 | | | 5.265.747 | Calville du roi..... | 310 |
| 5.251.873 | Bonne de mai..... | 304 | 4 37 22 | | |
| 4 312 688 | | | 8 | | |
| 4 57 | | | 6 | | |
| 5.252.387 | Reinette verte..... | 305 | 5.265.761 | Reinette dorée de Bœdiker..... | 314 |
| 47 9 | | | 9 | | |
| 5.252.663 | Royal Russet..... | 306 | 6 | | |
| 4 21 578 | | | 5.282.578 | Patte de loup..... | 314 |
| 8 | | | 4 7 6 | | |
| 5.252.875 | Chasseur de Menznau.... | 306 | 142 5 | | |
| 4 21 8 | | | 5.287.686 | De Fer..... | 315 |
| 4 2 | | | 4 355 79 | | |
| 5.254.548 | Reinette grise de Saintonge..... | 307 | 4 | | |
| 4 321 67 | | | 5 7 | | |
| 5 | | | 5.287.698 | Reinette Clochard..... | 316 |
| | | | 4 75 4 | | |

Clé pour l'identification des pommes

| I MATURITÉ | II RAPPORT HAUTEUR- LARGEUR | III SYMÉTRIE ET CONTOUR | | IV PROFONDEUR DES CUVETTES | V COULEUR | VI PEDICELLE ET OEIL | | VII CHAIR |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| 1 Juillet-août | 1 Plus haute que large. | Symétrique et à contour | | 1 régulièrement arrondi. Deux cuvettes profondes | 1 Blanchâtre ou jaune clair, Sans autre teinte. | Pédicelle long et | | 1 œil grand. Blanche, tendre, juteuse. |
| 2 Septembre- octobre. | | | | 2 irrégulièrement arrondi ou bossué Deux cuvettes moyennement profondes | 2 Jaune citrin ou foncé sans autre teinte. | | | 2 œil moyen. Blanche, peu juteuse |
| 3 Novembre- décembre. | | | | 3 côtelé. Deux cuvettes peu profondes | 3 Jaune maculé ou lavé de gris ou de brun vers le pédicelle. | | | 3 œil petit. Blanche, ferme, mais non croquante. |
| 4 Fin décembre Janvier-février. | 2 Plus large que haute. | Légèrement asymétrique et à contour | | 4 régulièrement arrondi. Cuvette du pédicelle prof. Cuvette de l'œil moyennement profonde. | 4 Jaune et légèrement marbré, taché ou voilé de gris ou de roux ailleurs que vers le pédicelle. | Pédicelle moyen et | | 4 œil grand. Blanche, croquante. |
| 5 Mars-avril- mai. | | | | 5 irrégulièrement arrondi ou bossué C. du pédicelle profonde. C. de l'œil peu profonde. | 5 Entièrement grise ou fort. tachée, voilé ou marbrée de gris ou fauve, sans teinte rouge. | | | 5 œil moyen. Blanc-verdâtre, tendre. |
| | | | | 6 côtelé Cuv. du p. moy ¹ prof. Cuv. de l'œil profonde. | 6 Entièrement grise ou simplement tachée ou marbrée de gris ou roux, avec teinte rouge ou rose. | | | 6 œil petit. Blanc-verdâtre, ferme |
| 5 Mars-avril- mai. | 3 Aussi haute que large. | Symétrique et à contour | | 7 régulièrement arrondi. C. du p. moy ¹ profonde. C. de l'œil peu profonde. | 7 Jaune plus ou moins teinté, taché, veiné de fauve, de bronzé, de roux ou de gris et frappé de rouge | Pédicelle court et | | 7 œil grand. Jaunâtre, tendre. |
| | | | | 8 irrégulièrement arrondi ou bossué Cuv. du péd. peu profonde. Cuv. de l'œil profonde. | 8 Striée de rouge ou de rose. | | | 8 œil moyen. Jaunâtre, ferme. |
| | | | | 9 côtelé Cuv. du péd. peu profonde Cuv. de l'œil moy ¹ pro. | 9 Entièrement ou presque entièrement rouge. | | | 9 œil petit. Plus ou moins rosée ou veinée de rose. |



Rougeur de Pêche


1.161.851

3 929

Fruit moyen. Épiderme blanc jaunâtre, abondamment frappé de rouge et strié, finement pruiné, parsemé de quelques points bruns. Pédicelle moyen ou mi-long, dans cuvette évasée, moyennement profonde ou profonde. Œil fermé, entouré de plis et de côtes (sur la moitié supérieure du fruit), dans cuvette profonde et étroite. Chair blanche, tendre, parfois un peu rougeâtre, relevée, acidulée, sans parfum spécial. Assez bonne.

Arbre de vigueur suffisante, à port buissonnant. Rameaux courts, de moyenne longueur, brindilles allongées.

Variété pour culture familiale : très appréciée en Suisse en raison de sa précocité.



Rose de Virginie

1.212.827

3

Fruit moyen, plus haut que large, ovoïde, souvent un peu tronqué. Épiderme blanchâtre, parsemé de quelques petits points rougeâtres, et un peu strié au soleil. Pédicelle moyen ou assez long, grêle, dans cuvette assez profonde, peu ou pas rouillé. Œil fermé, dans cuvette moyennement profonde, cernée de légères côtes. Chair jaune pâle, vineuse, légèrement acidulée, peu sucrée, Assez bonne.

Arbre vigoureux, érigé, très fertile. Rameaux brun-olivâtre, longs et gros. Yeux moyens, appliqués. Feuilles assez grandes, elliptiques, presque planes, mi-souples. Vert terne ; dents mi-aiguës ou obtuses ; pétiole gros. Bouton conique duveteux, terminant souvent les brindilles.

Variété très hâtive, très prisée sur les marchés suisse.

Transparente blanche

Syn. : *Bely naliv* (Russe).


1.214.141

2

Fruit moyen. Épiderme lisse, pruiné, puis visqueux, jaune blanchâtre, quelquefois saumoné au soleil, montrant parfois une sorte de couture caractéristique. Pédicelle assez court ou moyen dans cuvette à bord irrégulier, brun verdâtre. Œil grand, fermé, sépales développés, dans cuvette étroite, boursouflée, à bord côtelé. Chair blanche tendre juteuse, acidulée quoique douceâtre. Bonne ou assez bonne.

Arbre vigoureux, érigé, fertile tous les 2 ans. Rameaux droits, acajou, assez duveteux; lenticelles rondes ou allongées, peu nombreuses. Yeux petits, courts, appliqués. Boutons gros. Feuilles longues, ovales-lancéolées vert clair; dents régulières. Fleurs grandes, rose pâle, mi-hâtives.

Variété d'amateur et de commerce en Suisse.


**Beauty of Bath**

1.215.958

8 9


Fruit moyen, sphérique, aplati, tenant bien à l'arbre, symétrique, assez arrondi au pourtour. Épiderme lisse, à fond jaune verdâtre, puis jaune-orange recouvert, d'un rouge vif fortement strié, un peu pruiné, parsemé de points banc jaunâtre. Pédicelle fort, ligneux, moyen, dans cuvette profonde, large, parfois faiblement rouillée, oeil demi-ouvert ou ouvert; sépales allongés dans cuvette peu profonde, régulière; chair jaunâtre ou blanchâtre veinée de rouge, ferme, acide et parfumée, juteuse. Bonne.

Arbre de vigueur modérée, très fertile.



Feuilles ovales, allongées, finement dentées, vert fond luisant. Floraison mi-hâtive, peu sensible aux gelées.

Variété d'amateur et d'apparat, très hâtive, non saisonnière; craint le carpocapse; gagne à être éclaircie puis entrecueillie. Planter en sol substantiel ; convient pour petites formes.



Astracan rouge

Syn. : *Astracan* ; *Transparente rouge*; *Vermillon d'été*.

2
1.217.743
24 51


Fruit moyen. Épiderme épais, jaune verdâtre, maculé de brun verdâtre vers le pédicelle, ponctué de gris, frappé de rose carmin, très finement strié ou non. Pédicelle fort, arqué, légèrement renflé à l'extrémité, dans cuvette large. Œil grand, mi-clos, dans cuvette large, à bord légèrement ridé ou côtelé ; chair blanche, juteuse, sucrée, parfumée ; bonne.

Arbre de bonne vigueur, très fertile. Rameaux moyens ou assez gros, coudés, duveteux, vert brunâtre ou brun rougeâtre. Lenticelles petites, peu nombreuses, rondes, blanchâtres, peu saillantes. Yeux assez gros, duveteux, appliqués. Feuilles moyennes, elliptiques, étalées ou un peu arquées, souples, vert foncé. Dents aiguës. Boutons petits, arrondis, cotonneux. Fleurs grandes, de moyenne saison.

Variété d'amateur ; sensible à la tavelure ; à greffer sur Doucin ou Paradis; réussit en montagne.

Framboise d'OberlandSyn. : *Framboise*.

67 1
1.222.962
353 836



Fruit gros ou surmoyen. Épiderme jaune verdâtre finement ponctué de grisâtre, frappé de rouge foncé abondamment strié.


Pédicelle moyen ou long, oblique, œil moyen ou petit, clos ou mi-clos, dans cuvette plissée. Chair mi-tendre ou mi-ferme blanche ou légèrement jaunâtre, veinée de vert, juteuse, sucrée, acidulée, parfumée. Bonne.

Arbre assez vigoureux, érigé, fertile. Rameaux longs, forts, brun-violacé, duveteux. Lenticelles abondantes, grosses, rondes et allongées saillantes. Yeux moyens, ovoïdes, allongés, faiblement écartés. Feuilles grandes, ovales, vert foncé, gaufrées, à bord légèrement ondulé. Dents grandes, peu profondes. Floraison tardive.

Variété d'amateur ; laisse tomber assez facilement ses fruits : à cultiver de préférence en moyenne forme.

BorovitskySyn. . *Borowinka; Barovitsky; Charlamousky; Duchesse d'Oldenbourg*.

8
1.224.851
85 23
6



Fruits moyens attachés par 1 et 2. Épiderme lisse, luisant, blanchâtre ou jaune clair, maculé de gris verdâtre vers le pédicelle, frappé de rouge vif, abondamment strié de rouge foncé. Pédicelle de longueur variable, dans cavité large. Œil fermé dans cuvette large, plissée. Chair blanche, mi-ferme, légèrement sucrée, acidulée, parfumée, avec zone verdâtre ; bonne.

Arbre de vigueur moyenne, érigé, très fertile. Rameaux assez courts, brun rougeâtre. Lenticelles petites, assez nombreuses, arrondies, saillantes, yeux courts, appliqués. Feuilles grandes, ovales, épaisses, vert foncé, planes, légèrement plissées. Dents irrégulières, arrondies. Boutons gros. Fleurs grandes, hâtives.

Variété d'amateur et de marché ; s'accommode de tous porte-greffes ; préfère les formes basses sur lesquelles la chute des fruits est restreinte.


Fraise

Syn. : *Madeleine rouge*

6

1.227.969

55 851



Fruit moyen ou assez gros. Épiderme rouge clair, parsemé de quelques points jaunâtres ; rayé de rouge foncé pruiné et finalement entièrement rouge foncé. Pédicelle moyen, dans cuvette irrégulière. Œil clos aux sépales larges, dans cuvette large, plissée ou côtelée. Chair blanchâtre, rosée sous la peau, et veinée de même, sucrée, juteuse, parfumée; bonne.

Arbre vigoureux, mi-étalé, fertile. Rameaux moyens, brun rougeâtre, yeux moyens, appliqués. Lenticelles peu nombreuses assez grandes, arrondies. Feuilles grandes, allongées, épaisses, creusées en gouttière. Dents arrondies.

Variété d'amateur et à cuire ; toutes formes.

Antonowka


1.254.161

2 65 39

Fruits gros attachés par 2. Épiderme blanchâtre fortement lavé de gris autour du pédicelle. Pédicelle gros à l'extrémité, parfois éperonné, dans cuvette large à bord ondulé ; œil clos, dans cuvette étroite, fortement plissée ou côtelée ; chair blanche, tendre, juteuse, sucrée, acidulée, avec zone verdâtre.

Arbre très vigoureux, érigé, fertile. Rameaux gros et forts, brun foncé. Lenticelles rondes. Yeux aplatis et appliqués. Feuilles grandes, larges, vert franc ouvert foncé, mi-épaisses. Dents aiguës, assez profondes. Pétiole court.

Variété d'amateur.

**Rose**


1.285.761


2 4 57

Fruit moyen, épiderme fin, lisse, brillant, jaune clair, peu ou pas marbré de gris, finement pointillé, frappé de rose foncé très finement ou pas strié. Pédicelle assez gros dans cuvette à bord ondulé œil mi-clos, dans cuvette mi-étroite, à contour côtelé ; chair blanchâtre presque tendre, sucrée acidulée ; assez bonne.

Arbre de vigueur suffisante, fertile. Rameaux assez forts, brun grisâtre. Lenticelles peu nombreuses, rondes, yeux gros. Feuilles grandes, elliptiques, allongées, épaisses, vert foncé. Dents grandes, aiguës.

Variété d'amateur.





Rose de Bohême

1.292.841


6 97

Fruits moyens asymétriques côtelés. Épiderme mince, lisse, à fond jaunepaille ou blanchâtre fortement frappé de rose avec stries peu accusées, d'un rose plus foncé ; légèrement pruiné ; lavé de rouille autour du pédicelle. Pédicelle court ou moyen, assez fort, dans cuvette moyennement profonde, large, bosselée. Œil grand, ouvert, à longs sépales séparés, dans cuvette moyennement ou peu profonde, large et côtelée. Chair blanche, demi-tendre, juteuse, acidulée ; assez bonne.

Arbre vigoureux, assez fertile. Rameaux brun marron, mi-courts. Lenticelles rondes ou ovales ; stipules courtes. Feuilles grandes, elliptiques, étalées à bord ondulé. Dents arrondies, pétiole et nervures rougeâtres. Bouton moyennement arrondi.

Variété d'amateur, pour compotes et beignets.

L'arbre laisse tomber facilement ses fruits.



Polystica

67 7

1.293.894

82 988


Fruits gros attachés isolément ou par 2. Épiderme lisse pointillé de blanc verdâtre, marbré de fauve vers le pédicelle, frappé de rose avec ou sans stries. Pédicelle fort, dans cuvette large ; œil clos dans cuvette élargie, plissée ; chair acidulée, juteuse, sans parfum spécial ; assez bonne.

Arbre vigoureux, fertile. Rameaux gros, allongés, olivâtres, rougeâtres à l'insolation. Lenticelles grosses, rondes, saillantes, assez nombreuses. Yeux appliqués. Feuilles surmoyennes, ovales-allongées, vert franc ou foncé, épaisse, planes. Dents irrégulières, aiguës. Variété d'amateur.

Grand Alexandre

Syn. : *Albertin; Aporta; Aubertin ; Corail ; Empereur Alexandre de Russie; Gros Alexandre.*

5 4
2.234.871
21 87



Fruits gros ou très gros, isolés ou par 2. Épiderme à fond blanchâtre ou jaune verdâtre, lavé de rouge ou de rose vif, strié, légèrement pruiné. Pédicelle moyen dans cuvette moyennement évasée, à bord régulier. Œil ouvert ou mi-clos dans cuvette étroite. Chair blanchâtre, juteuse, tendre, légèrement parfumée; bonne.

Arbre vigoureux, érigé, puis mi-étalé, très fertile. Rameaux moyens ou grêles, longs, vert brun ou rougeâtre ; yeux courts ; lenticelles rondes. Feuilles grandes, elliptiques, allongées, gaufrées, vert franc ou vert foncé. Dents peu profondes, obtuses. Boutons assez gros. Fleurs grandes, hâtives.


Variété de commerce, d'apparat et d'amateur.

A greffer sur Doucin ou Paradis ; toutes formes naines et d'espalier ; terre riche et profonde ; supporte bien l'altitude.

Rambour franc

Syn. : *Charmant ; de Notre-Dame; de Rambure; La Lorraine; Rambour d'été.*

54
2.235.881
1 27 93
6




Fruits gros ou moyens, isolés ou par 2 et 3. Épiderme lisse, mince, jaune clair ou citrin, à peine ou franchement teinté de rose vif, veiné de rouge ; parsemé de quelques petits points ronds blanc-jaunâtre, lavé ou marbré de fauve vers le pédicelle. Pédicelle fort, dans cuvette large, plus ou moins

profonde, à bord ondulé. Œil mi-clos, à forts sépales, dans cuvette peu profonde, cernée de menues côtes. Chair blanche, tendre, juteuse, acidulée ; loges petites ou moyennes, cernées de vert ; pépins sous-moyens. Bonne ou assez bonne.

Arbre vigoureux, assez fertile. Rameaux brun-rougeâtre. Lenticelles nombreuses, petites, rondes ou ovales. Yeux moyens. Feuilles moyennes, ovales, arrondies, vert franc, plissées, étalées, mi-rigides. Dents obtuses ou mi-aiguës. Boutons petits.

Variété de commerce, d'amateur ; à cuire.



Transparente de Croncels

6 39
2.254.168
3 385 75
28

Fruit gros. Épiderme jaune blanchâtre, ponctué de gris clair, parfois légèrement taché de gris vers le pédicelle, assez fréquemment rosé à l'insolation. Pédicelle gros, dans cuvette, mi-étroite, à bord ondulé. Œil clos, dans cuvette plissée. Chair jaunâtre, légèrement saumonée, ferme, juteuse acidulée ; bonne.

Arbre vigoureux, mi-étalé, fertile. Rameaux forts, brun-verdâtre ; lenticelles rondes, assez grosses ; yeux petits, appliqués ; feuilles grandes, ovales, vert franc, mi-parcheminées, nervées, à bord légèrement ondulé. Dents obtuses ou aiguës, irrégulières. Boutons gros ou moyens, ovoïdes, brun-rougeâtre. Pétiole long, fort, renflé et rosé à sa base, formant un angle très aigu avec le rameau.

Variété d'amateur ; convient au verger, mais à l'abri des vents ; apte à la culture en pot ; résiste, au puceron lanigère.


Calville de Boskoop

6
2.257.191
3 385 3

Fruit gros. Épiderme luisant, blanchâtre ou jaune paille unicolore, à peine taché de gris vers le pédicelle, légèrement pointillé de brun; parfois marbré de fauve et même rouge légèrement strié. Pédicelle gros, dans cuvette étroite. Œil petit, clos, presque à fleur de peau ou dans cuvette très étroite à bord bosselé ; chair blanchâtre veinée ou avec zone jaunâtre, tendre, sucrée, bonne.

Arbre de vigueur moyenne, fertile. Rameaux brun rougeâtre. Lenticelles rondes, saillantes. Yeux gros, larges. Feuilles grandes, elliptiques, vert foncé, luisantes, épaisses, presque planes. Dents obtuses.


Variété d'amateur pour petites formes.

**Elisa Rathke**

2.257.891
3 68 8


Fruit moyen ou surmoyen. Épiderme lisse, jaune citrin, garni de quelques petits points gris, marbré de fauve verdâtre vers le pédicelle, à peine frappé de rose, veiné de rouge. Pédicelle fort, court et arqué dans cuvette étroite et bosselée au pourtour. Œil clos, petit ou moyen, à sépales courts, dans cuvette étroite, cernée de côtes et plissée. Chair blanchâtre, tendre, peu sucrée, acidulée, juteuse, assez bonne.

Arbre de vigueur bonne ou moyenne, pleureur, très fertile.



Rameaux brun foncé, moyens, étalés. Lenticelles arrondies, saillantes, rares. Yeux moyens, courts, duveteux, appliqués. Feuilles moyennes, elliptiques ou ovales allongées, parfois plissées, planes, mi-souples. Dents irrégulières, arrondies, ou obtuses. Boutons moyens, arrondi, très duveteux.

Variété d'amateur ou à deux fins; à greffer en tête à 2m,50 pour faire des arbres pleureurs.



Codlin hollandais

29 671
2.262.393
3 353 48
25


Fruit moyen ou surmoyen. Épiderme mince, lisse, jaune, légèrement marbré ou taché de gris-rouille ailleurs que vers le pédicelle ; légèrement frappé de rose à l'insolation. Pédicelle fort, parfois charnu, dans cuvette étroite, bosselée au pourtour. Œil assez grand, clos ou mi-clos dans cuvette moyennement profonde, plissée, à bord un peu côtelé. Chair blanche, tendre, juteuse, sucrée, légèrement acidulée ; à loges centrales plutôt creuses ; bonne.

Arbre moyennement vigoureux, bien fertile. Rameaux grêles, vert brun. Lenticelles abondantes, rondes et elliptiques, saillantes. Yeux gros, obtus, appliqués. Feuilles petites, ovales à longue pointe, aiguës, plissées, gaufrées, mi-creusées, mi-rigides, vert foncé. Dents irrégulières, arrondies ou obtuses. Pétiole grêle. Fleurs grandes, hâtives.

Variété d'amateur; à cultiver en formes naines.

Wilson June

4
2.267.951
25 84
1




Fruits moyens, isolés, à contour presque arrondi mais toujours légèrement côtelé. Épiderme lisse remarquablement rouge foncé ou vif avec stries foncées à peine visibles, taches jaune clair à l'ombre ; finement pointillé de gris clair. Pédicelle moyen, grêle, dans cuvette profonde, étroite, gibbeuse. Œil moyen ou assez grand, clos, à longs sépales, dans cuvette peu profonde fortement plissée et entourée de menues bosses. Chair blanche veinée de jaune, assez tendre, suffisamment juteuse, creuse au centre, sans parfum ; assez bonne.

Arbre de vigueur modérée, bien fertile. Rameaux grêles, rougeâtres; lenticelles rondes ou ovales. Feuilles moyennes ou petites, ovales, planes; dents demi-aiguës.

Variété de marché et d'apparat; convient aussi pour amateur.

Norfolk Beauty


2.275.853
3 47 1



Fruit petit. Épiderme jaune clair marbré de fauve aux extrémités, teinté de rose, veiné de rouge. Pédicelle grêle, renflé à l'extrémité, dans cuvette large. Œil mi-clos dans cuvette large, plissée. Chair blanche, ferme.

Arbre de faible vigueur, très fertile. Rameaux grêles, brun-violacé. Lenticelles peu nombreuses rondes, grisâtres. Yeux appliqués. Feuilles moyennes, vert foncé. Dents petites, aiguës. Boutons moyens. ovoïdes.

Variété d'amateur.

**Zurich**


2.281.152

46

Fruits gros ou moyen attachés par 1 ou 2. Épiderme lisse, blanc jaunâtre, marbré ou non de brun ; légèrement maculé de gris vers le pédicelle, un peu frappé ou strié de rose. Pédicelle fort, dans cuvette étroite, à bord ondulé. Œil clos dans cuvette étroite, côtelée et fortement plissée. Chair blanche un peu veinée de vert, peu juteuse, très tendre ; bonne.

Arbre de belle vigueur; assez fertile. Rameaux moyens brun foncé. Lenticelles petites, rondes, saillantes. Yeux appliqués. Feuilles larges, planes, elliptiques, arrondies, vert franc, plissées. Dents moyennes, obtuses ou mi-aiguës.

Variété d'amateur et d'apparat : à cultiver en petites formes.

**Mignonne d'été**

2.2922.989

1

Fruit moyen. Épiderme lisse, et brillant entièrement rouge vif, plus foncé à l'insolation. Pédicelle court dans cuvette étroite, bosselée. Œil clos, dans cuvette étroite, cernée de côtes inégales. Chair blanc rosé ou blanc veiné de rose, mi-tendre, peu juteuse, sucrée; assez bonne.

Arbre de moyenne vigueur, suffisamment fertile.

Jaune hâtive

5
2.391.897
64 8




Fruit assez gros. Épiderme jaune citrin luisant, onctueux, un peu pointillé de gris, parfois presque entièrement frappé de rose avec stries à l'insolation. Pédicelle grêle dans cuvette étroite à bord ondulé. Œil clos dans cuvette étroite, entourée de côtes légères qui se prolongent au milieu du fruit. Chair blanc jaunâtre, creuse au centre, tendre, juteuse, sucrée, douce, très bonne. Arbre très vigoureux, très fertile.

Pigeon de Jérusalem

Gros Pigeonnet rouge ; Pigeon d'hiver.


3.187.833
4 5



Fruits moyens, asymétriques à contours très irréguliers attachés par 2. Épiderme mince, lisse à fond jaune citrin, largement teinté de rose ou de rouge clair, un peu strié, parsemé de points blanchâtres. Pédicelle assez long grêle, arqué, dans cuvette moyennement profonde, petite, étroite, irrégulièrement arrondie. Œil petit ou moyen, resserré par de petites protubérances, dans cuvette peu profonde ou superficielle et plissée. Chair blanche fine, serrée, ferme, mi-juteuse, un peu sucrée, mi-acidulée avec zone intérieure verdâtre. Bonne.

Arbre moyennement vigoureux, moyennement fertile. Rameaux grêles, brun-rougeâtre. Lenticelles allongées. Yeux gros. Feuilles petites, ovales, vert clair, mi-rigides, à bords relevés et un peu ondulés. Dents mi-aiguës, pétiole grêle.

Variété pour amateur ; réussit en toutes formes.




Reinette de Landsberg

5
3.214.267
25 3

Fruit moyen. Épiderme lisse, mince, jaune, légèrement pointillé de gris, maculé de fauve vers le pédicelle. Pédicelle grêle, arqué, dans cuvette étroite. Œil mi-clos dans cuvette étroite cernée de côtes, plissée. Chair jaunâtre sucrée, juteuse. Bonne.

Arbre de moyenne vigueur, de bonne fertilité. Rameaux gros, courts, peu duveteux, brun violacé. Lenticelles petites. Yeux moyens, appliqués. Feuilles moyennes, allongées, vert franc, tourmentées. Dents grandes, profondes, arrondies ou obtuses. Boutons moyens, ovoïdes. Variété d'amateur.



Sans Pareille de Peasgood

Syn. : *Peasgood's Nonesuch*.

4 41
3.214.877
2 25 58


Fruits très gros attachés par un ou deux. Épiderme jaune pâle, pointillé de gris, teinté de rose avec stries rouge carmin. Pédicelle de moyenne force, dans cuvette large, teintée de gris. Œil ouvert dans cuvette assez étroite, plissée. Chair blanc-jaunâtre sucrée, acidulée, juteuse, parfumée, bonne.

Arbre vigoureux, très fertile, érigé. Rameaux assez longs, brun foncé ou verdâtres, parfois rougeâtres. Lenticelles peu nombreuses, petites, rondes. Yeux gros, obtus. Feuilles assez grandes, ovales, ou elliptiques, rigides, vert franc, luisantes, un peu plissées, à bord faiblement relevé, pointe recourbée. Dents obtuses ou aiguës. Boutons moyens, ovoïdes, aigus, un peu cotonneux, marrons. Fleurs grandes, assez tardives.

Variété d'apparat, d'amateur et de commerce sensible au monilia ; à cultiver en petites formes greffées sur paradis ou doucin.

Mac Intosh

5
3.215.969
4 24 731




Fruit moyen ou surmoyen. Épiderme mince, résistant, rouge foncé violacé, à peine pointillé de blanc jaunâtre. Pédicelle court dans cuvette large, à bord ondulé. Œil clos, dans cuvette étroite, à bord presque uni. Chair blanche ou rosée, tendre, juteuse, un peu sucrée; bonne ou assez bonne. Arbre de vigueur et de fertilité moyennes. Rameaux grêles, brun foncé. Lenticelles assez nombreuses, petites, rondes, saillantes. Yeux petits ou moyens. Feuilles moyennes, elliptiques, vert clair, plissées, étalées peu épaisses. Dents arrondies. Foutons marron, allongés.

Variété américaine, d'apparat, de table ou à cuire.

Gravenstein

Syn. : *A. Grafenstein*.


8 5
3.225.881
2 51 77



Fruit moyen. Épiderme mince, lisse, visqueux, jaune doré, largement teinté de rose carmin, recouvert de stries entrecoupées. Pédicelle fort, dans cuvette étroite, à bord ondulé et maculée de roux. Œil clos, dans cuvette étroite, plissée, entourée de petites côtes. Chair blanchâtre ou jaunâtre, mi-tendre, juteuse, un peu creuse au centre. Bonne.

Arbre de vigueur moyenne, étalé, suffisamment fertile. Rameaux gros, longs, étalés, duveteux, brun violacé. Lenticelles peu nombreuses, rondes, blanchâtres. Yeux appliqués. Feuilles ovales, vert foncé, creusées en cuiller. Dents petites, aiguës. Fleurs grandes, hâtives.

Variété d'amateur.

**Glogiowka**

96 64
3.227.751
2 3 86
7

Fruit moyen ou assez gros. Épiderme lisse, épais, jaune clair, teinté de rose, pointillé de verdâtre ou de blanchâtre, un peu lavé de fauve vers le pédicelle, quelquefois même marbré de rouille au pourtour. Pédicelle grêle, arqué, enflé à son extrémité, dans cuvette étroite. Œil mi-clos dans cuvette étroite, plissée et côtelée au sommet. Chair sucrée, acidulée, juteuse, bonne.

Arbre de vigueur moyenne, fertile, mi-étalé, rustique. Rameaux retombants, grêles, duveteux, vert brunâtre ou brun violacé. Lenticelles peu nombreuses, petites. Yeux moyens obtus ou arrondis, appliqués. Feuilles moyennes, elliptiques, vert franc, épaisses, souples. Dents petites, peu marquées.

Variété d'amateur, mais qui convient pour verger et pour le marché.

**Jubilé d'Argovie**

3.232.281
4 6 79


Fruit gros. Épiderme lisse, jaune clair, parfois teinté de rose, parsemé de quelques petits points verdâtres. Pédicelle fort dans cuvette large à bord ondulé. Œil clos, dans cuvette peu profonde, assez étroite, cernée de côtes. Chair blanche assez tendre.

Arbre très vigoureux, fructifiant abondamment mais irrégulièrement. Rameaux gros, forts, brun rougeâtre. Yeux appliqués. Feuilles grandes, ovales-arrondies, vert foncé, épaisses, planes, dents grandes, profondes, aiguës.

Variété suisse.

Calville rouge du Mont-d'Or

55
3.232.997
2 367 761
94




Fruit surmoyen ou gros. Épiderme mince ou mi-mince, lisse, jaune clair presque entièrement teinté de rose clair, frappé de rouge ou de rose vif, un peu pruiné, parfois entièrement rouge (coloris délicatement rose après ensachage). Pédicelle presque grêle, dans cuvette étroite lavée de gris. Cuvette de l'œil étroite, côtelée et plissée. Chair blanche ou blanchâtre avec zone verdâtre, fine, tendre, sucrée, parfumée, juteuse ; bonne.

Arbre de vigueur moyenne, étalé, très fertile. Rameaux longs, moyennement gros, brun-verdâtre. Lenticelles mi-abondantes, grosses, rondes. Yeux moyens, appliqués. Feuilles assez grandes, ovales, arrondies, gaufrées, plissées. Dents arrondies. Fleurs grandes, nombreuses, hâtives.

Variété de commerce et de luxe ; se prête à la photographie sur fruit ; à cultiver en petites formes et en espalier. Redoute le, puceron lanigère.

Cellini

8
3.216.871
4 72 947




Fruit surmoyen ou gros, un peu asymétrique, au pourtour plus ou moins arrondi. Épiderme lisse, luisant ; à fond jaune paille abondamment ou presque entièrement rose on rouge clair, finement strié de rouge carmin, taché de gris verdâtre autour du pédicelle et parsemé d'assez nombreux et gros points gris, plus nombreux et plus fins vers l'œil.

Pédicelle gros, moyen ou assez court, dans cuvette large, moyennement profonde au bord largement mamelonné. Œil grand, ouvert, aux sépales larges et étoilés, mais le plus souvent sans sépales, dans cuvette moyennement profonde, ou profonde, étroite, irrégulièrement arrondie, plissée vers le calice à bord lisse, ondulé. Chair blanc jaunâtre, mi-ferme, juteuse, un peu acidulée, légèrement aromatique.

Arbre de vigueur modérée, au port étalé, assez fertile. Rameaux assez courts, forts, brun violacé, lenticelles allongées et rondes, non saillantes. Yeux ovoïdes, s'écartant du rameau. Bouton assez gros, arrondi, blanchâtre. Feuilles moyennes, elliptiques, allongées, mi-souples, gaufrées, vert franc, dents irrégulières, assez profondes et aiguës ; pétiole court assez fort, rouge.

Variété pour amateur ; pour formes naines ; un peu sensible au puceron lanigère.



La Fameuse

Syn. : *Fameuse* ; *De neige* ; *Sanguineus* ; *Snow Apple* ; *Snow Chimney*.

1
3.247.891
75 6


Fruit petit ou moyen. Épiderme lisse à fond jaune blanchâtre avec quelques rares points bruns, partiellement taché de bronzé, nuancé de rose, abondamment strié de rose vif. Pédicelle grêle, dans cuvette évasée, légèrement ondulée. Œil mi-clos, dans cuvette large, un peu plissée. Chair blanche, tendre, sucrée; bonne.

Arbre de bonne vigueur, moyennement fertile. Rameaux assez forts, brun-violacé, lenticelles peu nombreuses, blanchât, rondes. Yeux petits. Feuilles moyennes ou petites, ovales, épaisses. Dents aiguës ou obtuses.

Variété d'amateur ; réussit bien au verger, mais donne des fruits plus gros en cordon.

Dantziger KantapfelSyn.: *Calville de Dantzig*.

6
2
3.251.951
9 8
8




Fruit assez gros. Épiderme mi-épais, résistant, visqueux rouge mi-foncé, peu brillant, fréquemment marbré de gris brun et plus ou moins strié de rouge. Pédicelle plus ou moins grêle, dans cuvette évasée, maculée de gris foncé. Œil mi-clos dans cuvette profonde, étroite, plissée, à bord côtelé. Chair blanche, tendre, avec zone ou veines verdâtres, légèrement acidulée. Assez bonne ou bonne.

Arbre très vigoureux. Rameaux brun grisâtre, un peu cotonneux; Mérithalles longs. Lenticelles rondes, petites, jaunâtres. Feuilles grandes, elliptiques, étalées, gauffrées. Dents grandes, arrondies ; pétiole moyen, un peu rosé, de 3 centimètres.

Variété commerciale (allemande) ; s'accommode de toutes formes.

Président Defaye Dumonceau

65 47
3.254.641
2 21 857




Fruits gros ou très gros légèrement côtelée, attachés par 1 et 2. Épiderme fin, à fond jaune d'or ou citrin ou jaune

verdâtre, parfois voilé de fauve avec quelques gros points gris anguleux; largement teinté, de rouge peu foncé, terne. Pédicelle fort, dans cuvette large teintée de gris. Œil grand, mi-clos, dans cuvette large, légèrement plissée et bosselée. Chair blanchâtre ou jaunâtre, tendre avec zone intérieure verdâtre, mi-juteuse, un peu sucrée, acidulée, très parfumée ; loges grandes ; pépins petits, noirâtres. Bonne ou très bonne.

Arbre vigoureux, modérément ou peu fertile. Rameaux peu nombreux, assez gros, assez courts, brun-verdâtre. Lenticelles peu nombreuses rondes, saillantes. Yeux moyens appliqués. Feuilles larges, elliptiques ou ovales arrondies, planes, souples, vert franc. Dents aiguës, profondes ; pétiole court ; stipules très développées. Boutons assez gros, coniques.

Variété d'amateur et d'apparat.



De Lande

3.254.849


Fruit moyen bosselé, au coloris particulier. Épiderme lisse, mi-mince, résistant, à fond jaune pâle, fauve dans la cuvette du pédicelle, presque entièrement rose pâle, légèrement strié de carmin, un peu duveteux et à peine pruiné. Pédicelle moyen, fort, mi-charnu, renflé aux extrémités, dans cuvette étroite, et profonde à bord uni. Œil grand, mi-ouvert, plissé, à sépales forts et retournés vers l'extérieur dans cuvette moyennement profonde, mi-étroite, plissée, à bord un peu mamelonné. Chair blanche, mais teintée ou veinée de rose vers l'épiderme, ferme et cassante, juteuse, sucrée, douce. Bonne.

Arbre de vigueur modérée, moyennement ou assez peu fertile.

Royale d'Angleterre

Syn. : *Reinette d'Angleterre hâtive* ; *Reinette rayée de rouge* ; *Roubau*.


5 46
3.254.887
4 361 658



Fruits gros, isolés ou par 2 et 3. Épiderme mince, parcheminé, lisse, jaune citrin clair, maculé de gris bronzé autour du pédicelle, marbré ou plus ou moins voilé de même au pourtour, légèrement teinté de rouge clair et finement rayé de rouge à l'insolation, finement ponctué de gris-foncé. Pédicelle fort, dans cuvette étroite et profonde. Œil mi-clos, dans cuvette large, plissée, irrégulièrement côtelée, sépales assez longs. Chair blanchâtre ou jaunâtre, avec zone verdâtre autour des loges, mi-ferme, juteuse, peu acidulée, mi-sucrée ; bonne.

Arbre vigoureux, érigé moyennement fertile. Rameaux forts. Lenticelles rondes. Yeux gros. Feuilles assez grandes, ovales, planes, parcheminées, vert foncé. Dents grandes, aiguës. Boutons moyens ou petits, obtus. Fleurs grandes, très légèrement rosées, hâtives.

Variété d'amateur et de marché ; toutes formes.




Merveille de Chelmsford

22 8
3.255.893
4 84 568
67

Fruits gros réunis par 1 ou 2, un peu côtelés au pourtour et montrant parfois une sorte de couture saillante. Épiderme lisse, mince, jaune-paille à l'ombre et citrin au soleil, peu ou pas veiné de fauve, parsemé de points gris foncé anguleux, lavé de rouge clair avec légères stries. Pédicelle moyen, dans cuvette étroite, maculée de fauve. Œil petit ou moyen, clos, dans cuvette plissée plus ou moins profonde, à bord irrégulier. Chair blanche ou jaunâtre, ferme, mi-fine, acidulée, juteuse, zone médiane jaunâtre, peu parfumée; bonne ou assez bonne.

Arbre très vigoureux, très fertile. Rameaux brun-verdâtre. Lenticelles rondes; mérithalles courts. Yeux petits, feuilles petites ovales-elliptiques, vert foncé, brillantes, épaisses mais souples, convexes, à bord parfois ondulé; dents obtuses ou mi-aiguës. Boutons petits, ronds.

Variété d'amateur, très méritante; pour moyennes et petites formes.



Cœur de bœuf

Syn. : *De Rouviau* ; *Sanguine* ; *De Caillot Rosat* ; *Couchine rouge*.

3.257.986
4 6

Fruit gros ou très gros, sphérique ou sphéroconique, rétréci à la base et côtelé. Épiderme lisse mi-épais, rouge lie de vin à l'ombre, frappé de carmin foncé, terne ou violacé à l'insolation; abondamment recouvert d'une efflorescence violacée; finement ponctué de gris-jaunâtre. Pédicelle

court, fort, dans cuvette moyennement profonde, large, parfois ondulée sur le bord. Œil moyen ou grand, mi-clos, à longs sépales, dans cuvette peu profonde plissée et finement côtelée. Chair verdâtre, spongieuse, assez ferme, légèrement acidulée, peu sucrée et sans parfum ; plutôt à saveur herbacée. Bonne, cuite; médiocre, crue.


Arbre très vigoureux, étalé, fertile. Rameaux peu nombreux, forts et longs, très duveteux, rouge foncé nuancé de gris. Lenticelles rondes peu nombreuses. Yeux gros, ovoïdes, appliqués. Feuilles grandes, ovales, luisantes; dents peu profondes.

Variété pour collection.

Chailleux

3.261.697

4 3 1




Fruits surmoyens presque réguliers, côtelés ou très bosselés, attachés par 2.

Épiderme mi-mince, parcheminé, mi-rugueux, jaune d'or, frappé de rouge terne assez foncé, avec ou sans stries étroites, recouvert d'une marbrure saillante, bronzée ou rousse, taché de même autour de l'œil, parsemé de quelques points brun clair. Pédicelle grêle, moyen ou court, dans cuvette mi-étroite à bord ondulé. Œil petit, clos, dans cuvette étroite, irrégulièrement arrondie, à bord ondulé ou côtelé. Pépins courts, renflés, brun foncé, dans loges assez vastes. Chair blanchâtre ou jaunâtre, fine, mi-tendre, sucrée, suffisamment juteuse et parfumée. Bonne ou très bonne.

Arbre de vigueur et de fertilité moyennes. Rameaux brun foncé; lenticelles rondes ou allongées. Feuilles moyennes, rigides au toucher, à bords un peu ondulés, et relevés en gouttière.

Variété de commerce ; pour verger; s'accommode de toutes formes.



Ménagère


Syn. : *De Livre* ; *Monstrueuse de Nikita* ; *Mère de Ménage* ; *Gros Rambour d'hiver*.

3 7
3.264.672
4 57 48

Fruit très gros. Épiderme jaune-paille ou jaune verdâtre parfois veiné ou marbré de gris avec quelques petits points bruns ; brunâtre autour du pédicelle; souvent frappé de rose pruiné à l'insolation. Pédicelle gros, court, dans cuvette large, irrégulière, profonde, à bord ondulé. Œil petit ou assez grand, ouvert, dans cuvette plissée et étroite, à bord ondulé ou légèrement bosselé. Chair blanche, tendre, légèrement acidulée, sans saveur ; médiocre.

Arbre de bonne vigueur, mi-érigé, moyennement fertile. Rameaux assez longs, de moyenne grosseur, brun violacé au soleil, brun-verdâtre à l'ombre. Lenticelles petites, rondes, peu nombreuses. Yeux larges, aplatis. Feuilles ovales, allongées plissées, larges, épaisses, vert foncé, à peine creusées. Dents régulières, peu profondes, arrondies. Pétirole gros court. Fleurs grandes, rosées, hâtives.

Variété d'apparat et d'amateur. A cultiver en petites formes sur Doucin ou Paradis.



Calville Duquesne

7 64
3.264.731
4 355 391
3

Fruits gros ou surmoyens attachés par 2 ou 3 rappelant la forme du Calville blanc, mais moins côtelés

latéralement et plus verdâtres, parfois allongé. Épiderme mince, lisse, jaune citrin, assez abondamment frappé de rouge et parsemé de petits points gris foncé, lavé de gris fauve autour du pédicelle et même un peu au pourtour. Pédicelle fort ou grêle dans cuvette mi-étroite. Œil clos ou mi-clos dans cuvette plissée et à bord côtelé. Sépales généralement longs. Chair blanche ou blanc-jaunâtre avec zone verdâtre, tendre ou mi-tendre, juteuse, légèrement acidulée ; loges allongées ; pépins gros, longs, brun-foncé. Bonne ou assez. bonne.

Arbre très vigoureux et très fertile; assez rustique. Rameaux moyens ou assez forts, arqués, brun foncé ou violacé. Lenticelles nombreuses, blanches, rondes et allongées. Yeux gros, larges, appliqués. Feuilles moyennes ou petites, ovales, assez planes, vert clair, mi-souples. Dents arrondies. Pétiole court, assez fort, rouge à la base. Boutons petits. Ovoïdes.

Variété d'amateur et de marché ; à cultiver en formes naines ou moyennes.


Titowka


3.264.859

4 9 6

Fruit moyen. Épiderme assez lisse, mince, fond jaune clair, plus ou moins marbré de brun, avec quelques rares petits points brun foncé ; lavé ou maculé de gris bronzé autour du pédicelle ; largement teinté de rose avec abondantes petites stries rouge carmin. Pédicelle court et charnu ou assez long et fort dans cuvette profonde, étroite, à bord un peu ondulé. Œil moyen ou petit, clos, aux sépales assez forts, dans cavité moyenne ou peu profonde, étroite et bosselée ou légèrement côtelée au pourtour. Chair tendre, blanche, veinée de verdâtre, et partiellement, saumonée, douce, sans parfum. Assez bonne.

Arbre de bonne vigueur.





Reinette grise d'automne


Syn. : *Reinette Grise d'Angleterre*; *Grosse Reinette grise plate*.

6
3.285.575
54

Fruit surmoyen. Épiderme entièrement bronzé, pointillé de gris clair. Pédicelle fort, dans cuvette large. Œil mi-clos assez grand, dans cuvette moyennement profonde, un peu plissée, parfois légèrement bossuée. Chair blanc-verdâtre sucrée, acidulée, juteuse, tendre; très bonne.

Arbre de vigueur normale, fertile. Rameaux mi-gros, un peu coudés, vert brunâtre. Lenticelles rares, rondes, petites, saillantes. Yeux moyens, ovoïdes, allongés, appliqués. Feuilles ovales-elliptiques, un peu creusées, épaisses, rudes, vert foncé, un peu arquées; dents aiguës peu profondes. Pétiole gros, moyen, ovoïde, mi-cotonneux. Fleurs grandes, légèrement rosées, de moyenne saison.

Variété de marché et d'amateur ; s'accommode de toutes formes, tous porte-greffe.



Rose de Saint-Florian

Syn. : *Passe-rose*; *Rose d'automne* ; *Roseau d'automne*.

3.394.763
165 859

Fruit moyen ou surmoyen, légèrement côtelé. Épiderme mi-mince, lisse, résistant, jaune pâle à l'ombre, doré à la lumière, plus ou moins abondamment rose pâle à l'insolation, sans ou avec stries peu visibles, points très peu visibles. Pédicelle moyen, dans cuvette profonde, mi-étroite, à bord ondulé. Œil petit ou moyen, clos, dans cuvette assez peu profonde, fortement


plissée avec menues côtes, chair blanchâtre mi-ferme, à zone verdâtre au centre, parfois, un peu rosée sous la peau, ferme, peu ou mi-juteuse, peu parfumée. Assez bonne ou bonne.

Arbre de vigueur et de fertilité satisfaisantes. Rameaux nombreux, étalés, longs, grêles, coudés; brun-jaunâtre. Lenticelles petites, arrondies, saillantes, peu abondantes. Yeux moyens arrondis, duveteux. Feuilles minces, petites, ovales, vert clair, planes ; dents régulières, arrondies; pétiole grêle. Boutons petits.

Variété pour amateur.

Calville rayée de Remperheim


3
4.137.865
65 9 1



Fruit surmoyen. Épiderme épais, jaune citrin, presque entièrement recouvert de rouge très sombre avec nombreuses stries. Pédicelle grêle ou assez fort, dans cuvette étroite lavée de gris, souvent gibbeuse. Œil clos, cuvette plus ou moins étroite, fortement côtelée. Chair verdâtre, mi-tendre ou blanche avec zone et veines verdâtres, assez peu juteuse ; bonne.

Arbre vigoureux, assez fertile. Rameaux brun rougeâtre. Lenticelles petites, rondes. Yeux aplatis, triangulaires et cotonneux; longues stipules étroites. Feuilles moyennes, elliptiques, vert foncé, minces, souples. Dents peu profondes aiguës ou obtuses. Boutons moyens, ovoïdes, aigus.

Variété d'amateur.



Adam's Pearmain


Syn. : *Pearmain d'Adam*; *Pépin de Norfolk*; *Rousse de Norfolk*.

5 5
4.145.828
5 317 66
3

Fruit moyen ou sous-moyen conique. Épiderme épais à fond jaune citrin ou doré ou rose, partiellement voilé de rouille, parsemé de gros points gris-jaunâtre, partiellement ou presque entièrement rose vif, et strié de carmin sur toute la surface. Pédicelle grêle ou assez fort renflé à l'extrémité, dans cuvette bronzée, étroite, lisse, parfois avec gibbosité intérieure. Œil clos, dans cuvette superficielle, plissée. Chair jaunâtre, ferme, fine, peu juteuse sucrée, parfumée. Bonne.

Arbre vigoureux, assez fertile. Rameaux nombreux, grêles, longs, coudés, brun violacé. Lenticelles rondes, peu nombreuses, très saillantes. Yeux appliqués, petits, cotonneux. Feuilles moyennes ou assez grandes, ovales, planes, vert foncé ; dents aiguës. Boutons petits, pubescents.

Variété d'amateur; à greffer de préférence sur Doucin ou Paradis; à conduire en formes naines.



Reinette Ananas

2 8
4.147.258
31 46

Fruits moyens ou sous-moyens attachés isolément ou par 2 et 3. Épiderme mince, lisse, parcheminé, jaune doré ou foncé, parsemé de points brun foncé, lavé de brun ou de gris verdâtre vers le pédicelle, voilé ou non de gris, parfois teinté de rose à l'insolation. Pédicelle grêle, dans cuvette étroite, lisse ou ondulée. Œil fermé ou mi-clos à sépales mi-longs dans cuvette ridée légèrement bossuée. Chair jaunâtre

avec zone verdâtre, mi-tendre, peu juteuse, sucrée, parfumée ; bonne.


Arbre de bonne vigueur, érigé et très fertile. Rameaux bruns, mérithalles très courts. Lenticelles peu nombreuses, rondes. Yeux gros. Feuilles ovales aiguës, rigides, gaufrées, mi-creusées, vert foncé. Boutons moyens, ovoïdes, aigus.

Variété d'amateur; s'accommode de toutes formes; à greffer de préférence sur Doucin ou Paradis.

Friandise

Syn.: *Aagt de Hollande; Fyne Kroon.*


8
4.153.651
8 9 4



Fruit moyen ou surmoyen, ovoïde, allongé, avec un côté moins renflé que l'autre. Épiderme mi-rude, jaune citrin, à fond rose, légèrement strié de carmin, maculé de roux autour du pédicelle, souvent marbré de même au pourtour, finement pointillé de gris clair. Pédicelle de moyenne longueur, mi-grêle, oblique, renflé aux extrémités, dans cuvette peu profonde, étroite, irrégulière ou gibbeuse. Œil moyen, mi-clos ou mi-ouvert dans cuvette peu profonde, à bord uni, chair blanche, fine, assez ferme, mi-juteuse, sucrée, un peu acidulée et parfumée. Bonne.

Arbre de vigueur et de fertilité moyennes. Rameaux nombreux, étalés, mi-courts et assez gros, brun rougeâtre ou violacé. Lenticelles petites, arrondies et peu nombreuses. Yeux gros, allongés, mi écartés. Feuilles moyennes, ovales-elliptiques ; dents larges; pétiole court et fort; stipules fortes.

Variété pour amateur ; pour plein vent et formes naine.



Pigeon rouge


Syn. : *Cœur de Pigeon* ; *Gros Pigeon de Jérusalem* ; *Pigeon Commun* ; *Pigeon de Rouen* ; *Pigeon d'hiver* ; *Pigeon rose*.

8
4.155.864
282 93

Fruit moyen. Épiderme fin, lisse, jaune citrin, pointillé de gris roux, presque entièrement rouge, strié de carmin à l'insolation. Pédicelle moyennement gros, dans cuvette étroite, renflé à l'extrémité. Œil mi-clos, dans cuvette étroite, légèrement plissée. Chair blanche cassante, sucrée, acidulée, parfumée. Bonne.

Arbre de moyenne vigueur, assez fertile. Rameaux gris-brun ou violacés. Lenticelles petites, rondes. Yeux allongés gros, légèrement écartés. Feuilles elliptiques, un peu convexes, vert sombre. Dents aiguës. Boutons petits, pubescents.

Variété d'amateur. A greffer Doucin ou Paradis. A tailler court.



Linneous Pippin

Syn. : *Belle Fleur jaune*.

2 2 3
4.165.267
334 7
7

Fruits gros ou assez gros, souvent attachés par 2. Épiderme jaune pâle ou citrin avec quelques points roux; un peu grisâtre ou fauve vers le pédicelle; parfois légèrement marbré de rouille, souvent frappé de rose saumoné. Pédicelle grêle ou assez fort renflé à l'extrémité. Œil clos, petit, dans cuvette étroite, plissée, cernée de côtes inégales. Chair blanc-jaunâtre,


fine, mi-tendre, mi-sucrée, acidulée, un peu parfumée ; loges grandes; pépins forts, noirâtres. Bonne.

Arbre de vigueur moyenne, étalé, fertile. Rameaux grêles, brun-clair ou brun violacé. Lenticelles rondes. Yeux larges, pointus, appliqués. Feuilles moyennes, elliptiques-allongées, vert foncé, planes, épaisses. Dents arrondies ou obtuses. Boutons courts, obtus, terminant fréquemment les brindilles.

Variété d'amateur ; à greffer surtout sur Doucin ou paradis.

Kandil Sinap


42 62
4.185.761
3 54 83



Fruits moyens par 2 et 3. Épiderme lisse mi-épais jaune citrin assez souvent marbré ou partiellement moucheté de rouille, finement pointillé de gris, frappé de rose vif ou de rouge avec quelques menues stries. Pédicelle grêle dans cuvette étroite, à bord régulier, mais un peu oblique. Œil clos à longs sépales dans cuvette étroite, bosselée et plissée. Chair mi-tendre, blanche, ou blanchâtre, juteuse, souvent avec zone verdâtre autour des loges de forme allongée, pépins moyens, allongés, brun clair ; assez bonne ou bonne.

Arbre de bonne vigueur, érigé, très fertile chaque année. Rameaux longs, grêles, brun-violacé foncé. Lenticelles peu nombreuses, rondes. Yeux gros, duveteux, appliqués. Feuilles moyennes ou petites, elliptiques, terminées par une longue pointe aiguë, épaisses, un peu creusées, vert foncé. Dents peu profondes, aiguë. Fleurs grandes, hâtives.

Variété d'amateur et d'apparat ; pour formes moyennes.



Calville rouge d'automne

Syn. : *Sonnette* ; *Grelot Framboise d'automne*.


4.197.891

5 8

Fruit surmoyen, allongé, asymétrique, côtelé ou irrégulièrement arrondi. Épiderme mi-épais, lisse, jaune-brun clair, abondamment teinté de rose vif brillant avec stries étroites; parsemé de quelques rares petits points. Pédicelle très court, gros ou grêle et moyen dans cuvette assez profonde, étroite, lavée de brun-verdâtre, à bord fortement mamelonné. Œil petit ou moyen, mi-clos ou fermé, à longs sépales, dans cuvette peu profonde ou moyennement profonde, plissée et côtelée. Chair blanche, mi-tendre, mi-juteuse, acidulée, souvent rosée sous la peau et plus rarement vers le centre, creuse intérieurement au point de laisser flottants quelques pépins brun foncé. Assez bonne.

Arbre assez vigoureux, mi-étalé et fertile. Rameaux assez nombreux, étalés, gros, allongés, brun rougeâtre. Lenticelles rondes, peu nombreuses. Yeux gros, appliqués. Feuilles moyennes arrondies, planes; dents régulières, peu profondes.

Variété ancienne de Maine-et-Loire ; à délaisser.



Reinette de Zuccamaglio

4.212.267

3 7 51


Fruits sous-moyens, attachés par 3 et 4. Épiderme mince, parcheminé, jaune citrin unicolore, abondamment pointillé de gris ou de gris verdâtre. Pédicelle grêle dans cuvette étroite, à bord régulier. Œil mi-clos, dans cuvette large, plissée. Chair blanchâtre un jaunâtre, tendre, sucrée avec zone jaunâtre ; bonne.

Arbre de vigueur sous-moyenne. Rameaux grêles, brun rougeâtre ou cendrés. Lenticelles rares, petites, rondes, saillantes. Yeux courts arrondis. Feuilles petites, ovales arrondies, creusées, à pointe recourbée, vert clair. Dents arrondies.

Variété d'amateur ; s'accommode du verger.

Jules Labitte

4
4.214.684
2 3
8




Fruit moyen ou surmoyen. Épiderme mi-lisse, mi-épais, jaune clair parsemé de quelques points bruns, légèrement veiné de roux ou taché de plaques fauves, même vers le pédicelle, plus ou moins frappé de rose ou de rouge. Pédicelle très court, dans cuvette lisse. Œil fermé dans cuvette étroite, légèrement maculée de gris roux. Chair blanche, ferme, et croquante sucrée, bonne.

Arbre assez vigoureux, moyennement fertile. Rameaux moyens brun violacé. Lenticelles peu nombreuses, grosses, rondes. Yeux gros, appliqués. Feuilles grandes, ovales, un peu creusées, lisses. Dents moyennement aiguës.

Variété d'amateur ; s'accommode de tous porte-greffes ; à greffer en tête pour hautes tiges.

Reinette grise de Broulée

4.217.58
23 65




Fruits moyens attachés par 2 et 3. Épiderme entièrement gris-bronzé, mirigueux, parsemé d'assez nombreux points blanchâtres ou roux ; vert clair autour du pédicelle. Pédicelle moyen, un peu renflé à l'extrémité dans cuvette moyennement profonde, mi-étroite,

régulière. Œil moyen, clos, dans cuvette peu profonde, plissée. Chair blanchâtre.

Arbre peu vigoureux, fertile. Rameaux grêles, brun-rougeâtre. Lenticelles rondes, peu nombreuses. Yeux petits, appliqués. Feuilles petites, lancéolées ; dents arrondies. Boutons petits.

Variété pour amateur.



Cox's Orange Pippin

Syn. : *Orange de Cox*; *Reinette orange de Cox*.

72 8
4.217.867
3 44 9

Fruits moyens isolés ou par 2 et 3. Épiderme mince, lisse, jaune doré avec quelques points gris ; frappé de rouge plus ou moins vif avec quelques stries ; quelquefois gris aux extrémités. Pédicelle moyen grêle, renflé à l'extrémité, dans cuvette assez étroite. Œil clos, à sépales longs dans cuvette peu profonde ou superficielle, large, un peu plissée. Chair jaunâtre, tendre, fondante, juteuse, parfumée, sucrée ; très bonne.

Arbre de vigueur moyenne ; assez fertile. Rameaux grêles, verdâtres ou violacés. Lenticelles peu nombreuses, rondes ou ovales. Yeux assez gros, obtus. Feuilles elliptiques, vert foncé, luisantes, souples. Dents obtuses, un peu aiguës. Boutons assez forts, allongés, cotonneux. Fleurs moyennes, de moyenne saison.

Variété d'amateur, de commerce et de verger; sensible au chancre.

Court pendu noir


4.217.878

5 4 9

Fruit sous-moyen ou moyen, plat. Épiderme lisse, assez régulièrement garni de points moyens et jaunâtres ; teinté de rouge noirâtre surtout à l'insolation avec quelques stries rouge brun à l'ombre. Pédicelle très court dans cavité étroite, lisse. Œil grand, entr'ouvert dans cavité large, légèrement ridée ou à bord ondulé. Chair très ferme, croquante, jaunâtre, fine ; bonne.

Arbre de moyenne vigueur. Rameaux brun verdâtre ou gris rougeâtre. Yeux petits, appliqués. Lenticelles rondes, fines, peu nombreuses. Feuilles ovales, arrondies, vert foncé, plissées, étalées. Dents aiguës, mi-souples. Pétiole court, rougeâtre. Boutons arrondis, cotonneux.


Variété d'amateur.

**Reinette de Mauss**

4.217.914


85

Fruits moyens ou sous-moyen, réguliers, de bel aspect, attachés très solidement à l'arbre et par trois. Épiderme épais, lisse, à fond jaune clair ou jaune d'or, mais presque entièrement rouge brillant, un peu sombre, très légèrement strié ou non ; abondamment et régulièrement couvert de petits points ronds, jaunâtres ; peu maculé de fauve vers le pédicelle. Pédicelle grêle assez long ou moyen, renflé à l'extrémité, dans cuvette moyennement profonde, irrégulièrement arrondie et resserrée parfois par une gibbosité. Œil grand ou moyen, clos, à forts sépales, dans cuvette peu profonde, large, plissée ou cernée de fines côtes. Chair blanchâtre, mi-tendre, mi-juteuse,



douce ; nombreux pépins. Assez bonne ou bonne.

Arbre de moyenne vigueur, très fertile. Rameaux menus, violacés ou olivâtres ; lenticelles rondes, petites, saillantes. Yeux petits, coniques, pointus. Boutons petits et foncés. Feuilles petites, ovales-aiguës, plus ou moins allongées, planes, souples, dents peu profondes. Pétiole et nervures rouges. Variété pour le marché et l'apparat.



Calville des femmes

44
4.222.141
3 57 763


Fruits gros ou très gros, isolés ou par 2. Épiderme lisse, peu épais, longtemps vert clair puis jaune plus ou moins foncé, finement et irrégulièrement pointillé de roux, maculé de fauve vers le pédicelle et l'œil ; frappé ou non de rouge brique. Pédicelle fort, renflé à l'extrémité dans cuvette étroite, à bord ondulé. Œil mi-clos, grand, aux sépales larges et gris, cotonneux, dans cuvette évasée, plissée. Chair blanche, mi-fine, mi-tendre, ou mi-ferme, avec fibres vertes, juteuse, acidulée, sans parfum. Médiocre, crue ; assez bonne, cuite.

Arbre vigoureux, moyennement fertile. Rameaux moyens, grisâtres. Lenticelles nombreuses, rondes, saillantes. Feuilles assez grandes, étalées, peu épaisses, tourmentées ou plissées, vert foncé, brillantes. Dents aiguës et profondes. Boutons petits. Fleurs grandes, tardives.

Variété d'amateur et d'apparat ; toutes formes, mais de préférence pour moyennes et petites formes.

Bismarck

14 7
4.222.851
57 945
66



Fruits gros, réunis par 2 ou 3. Épiderme mince, lisse, à fond blanchâtre ou jaunâtre, lavé de gris ou de fauve vers le pédicelle, parsemé de quelques rares points grisâtres, abondamment teinté de rouge foncé brillant, avec stries, le tout recouvert d'une fine efflorescence violacée. Pédicelle grêle, dans cuvette étroite, à bord régulier. Œil clos ou mi-clos dans grande cuvette étroite et fortement plissée, sépales allongés et forts, chair blanche ou blanc verdâtre, tendre, juteuse, acidulée, peu sucrée, peu parfumée ; loges assez grandes, pépins moyens ; assez bonne.


Arbre vigoureux, fertile. Rameaux cotonneux brun cendré ; mérithalles courts. Lenticelles peu nombreuses, petites, rondes. Yeux gros. Feuilles moyennes, elliptiques à pointe courte, épaisses, souples, vert mat à bord un peu tourmenté. Dents grandes, arrondies. Pétiole de 25 millimètres. Fleurs grandes ; hâtives.

Variété d'amateur, de commerce et d'apparat.

Reinette Franche

Syn. : *Reinette Blanche*; *Reinette* ; *Blonde* ; *Reinette Franche rose* ; *Reinette Commune* ; *Reinette de Normandie*.

47 4
4.224.653
55 768
7




Fruits moyens, attachés par 2 et 3. Épiderme mince, mi-lisse, jaune citrin clair, pointillé et lavé de brun, souvent voilé de gris, taché de fauve vers le pédicelle, frappé de rose

à l'insolation. Pédicelle fort dans cuvette étroite à bord légèrement ondulé. Œil clos ou mi-ouvert, aux sépales grêles, dans cuvette légèrement plissée ou bosselée. Chair blanchâtre avec une légère zone verdâtre, mi-ferme ou un peu croquante, sucrée, mi-acidulée, juteuse, parfumée; bonne ou très bonne. C'est le vrai type de la Reinette.

Arbre vigoureux, mi érigé, très fertile. Rameaux longs, mi-grêles, brun verdâtre. Lenticelles peu nombreuses, rondes, grandes, mi-saillantes. Yeux gros, courts. Feuilles moyennes, elliptiques à pointe courte, mi-souples, planes ou un peu creuses, quelquefois plissées. Dents obtuses ou mi-aiguës. Boutons assez gros, courts, obtus, duveteux. Fleurs moyennes, tardives.

Variété d'amateur et de marché ; convient pour toutes formes, plus spécialement à la haute tige.

Grosse Mignonnette d'Herbassy



Syn. : *Demoiselle*.

4
4.224.886
5 93
1

Fruits moyens ou surmoyens, attachés par 2 et 3. Épiderme mince, résistant, jaune foncé, ponctué de gris clair, rosé à l'insolation et abondamment strié sur une bonne partie du fruit. Pédicelle court ou très court dans cuvette profonde, évasée, à bord ondulé, teintée de roux verdâtre. Œil moyen, clos, dans cuvette moyennement profonde, plissée et entourée de menues côtes. Chair blanche ou blanc verdâtre, veinée de verdâtre ou de jaune, mi-ferme, peu juteuse, peu sucrée, acidulée, un peu parfumée. Assez bonne ou bonne.


Arbre très vigoureux, érigé, très fertile chaque année. Rameaux moyens, brun violacé. Yeux gros, aplatis. Boutons moyens, obtus, bruns, duveteux. Feuilles grandes, elliptiques, aiguës, planes, mi-épaisses. Dents arrondies, peu profondes.

Variété de commerce, voyageant bien.

Reinette de Cantorbery

Syn. : *Canterbury* ; *Melon*.

5 9
4.225.233
3 37 354



Fruits gros attachés par 1, 2 ou 3. Épiderme mince, lisse, brillant, jaune foncé ou jaune verdâtre, légèrement et finement pointillé de gris, marbré de fauve vers le pédicelle. Pédicelle grêle ou mi-grêle, renflé à ses extrémités, dans cuvette étroite. Œil mi-clos ou clos dans cuvette large, cernée de côtes. Chair blanche, sans saveur ni parfum spéciaux, juteuse, mi-tendre; assez bonne.


Arbre de vigueur suffisante, très fertile. Rameaux gros, étalés, brun violacé. Lenticelles peu nombreuses, petites, rondes. Yeux gros, coniques, assez fortement duveteux, appliqués. Feuilles moyennes, ovales, épaisses.

Variété d'amateur ; à cultiver de préférence en formes moyennes.

Reinette dorée

Syn. : *Reinette Jaune tardive* ; *Princesse Noble* ; *English pippin* ; *Golden Reinette*.

2 6
4.225.581
5 54 93
7 4




Fruits moyens. Épiderme mince, rugueux, jaune doré, largement voilé ou même recouvert de gris bronzé, parfois plus chaud ou rosé à l'insolation. Pédicelle fort, parfois charnu, dans cuvette à peine ondulée. Œil mi-clos, dans cuvette plissée. Chair blanchâtre sucrée, acidulée, juteuse, mi-tendre ; très bonne.

Arbre moyennement vigoureux, érigé, fertile. Rameaux moyens, brun verdâtre. Lenticelles assez nombreuses, ovoïdes ;

mérithalles généralement courts. Yeux assez gros à pointe appliquée. Feuilles moyennes, ovales-arrondies, vert foncé, épaisses, à bord relevé et parfois ondulé. Dents obtuses ou aiguës, moyennement profondes. Fleurs grandes, rose pâle, de moyenne saison. Boutons petits.

Variété de commerce et d'industrie.



4

Pépin gris de Parker

Syn. : *De Parker* ; *Parker's pippin*.

1
7 6
4.225.628
5 5 536

Fruits sous-moyens attachés par 2. Épiderme mi-mince, persistant, à fond jaune clair, presque entièrement bronzé, recouvert de quelques points gris et un peu frappé de rose cuivré. Pédicelle grêle dans cuvette large à bord uni ou ondulé. Œil clos aux sépales longs dans cuvette large, peu plissée. Chair blanchâtre, verdâtre au centre, ferme, juteuse, sucrée ; bonne.


Arbre de moyenne vigueur, très fertile. Rameaux moyens, longs, brun vineux. Lenticelles abondantes, grosses, peu saillantes. Yeux gros. Feuilles moyennes, elliptiques-lancéolées, vert foncé, peu rigides. Dents obtuses ou arrondies. Boutons assez gros, fusiformes, fréquents sur les extrémités des brindilles.

Variété d'amateur ; convient à toutes formes et tous porte-greffes.

Belle Fille

Syn. : *Belle Fille rose* ; *Belle Femme* ; *Bonne Fille* ; *Vincent*.

4 4
4.225.884
5 5 93




Fruit moyen, aplati à la base et parfois aux deux pôles. Épiderme mince, lisse, visqueux, jaune blanchâtre taché de brun vers les extrémités, largement pointillé de gris, rouge vif avec stries à l'insolation. Pédicelle arqué, court ou moyen, assez fort dans cuvette profonde, à bord lisse. Œil mi-clos ou clos, dans cuvette à bord mamelonné et plissée. Chair blanche avec zone verdâtre, ferme, juteuse, sucrée, acidulée ; bonne.

Arbre de vigueur modérée, étalé, fertile. Rameaux moyens, brun violacé Lenticelles abondantes, petites, rondes. Yeux gros, duveteux, appliqués. Feuilles moyennes, ovales, souples, vert pâle, étalées, à peine plissées. Dents fines, aiguës. Fleurs moyennes, rosées, très tardives.

Variété de marché et d'amateur; pour verger.

Cramoisie de Gascogne


2 54
4.225.885
54 921



Fruit surmoyen. Épiderme mince, jaune clair, lavé de gris autour du pédicelle et parfois au pourtour, pointillé de gris verdâtre, frappé et strié de rouge vif pruiné. Pédicelle moyen, dans cuvette large et unie. Œil grand, mi-ouvert, dans cuvette large, souvent bossuée au centre. Chair blanche ou blanc verdâtre avec ou sans zone verdâtre, tendre, juteuse, acidulée, assez bonne.

Arbre moyennement vigoureux, fertile. Rameaux moyens, gris. Lenticelles peu nombreuses, rondes. Yeux appliqués.

Feuilles petites, moyennes, ovales-arrondies, vert foncé, plissées ou non. Dents profondes, aiguës.
Variété pour marché et amateur; toutes formes.



La Clermontoise


Syn. : *Reinette Clermontoise*.

7
4.226.684
5 54 59
8

Fruit moyen. Épiderme mi-épais, parcheminé, jaune clair presque entièrement voilé ou recouvert de gris fauve, parsemé de quelques rares points gris, légèrement rougeâtre à l'insolation, rarement strié. Pédicelle très court, dans cuvette large et régulière. Œil ouvert ou mi-clos, dans cuvette étroite, plissée, à bord ondulé. Chair blanche, fine, très ferme, ou croquante, sucrée, relevée ; pépins petits. Bonne.

Arbre faible sur Paradis, moyennement fertile. Rameaux brun grisâtre. Yeux larges. Feuilles moyennes, ovales, rudes, gaufrées, creusées, et à pointe redressée, dents obtuses. Stipules fortes ; pétiole gros. Lenticelles blanches, rondes, mi-saillantes.

Variété à deux fins et à cuire; pour verger.



Cusset

Syn. : *Reinette Cusset*.

4.227.791
55 37

Fruit surmoyen. Épiderme lisse, jaune citrin, légèrement pointillé de gris, veiné ou taché de fauve vers les extrémités, abondamment frappé et strié ou non de rouge vif. Pédicelle assez fort dans cuvette étroite, à bord ondulé. Œil clos, dans cuvette plissée, bossuée. Chair blanche, ou blanchâtre,


mi-tendre, juteuse peu sucrée, acidulée, peu parfumée; bonne ou assez bonne.

Arbre assez vigoureux. Rameaux moyens, bruns ou rougeâtres. Lenticelles allongées, petites. Yeux appliqués. Feuilles moyennes, elliptiques, un peu arquées à l'extrémité, moyennement épaisses. Dents régulières. Boutons gros. Fleurs tardives.

Variété à deux fins, de marché. Assez résistante au chancre et au puceron lanigère.

Minister Von Hammerstein


43 8
4.234.751
65 847
2



Fruit moyen, aplati, légèrement côtelé, bien attaché. Épiderme mince, lisse, luisant, jaune verdâtre, puis jaune clair, abondamment frappé de rouge terne avec quelques fines stries, parsemé de points blanchâtres ou bruns. Pédicelle court ou moyen, duveteux, dans cuvette large rarement teintée de rouille ou de brun verdâtre. Œil clos ou mi-clos, assez grand ou petit, aux sépales longs, duveteux, dans cuvette large et moyennement profonde, plissée avec ou sans côtes de petite dimension. Chair tendre blanc ou blanche jaunâtre, veinée de vert, acidulée, juteuse, relevée, peu parfumée. Pépins moyens, pointus, brun clair dans larges loges. Le fruit se conserve bien, sans rides. Assez bonne.

Arbre vigoureux, mi érigé, très fertile, rustique ; produit, rapidement et régulièrement. Rameaux grêles, brun clair. Yeux appliqués. Lenticelles rondes, saillantes. Bouton gros, allongé. Feuilles assez grandes, planes, un peu gaufrées, mi-rigides; dents arrondies. Floraison mi-hâtive.

Variété très appréciée en Suisse en culture commerciale et familiale; préfère sols fertiles et ensoleillé.


**Jeanne Hardy**

51 3
4.234.847
65 352
2

Fruits gros ou très gros, ordinairement attachés par deux, fortement côtelés au sommet. Épiderme jaune pâle un peu verdâtre, fortement coloré de rouge, pruiné de violet, faiblement strié, parsemé de quelques petits points ronds et bruns. Pédicelle assez grêle dans cuvette large, ondulée, tachée de gris clair. Œil assez grand, mi-ouvert, dans cuvette à bord fortement côtelé, sépales longs et forts, chair blanc-jaunâtre ou blanc-verdâtre, mi-fine, mi-ferme, aqueuse, sans parfum, quelquefois liégeuse ; assez bonne ou médiocre.

Arbre vigoureux, moyennement fertile. Rameaux moyens, allongés, brun-rougeâtre, lenticelles assez nombreuses, rondes ou allongées. Feuilles moyennes, ovales, arrondies, plissées, épaisses. Dents grandes, arrondies, un peu creusées. Boutons gros, rosés, pointus.

Variété d'apparat et d'amateur ; pour formes naines et espalier.

**Faros**

Syn. : *Faro* ; *Faraud*.

86
4.241.971
5 52 88

Fruit surmoyen, conique, aplati, épiderme lisse, jaune clair, peu et finement pointillé de gris clair, lavé de gris rouillé et squemmeux vers le pédicelle ; presque entièrement teinté de rouge-sang luisant. Pédicelle assez gros, court, dans cuvette à

bord légèrement ondulé. Œil tantôt ouvert, tantôt mi-clos, dans cuvette entourée de petites côtes; chair blanche, fine, mi-tendre, juteuse, sucrée, parfumée ; bonne.


Arbre vigoureux, fertile. Rameaux gros, brun verdâtre. Lenticelles assez nombreuses rondes, saillantes ; yeux petits. Feuilles assez grandes, elliptiques, plissées, vert gai. Dents aiguës ou obtuses. Boutons allongés.

Variété d'amateur ; de verger.

Reinette dorée de Versailles

Syn. : *Reinette Grise de Champagne* ; *Reinette Versailles*.


2
4.242.671
3 374 7
5



Fruit moyen. Épiderme rugueux, jaune citrin, souvent presque entièrement voilé ou marbré de fauve bronzé, parsemé de points roux avec quelques légères verrucosités, parfois très légèrement rosé et à peine strié de rouge à l'insolation. Pédicelle gros, renflé à l'extrémité dans cuvette étroite. Œil entr'ouvert ou clos dans cuvette étroite plus ou moins plissée. Chair blanche ou blanchâtre, mi-tendre, avec, zone verdâtre, assez juteuse, sucrée, acidulée ; bonne.

Arbre vigoureux, très fertile. Rameaux gros, brun rougeâtre. Lenticelles petites, rondes, nombreuses. Yeux petits. Feuilles moyennes, elliptiques, vert franc, mi-minces, coriaces. Dents fines, obtuses, peu profondes, boutons petits.

Variété d'amateur ; pour plein vent, mais s'accommode de toutes formes.



Ribston Pippin


Syn. : *Ribstone* ; *Formosa Pippin* ; *Glory of York*.

6 8
4.242.788
317 65

Fruit assez gros ou moyen. Épiderme rude à fond jaune foncé, marbré de fauve, pointillé de rouge, frappé de rose avec ou sans quelques stries. Pédicelle grêle, dans cuvette étroite lavée de roux. Œil mi-clos, dans cuvette large plus ou moins cernée de côtes. Chair jaunâtre sucrée, acidulée ; juteuse ; bonne.

Arbre de vigueur moyenne, étalé, très fertile. Rameaux moyens, brun violacé. Lenticelles nombreuses, grosses, rondes un peu saillantes. Yeux gros, coniques, appliqués. Feuilles assez grandes, peu rigides, ovales, un peu creusées en gouttière. Dents profondes, arrondies ou aiguës, fleurs grandes, de moyenne saison

Variété d'amateur, de commerce ; les fruits tombent assez facilement. S'accommode de toutes formes.



Reinette d'Angleterre

Syn. : *Cadeau du Général* ; *Reinette du Vigan* ; *Pomme d'or d'Angleterre*.


7
4.243.557
17 641

Fruits moyens ou sous-moyens, attachés par 2. Épiderme mi-rugueux, jaune doré, voilé de fauve et un peu cuivré à l'insolation, parsemé de points bruns anguleux. Pédicelle moyen, fort, arqué, dans cuvette étroite, rugueuse, bronzée. Œil assez grand, mi-clos ou clos dans cuvette peu profonde, large et plissée. Chair blanc jaunâtre, mi-tendre, mi-juteuse, sucrée et parfumée. Bonne ou très bonne.

Arbre assez vigoureux, moyennement fertile. Rameaux moyens, longs, brun-rougeâtre. Lenticelles fines, rondes. Yeux petits, obtus. Feuilles moyennes, ovales-arrondies, plissées. Dents moyennes ou grandes, obtuses. Boutons moyens, cotonneux. Variété d'amateur et de marché.

Bovarde

1
4.243.872
82



Fruits moyens ou surmoyens. Épiderme rude, mi-lisse, vert foncé, puis jaune, parsemé de points gris blanchâtre très apparents, teinté et fortement strié de rouge brun ou violacé bien spécial ; un peu nuancé de gris verdâtre dans la cuvette du pédicelle. Pédicelle court ou moyen, fort ou charnu, dans cuvette étroite et peu profonde. Œil grand, ouvert, dans cuvette peu ou moyennement profonde et large, un peu plissée; chair blanche, peu juteuse, mi-tendre, un peu cassante, sucrée veinée de vert au centre, devient rapidement farineuse une fois mûre. Bonne, crue ou cuite.

Arbre pyramidal, à végétation tardive, à floraison parfois défectueuse, la maturité s'effectue en 2 ou 3 semaines seulement. Le fruit résiste à la tavelure mieux que le feuillage.


Variété cultivée dans le Valais.

Kansas Queen

4.244.753
3 5 942



Fruits moyens, coniques-tronqués, attachés par 2 et 3. Épiderme mince et résistant, lisse, jaune-paille à l'ombre, avec quelques menus points gris ; presque entièrement rouge pourpre foncé laissant voir quelques menues stries ; à peine maculé de gris vers la cuvette du pédicelle. Pédicelle moyen, grêle, dans cuvette étroite, assez profonde. Œil mi-clos, aux sépales développés, dans cuvette moyennement profonde ridée et un peu bossuée. Chair blanche, mi-tendre, mi-juteuse, sans acidité ni parfum. Assez bonne. Arbre de moyenne vigueur, très fertile. Rameaux brun-olivâtre. Yeux aplatis, Feuilles moyennes.




Calville d'Oullins

5
61
4.244.883
5 51 98
2

Fruits moyens, attachés par 2 et 3. Épiderme mi-mince, parcheminé, lisse, à fond jaune clair, teinté de rose et de pourpre, abondamment strié de rouge, parsemé de points gris. Pédicelle grêle dans cuvette étroite maculée de gris verdâtre. Œil grand, clos ou mi-clos dans cuvette plus ou moins étroite, parfois plissée ou légèrement côtelée. Chair blanche ou blanchâtre cernée de verdâtre autour des loges, parfois rosée sous la peau, assez ferme, mi-juteuse, sucrée, acidulée ; pépins moyens, bruns ; assez bonne.

Arbre vigoureux, moyennement fertile. Rameaux assez forts, brun foncé. Lenticelles rondes ou allongées, peu nombreuses, grosses, saillantes. Yeux larges, appliqués. Feuilles grandes, ovales, épaisses, vert foncé, étalées, un peu plissées ou à bord légèrement ondulé. Dents arrondies. Boutons gros. Fleurs grandes ou moyennes ; de moyenne saison.

Variété d'amateur et de marché ; convient pour toutes formes.



Reine des Reinettes

Syn. : *Kronen Reinette* ; *Queen of the Pippins* ; *Pearmain doré d'hiver*.

27 1
4.245.848

3 54 53

Fruits moyens attachés par 2 ou 3. Épiderme mi-lisse, mi-épais, luisant, à fond jaune vif ou oranger, nuancé de fauve; frappé de rose ou de rouge clair et finement strié de rouge plus foncé, lavé de roux autour du pédicelle. Pédicelle tantôt

grêle, tantôt gros, renflé à l'extrémité, dans cuvelle large à bord régulier. Œil assez grand, ouvert ou mi-clos, dans cuvette mamelonnée ou non et ridée. Chair blanchâtre ou jaunâtre, ferme, mi-cassante, juteuse, sucrée, agréablement parfumée ; bonne.


Arbre assez vigoureux, érigé, régulièrement et très fertile. Rameaux cotonneux, peu nombreux, forts, allongés, gris verdâtre ou cendré. Lenticelles peu nombreuses, grosses, rondes et allongées. Yeux mi-gros, obtus, appliqués. Feuilles moyennes, ovales à pointe courte, planes, épaisses, vert foncé. Dents profondes, obtuses ou arrondies. Pétiole court. Boutons petits, ovoïdes. Fleurs moyennes, mi-tardives.

Variété d'amateur, de marché, de verger; tige et demi-tige; réussit en bonne terre saine, même en montagne ; les fruits tombent partiellement, même sur Paradis ; un peu sensible au chancre.

Ben Davis

Syn. : *Pépin de New-York*; *Victorix Pippin*.


7 28
4.245.852
3 4 63
7



Fruit, moyen. Épiderme mince, parcheminé, jaune clair abondamment frappé de rouge vif, lavé, strié et ponctué de rouge carmin, partiellement marbré ou voilé de gris avec quelques points gris clair. Pédicelle grêle dans cuvette étroite, grise. Œil moyen, mi-clos, dans cuvette étroite, plissée. Chair blanc-jaunâtre, peu juteuse, peu sucrée, tendre, sans saveur ni parfum spéciaux; assez bonne.

Arbre assez vigoureux, fertile. Rameaux brun foncé. Lenticelles peu nombreuses, rondes. Yeux gros, assez fortement duveteux, appliqués. Feuilles elliptiques, allongées, planes. Dents peu marquées, arrondies.

Variété de commerce, américaine ; supporte bien l'emballage et le transport.

**Hoover**Syn. : *Wattaugah*.

2


4.245.853

3 5 966

Fruit moyen ou surmoyen. Épiderme lisse, mince, résistant, à fond jaune pâle, légèrement pointillé de gris clair ou de jaunâtre, maculé de gris-bronzé autour du pédicelle, abondamment strié et frappé de rouge très foncé brillant ; souvent entièrement rouge. Pédicelle mi-grêle, court ou moyen, dans cuvette évasée, régulière ou à bord ondulé. Œil petit ou moyen, mi-clos, dans cuvette étroite, plissée. Chair blanche à zone verdâtre, mi-ferme, légèrement acidulée, rosée au pourtour à maturité, parfumée. Loges moyennes ; pépins petits, larges et brun très foncé. Assez bonne on bonne.

Arbre très vigoureux, moyennement fertile. Rameaux assez nombreux, étalés, gros, un peu coudés, brun olivâtre, duveteux et lavés de violacé. Lenticelles abondamment arrondies ou légèrement allongées. Yeux moyens, coniques, cotonneux, très appliqués. Feuilles grandes, ovales, allongées à longue pointe, planes ou ondulées. Dents profondes ; pétiole gros.

Variété à cultiver en plein vent ou en cordon, plutôt que sur Doucin.

**Suisse Van Mons**Syn. : *Suisse* ; *Suisse panachée* ; *Rayée de vert et jaune* ; *De Rose panachée*.

4.247.863

Fruit sous-moyen. Épiderme fin, jaune clair, panaché de blanc et de vert, taché de brun vers le pédicelle, abondamment


pointillé de roux, généralement fouetté de rose. Pédicelle mi-grêle, renflé à l'extrémité dans cuvette large. Œil clos, dans cuvette plissée ; chair blanche, mi-tendre, juteuse, sucrée, acidulée, parfumée, bonne.

Arbre vigoureux, étalé, fertile. Rameaux longs, gros, arqués, brun-rouge-violacé, panachés de jaune-orange. Lenticelles nombreuses, grandes, allongées. Yeux gros, ovoïdes, appliqués, très duveteux. Feuilles moyennes, planes. Dents profondes.

Variété d'amateur.

Reinette de Bleinheim


64
4.247.873
3 75 1



Fruit surmoyen. Épiderme mi-épais, lisse, jaune citrin, légèrement pointillé de gris, maculé de brun clair vers le pédicelle, frappé de rose ou de rouge et strié de rouge. Pédicelle court dans cuvette profonde et étroite. Œil entr'ouvert ou clos dans une cuvette plissée à bord ondulé ou bossué. Chair blanche, ferme, peu sucrée, très, juteuse ; bonne.

Arbre vigoureux, assez fertile. Rameaux assez forts, gris violacé. Lenticelles peu nombreuses, rondes. Yeux petits. Feuilles grandes, ovales, planes, plissées, rigides, luisantes, vert très foncé. Dents aiguës. Boutons gros, ovoïdes, aigus, marron.

Variété d'amateur.



Reinette étoilée

Syn. : *Reinette rouge étoilée*; *Calville étoilée*.


4.247.949

5 1 8

Fruit régulier, moyen. Épiderme lisse, assez épais, résistant, entièrement rouge carminé, vif, à peine strié, entièrement parsemé de gros points gris étoilés ou anguleux et saillants ; brun-verdâtre au fond de la cuvette pédicellaire. Pédicelle moyen mi-fort, dans cuvette moyennement profonde à bord uni. Œil assez grand mi-ouvert, dans cuvette peu profonde, large, à peine plissée et à bord uni. Chair blanche, mais abondamment rosée, mi-juteuse, mi-tendre, mi-douce, acidulée, ferme. Bonne.

Arbre de vigueur moyenne, mi-érigé, moyennement fertile. Rameaux grêles, brun rougeâtre violacé foncé ; lenticelles rondes, petites, peu nombreuses. Yeux larges, arrondis, très appliqués. Feuille assez grandes, elliptiques, épaisses, gaufrées ; un peu creusées en gouttière ; dents nombreuses, aiguës ; pétiole moyen, rouge violacé de même que la nervure centrale. Boutons petits, ovoïdes, très cotonneux.

Variété belge, de commerce ; d'apparat en France.



Reinette des Carmes

Syn. : *Carmeliter's Pippin*; *Reinette rousse*; *Carmeliter Reinette*; *Reinette truitée*.

14 81

4.247.997

7 648

7

Fruit moyen. Épiderme demi-lisse, mince, à fond jaune

clair un peu marbré de roux, presque entièrement rouge foncé ou vineux, parfois très légèrement pruiné, lavé de gris autour du pédicelle, garni de gros points gris clair, peu serrés.


Pédicelle court, rarement long, plutôt grêle, dans cuvette étroite à bord régulier. Œil grand, ouvert, dans cuvette large, à peine mamelonnée, à bord régulier. Chair blanc jaunâtre ou rosée, demi-tendre, sucrée, peu juteuse ; bonne.

Arbre de vigueur assez faible, érigé, moyennement fertile. Rameaux longs, grêles, coudés, brun rougeâtre. Lenticelles peu nombreuses, allongées ou arrondies. Yeux, petits, appliqué. Feuilles petites, ovales, planes. Dents assez profondes.

Variété d'amateur et d'apparat. A cultiver plutôt en petites formes ; à greffier en tête pour faire de hautes tiges dont la charpente ne se forme que lentement.

Reine de France


4
4.251.868
5 677
8



Fruits moyens, légèrement cylindriques ou coniques, côtelés au sommet, isolés ou par 2. Épiderme mince, lisse, jaune citrin plus ou moins moucheté de brun, parsemé de petits points bruns ; lavé de fauve autour du pédicelle ; frappé ou non de rouge, avec ou sans quelques stries. Pédicelle moyen et mi-grêle, dans cuvette assez profonde, évasée, régulière. Œil petit, clos ou mi-clos, aux sépales allongés, dans cuvette plus ou moins profonde, étroite et côtelée. Chair jaunâtre, croquante, un peu sucrée, légèrement parfumée, un peu acidulée, loges et pépins sous-moyens ; assez bonne.

Arbre de moyenne ou de bonne vigueur, fertile. Rameaux mi-grêles, brun-olivâtre. Lenticelles rondes, saillantes. Feuilles moyennes, mi-souples, mi-épaisses, ovales-lancéolées ou ovales-elliptiques, un peu plissées ; dents aiguës. Bouton petit ou moyen, conique.

Variété pour verger et de commerce.



Reinette de Metz


4.252.683
754

Fruit moyen. Épiderme mince, parcheminé, lisse, jaune clair, irrégulièrement parsemé de points bruns, fortement lavé de brun verdâtre autour du pédicelle, fouetté de rose à l'insolation ; parfois même plus ou moins maculé de roux vers l'œil et au pourtour.

Pédicelle gros et court, dans cuvette large et moyennement profonde à bord peu ondulé. Œil petit, mi-clos, aux sépales grêles et mi-longs, dans cuvette moyennement profonde, plissée et bossuée. Chair blanche, ferme, un peu cassante, à zone verdâtre ou jaunâtre autour des loges, mi-juteuse, douce. Bonne.

Arbre de vigueur moyenne, assez fertile. Rameaux grêles, coudés, brun-olivâtre ou rougeâtre. Lenticelles peu nombreuses, rondes, saillantes, yeux petits. Boutons petits, coniques. Feuilles moyennes, ovales-elliptiques, mi-épaisses, un peu coriaces, généralement planes, un peu plissées ; dents peu profondes, mi-aiguës.

Variété de commerce ; s'accommode de la forme à haute tige.



Reinette de Bretagne

Syn. : *Reinette vermeille de Bretagne*.

3
4.252.697
3 867 8

Fruits surmoyens attachés isolément ou par 2. Épiderme mi-lisse ; jaune-citrin plus ou moins lavé de fauve y compris les extrémités, avec quelques gros points gris, frappé de rose brique. Pédicelle court dans cuvette étroite, à bord ondulé. Œil


fermé dans cuvette bossuée, chair blanchâtre tendre ou demi ferme ; bonne.

Arbre de vigueur moyenne, assez fertile. Rameaux moyens brun verdâtre. Lenticelles peu nombreuses, rondes, saillantes, Yeux ovoïdes, allongés. Feuilles assez grandes, ovales-aiguës, mi-épaisses, gaufrées, plissées, légèrement en gouttière. Dents profondes, obtuses. Pétiole grêle, vert. Bouton assez gros, mi-allongé surtout à l'extrémité des brindilles.

Variété d'amateur et de marché.

Reinette Desplanches

8
4.252.691
5 67



Fruits gros, attachés par 2 ou 3. Épiderme jaune pâle marbré de fauve, lavé de rouge à l'insolation. Pédicelle assez fort, dans cuvette à bord lisse. Œil fermé dans cuvette étroite et bossuée. Chair blanche, tendre, juteuse, sucrée, acidulée ; bonne.


Arbre de moyenne vigueur, érigé, assez fertile. Rameaux forts, brun-rougeâtre. Yeux appliqués. Lenticelles rondes, jaunâtres. Feuilles assez grandes, ovales-arrondies, planes, épaisses, coriaces. Dents profondes, aiguës. Boutons gros, larges.

Variété d'amateur ; convient pour toutes formes.

Bonne Hotture

Syn. : *Bonne Auture*.

4.252.693
3 84 587




Fruit moyen plus ou moins asymétrique. Épiderme mi-lisse, épais, à fond jaune foncé ou légèrement verdâtre; frappé de rose au soleil assez abondamment couvert de points roux d'autant plus

anguleux ou étoilés que plus gros ; un peu veiné ou légèrement voilé de gris au pourtour, mais fortement lavé de gris brun autour du pédicelle. Pédicelle court ou très court dans cuvette moyennement profonde, rétrécie. Œil petit mi-ouvert ou étoilé dans cuvette étroite, moyennement profonde, sans plis, mais mamelonnée au pourtour. Chair blanchâtre veinée de verdâtre, mi-ferme, mi-juteuse, sucrée, peu acidulée, parfumée. Bonne.

Arbre de bonne; vigueur et fertile. Rameaux assez peu nombreux, érigés, forts, brun-olivâtre. Lenticelles plus ou moins arrondies, nombreuses et saillantes. Yeux petits, feuilles assez grandes, ovales-arrondies avec pointe, épaisses, rigides au toucher, vert brillant ; dents irrégulières ; pétiole long, fort ; stipules étroites.

Variété de commerce ; pour le plein vent. Répandue dans le Maine-et-Loire.



Haloren

63
4.252.798
5 87 67
9

Fruits gros ou très gros, composés de deux moitiés inégales, à contour fortement irrégulier ; attachés par 2. Épiderme mince, lisse, jaune-verdâtre, plus ou moins parsemé de points gris clair ; frappé abondamment de rouge sombre, ou de rose brun, maculé de brun-verdâtre autour du pédicelle. Pédicelle court, gros, renflé à l'extrémité, dans cuvette moyennement profonde souvent étroite et à bord ondulé. Œil petit, fermé, dans cuvette moyennement profonde, étroite et entourée de plis et de petites côtes. Chair jaunâtre veinée de jaune avec cerne verdâtre autour des loges ; mi-ferme, un peu cassante, mi-juteuse, peu acidulée, peu sucrée, sans parfum spécial ; loges creuses, assez grandes ; pépins courts renflés. Médiocre.


Arbre vigoureux, bien fertile. Rameaux brun-rougeâtre.

forts, allongés ; lenticelles peu nombreuses, rondes, saillantes. Yeux petits, feuilles moyennes, ovales, épaisses, gaufrées, ondulées, légèrement creusées et arquées, terminées par une pointe aiguë. Dents profondes, aiguës ; bouton petit.

Bonne variété pour amateur.

Newton Wonder


6 74
4.252.877
5 47 95
3



Fruits gros attachés par 1 ou 2. Épiderme lisse, légèrement visqueux, mince, jaune foncé avec quelques points gris, ou blanchâtres, fortement lavé de rose vif ou de rouge saumoné avec stries peu distinctes, assez abondamment parsemé de points roux. Pédicelle charnu ou fort et renflé à l'extrémité, dans cuvette large, à bord régulier ou gibbeux. Œil ouvert ou mi-clos, à longs sépales dans cuvette peu profonde, souvent plissée et ondulée. Chair jaunâtre, mi-tendre, légèrement cassante, avec zone verdâtre, mi-acidulée, mi-sucrée ; bonne ou assez bonne.

Arbre très vigoureux, moyennement fertile. Rameaux assez gros, longs, gris-brun. Lenticelles abondantes, grosses, rondes, saillantes. Yeux larges. Feuilles moyennes, ovales-arrondies, épaisses, gaufrées, à bord ondulé, vert franc ou vert foncé. Dents profondes, aiguës. Fleurs grandes, de moyenne saison.

Variété d'amateur.



Reinette de Demptézieu


Syn. : *Reinette Baboud* ; *Reinette Menoux*.

3 2 4 7
4.254.241
3 25 372
6 7

Fruits gros, par 2 et 3 au début, mais finalement presque toujours seuls. Épiderme mince lisse, jaune citrin clair ou foncé, voilé ou lavé partiellement de gris fauve vers le pédicelle, assez abondamment pointillé de gris, parfois un peu frappé de rose. Pédicelle fort, dans cuvette évasée, à bord un peu ondulé. Œil mi-ouvert ou fermé dans cuvette étroite, à bord accidenté ; sépales forts. Chair blanchâtre ou jaunâtre, tendre ou mi-tendre, mi-sucrée, acidulée, assez juteuse ; loges grandes et allongées ; pépins moyens allongés. Bonne.

Arbre très vigoureux, de fertilité capricieuse. Rameaux longs, gros, vert brunâtre, un peu rougeâtre; mérithalles longs. Lenticelles peu abondantes, rondes ou ovales, petites. Yeux moyens, appliqués. Feuilles grandes, elliptiques, vert foncé, rigides, à pointe courte, plissées ou non, à peine creusées ou légèrement arquées. Dents profondes, irrégulières, aiguës ou obtuses. Pétiole gros, court. Boutons moyens, ovoïdes.

Variété d'amateur, à cultiver en formes basses.



Reinette Suisse

Syn. : *De Suisse* ; *Verte de Stettin* ; *Verte de Rostock*.

4.254.364
5 6 6


Fruit moyen, conique, arrondi ou globuleux, irrégulier. Épiderme jaune-verdâtre unicolore, à peine cuivré à l'insolation, parsemé d'assez nombreux points bruns, strié de

fauve vers l'œil et maculé de même vers le pédicelle. Pédicelle mi-grêle, de moyenne longueur, arqué, renflé à l'extrémité, dans cuvette large, assez profonde, à bord ondulé. Œil petit ou moyen, mi-clos, à longs sépales, dans cuvette étroite peu ou moyennement profonde, cernée de petites côtes. Chair blanchâtre ou verdâtre, mi-ferme, un peu croquante, juteuse, acidulée avec arrière goût herbacé. Assez bonne.

Arbre suffisamment ou très vigoureux, fertile. Rameaux étalés, forts, longs, olivâtres, lavés de brun foncé ou violacé. Lenticelles grandes, arrondies, peu abondantes. Yeux ovoïdes, appliqués. Feuilles assez grandes, ovales-allongées, vert-foncé, rigides, un peu gaufrées et parfois un peu creusées. Dents profondes. Pétiole généralement grêle. Bouton petit, globuleux.

Variété, ancienne, à délaissier.

Reinette Vignat




6 7
4.254.571
5 85 683
9

Fruits assez gros ou surmoyens, attachés par 2 et 3. Épiderme mince, mi-lisse, jaune foncé, presque entièrement lavé de rouille, parsemé de gros points blanchâtres ; lavé de gris vers le pédicelle, et parfois un peu frappé de rouge à l'insolation. Pédicelle court ou moyen, assez fort, pubescent, dans cuvette large, à bord parfois ondulé. Œil clos ou mi-ouvert, sépales longs, dans cuvette large, un peu plissée ou ondulée. Chair blanchâtre ou jaunâtre, mi-tendre, juteuse, parfumée, sucrée ; bonne.

Arbre vigoureux, très fertile. Rameaux grêles ou moyens, brun foncé. Lenticelles rares, rondes, fines et mi-saillantes. Yeux gros, appliqués. Feuilles moyennes, ovales-elliptiques, épaisses, vert foncé, gaufrées ou un peu plissées. Dents arrondies ou mi-aiguës, pétiole gros et rougeâtre.

Variété de commerce ; s'accommodant de tous porte-greffes et toutes formes ; à tailler court.



Reinette du Canada grise


Syn. : *Canada gris*.

91
4.254.577
5 65 68
8

Fruits gros ordinairement isolés. Épiderme mi-épais, rude, à fond jaune foncé presque entièrement et inégalement gris-roux, parsemé de gros points gris clair ; rarement rosé à l'insolation. Pédicelle gros, dans cuvette large, à bord ondulé. Œil mi-ouvert, sépales longs, dans cuvette large, souvent irrégulière, plus ou moins bossuée avec, au centre, de fines rides concentriques. Chair jaunâtre, veinée de jaune, fine, tendre, sucrée, parfumée ; loges moyennes, pépins moyens, bruns ; très bonne.

Arbre vigoureux, mi-étalé, moyennement fertile. Rameaux gros et longs, brun-rougeâtre et brun foncé. Lenticelles peu nombreuses, grosses, rondes. Feuilles ovales, vert foncé, assez grandes, planes. Dents grandes, obtuses. Fleurs moyennes, rosées, mi-hâtives.

Variété de commerce et d'amateur ; sensible au chancre ; à greffer de préférence sur Doucine et Paradis.



Ohio's Russet

Syn. : *Russet de l'Ohio*.

2 4
4.254.587
3 7

Fruits surmoyens, genre Canada gris. Épiderme très mince, entièrement bronzé, plus ou moins écailleux, parsemé de quelques points gris clair et de plaques brunes ; le tout sur

fond jaune doré. Cuvette du pédicelle largement gris foncé, écailleux.


Pédicelle moyen et grêle ou gros et court dans cuvette large. Œil assez grand, mi-clos, dans cavité étroite à bord ondulé. Chair blanchâtre ou jaunâtre, mi-tendre, un peu veinée de jaune, mi-juteuse, acidulée mais sucrée ; bonne.

Frémy

Syn. : *Gelineau*.


4.254.598

5 22 48



Fruit surmoyen, globuleux ou déprimé. Épiderme à fond jaune-canari, mi-lisse, parsemé de points assez gros et bruns, lavé de même autour du pédicelle et le plus souvent abondamment voilé de roux y compris le tour de l'œil. Pédicelle court, fort, dans cuvette assez profonde, régulière, rétrécie, à bord régulier et lisse. Œil petit ou moyen, fermé, aux sépales longs et rejetés à l'extérieur dans cuvette moyennement profonde, étroite, plissée ou légèrement bossuée. Chair jaunâtre un peu veinée de jaune, fine, ferme, mi-juteuse, sucrée. Loges petites ; pépins moyens, larges, bruns et nombreux. Bonne.

Arbre de bonne vigueur, mi-étalé très fertile. Rameaux forts, longs, nombreux, brun clair, fortement duveteux. Lenticelles peu abondantes, peu visibles, un peu allongées. Yeux moyens, ovoïdes, appliqués. Feuilles grandes, minces, ovales, allongées, à courte pointe ; dents abondantes, irrégulières. Pétiole fort et assez court. Variété de commerce ; s'accommode de toutes formes et de tous terrains. Cultivée en Maine-et-Loire.



Belle de Boskoop


Syn. : *Reinette de Boskoop*.

2 1
4.254.648
65 85
8

Fruits surmoyens souvent attachés par deux. Épiderme mi-mince, parcheminé, jaune-citrin, plaqué de fauve aux extrémités avec marbrures semblables au pourtour ; légèrement teinté de rouge et parfois strié, avec quelques rares points gris. Pédicelle grêle ou assez fort, dans cuvette large, ondulée. Œil mi-clos, dans cuvette mi-étroite plissée ou côtelée. Chair blanchâtre ou jaunâtre, fine, mi-ferme, juteuse parfumée, sucrée, mi-acidulée ; bonne ou très bonne.

Arbre vigoureux, très fertile. Rameaux sous-moyens, brun-verdâtre ou brun-violacé. Lenticelles rondes et ovales, blanchâtres ; yeux, courts, appliqués, légèrement écartés. Feuilles petites ou moyennes, ovales-arrondies, à pointe aiguë, épaisses, vert foncé, brillantes, un peu arquées à l'extrémité. Dents grandes, obtuses. Fleurs grandes, hâtives.

Variété de commerce et d'amateur ; appelée à remplacer la Reinette du Canada trop sensible au chancre.



Champ-Gaillard

Syn. : *Des Basses-Alpes* ; *Jean Gaillard*.

41 553
4.254.791
5 25 667
6

Fruits surmoyens isolés. Épiderme mince, lisse, parcheminé, jaune citrin clair, peu et grossièrement ponctué et parfois marbré de gris ; abondamment lavé de brun clair autour du pédicelle, frappé ou non de rouge clair. Pédicelle grêle un peu renflé à l'extrémité, dans large cuvette, à bord uni.


Œil moyen, entr'ouvert, dans cuvette étroite, plissée, un peu côtelée ou bossuée. Chair blanc-jaunâtre à zone centrale verdâtre, mi-tendre, serrée ou mi-croquante, mi-juteuse, sucrée ; loges petites, pépins moyens, brun clair. Bonne.

Arbre vigoureux, moyennement fertile. Rameaux brun-rosé. Lenticelles abondantes. Feuilles moyennes, ovales arrondies, un peu creusées. Dents fortes, mi-aiguës. Yeux gros, courts, appliqués. Boutons moyens.

Variété d'amateur et de marché ; pour toutes formes. Cultivée dans les Basses et les Hautes-Alpes.

Belle de Pontoise


1
4.254.841
21 7
4



Fruits gros ou très gros, réunis souvent par 2, 3 et 4. Épiderme lisse, jaune-blanchâtre, lavé de gris ou de brun-verdâtre vers le pédicelle, pointillé de blanchâtre, abondamment frappé de rouge, strié sur toute la hauteur et très légèrement recouvert de pruine olivâtre. Pédicelle mi-grêle, dans cuvette profonde et large. Œil clos, dans cuvette plus ou moins étroite, cernée de bosses. Chair blanchâtre ou blanc-verdâtre, mi-ferme, légèrement sucrée, un peu parfumée, toujours acidulée; bonne ou assez bonne.

Arbre très vigoureux, étalé, fertile. Rameaux longs, forts, brun clair ou rougeâtres ; mérithalles longs. Lenticelles nombreuses, petites, rondes, jaunâtres. Yeux petits, obtus, Feuilles grandes, arrondies, gaufrées, plissées, épaisses, vert foncé. Dents profondes, irrégulières, mi-arrondies. Pétiole gros, court, rosé à la base. Boutons petits. Fleurs grandes, rose-violacé à l'extérieur, de moyenne saison.

Variété d'apparat, de commerce et d'amateur. Réussit même à haute tige, mais gagne à être conduite en formes naines.



Citron d'hiver (Suisse)

Syn. : *Winterzitrone*.


22 2
4.254.844
5 65 79
3

Fruits moyens ou surmoyens, côtelés au sommet. Épiderme mince, lisse, jaune citrin passant au jaune brun à l'insolation, frappé ou non de rouge, légèrement strié ; parfois uniformément jaune, parsemé de quelques petits points gris clair et maculé de brun autour du pédicelle. Pédicelle court, fortement renflé à l'extrémité, dans cuvette profonde, étroite. Œil grand ou petit, mi-clos, dans cuvette moyennement profonde ou peu profonde, plissée et plus ou moins mamelonnée ou faiblement côtelée. Chair blanc-jaunâtre, croquante, juteuse, acidulée, légèrement parfumée, pépins gros et longs. Assez bonne ; de bonne conservation.

Arbre vigoureux, au port arrondi, fertile. Rameaux assez nombreux, droits, gros, longs, gris brun ; lenticelles vert pâle, rondes, débordantes. Yeux aplatis, duveteux, boutons obtus. Feuilles ovales-arrondies ; sous-moyennes, vert foncé, plissées ; dents fines, aiguës.

Variété de commerce, réussit en plaine, à haute tige ; à cueillir tard. Très répandue dans le Valais.

Winesap



Syn. : *Holland's Red Winter* ; *Royal Red* ; *Texan Red*.

98
4.254.853
361 944
77

Fruits assez gros. Épiderme presque lisse, mi-épais, à fond jaune foncé, presque entièrement rouge foncé brillant, légèrement


strié, avec ou sans taches grises et quelques points gris. Pédicelle grêle, dans cuvette mi-large et lavée de brun. Œil grand, mi-clos, dans cuvette côtelée. Chair jaunâtre, mi-tendre, mi-juteuse, peu parfumée, mi-fine, mi-sucrée, à loges petites, pépins moyens, nombreux, bruns ; assez bonne.

Arbre moyennement vigoureux, étalé, très fertile. Rameaux faibles, brun-grisâtre. Lenticelles rondes et ovales, peu abondantes, saillantes ; yeux moyens et ovoïdes. Feuilles petites, ovales-aiguës, un peu creusées. Dents mi-aiguës. Boutons petits, allongés, aigus.

Variété de commerce (américaine) ; sensible à la tavelure ; pour le verger.

Reinette de Chênée


2 6
4.254.858
5 384



Fruits moyens ou surmoyens, fixés isolément. Épiderme assez rude, épais, jaune citrin, parsemé de quelques gros points bruns, fortement teinté de fauve vers le pédicelle, un peu voilé de gris, frappé ou rayé de rouge orangé. Pédicelle fort, dans cuvette large. Œil mi-clos ou ouvert, sépales mi-longs, dans cuvette large, côtelée. Chair blanchâtre ou presque blanche, ferme avec zone verdâtre, juteuse, sucrée, parfumée ; bonne.

Arbre vigoureux, de bonne fertilité. Rameaux forts, brun foncé ou brun-verdâtre. Lenticelles moyennes, rondes, saillantes. Yeux petits, coniques, appliqués. Feuilles grandes, ovales, mi-épaisses, presque planes, vert franc. Dents grandes, profondes, aiguës. Boutons petits.

Variété d'amateur et de marché ; à greffer en formes basses.



Blenheim Pippin

Syn. : *Blenheim orange* ; *de Blenheim*.


4.254.878

335 44

Fruits gros. Épiderme lisse, jaune citrin, couvert de rares petits points bruns, lavé de rose foncé, veiné de rouge. Pédicelle grêle ou assez fort, dans cuvette étroite à bord plissé, cernée de bronze. Œil fermé, dans cuvette plissée ou côtelée. Chair jaunâtre, ferme ou cassante, sucrée, juteuse, parfumée ; bonne.

Arbre de vigueur suffisante, fertile. Rameaux forts, courts, duveteux, vert brunâtre. Lenticelles peu nombreuses, petites, rondes. Yeux moyens, obtus, assez fortement duveteux, appliqués. Feuilles ovales, vert brillant.

Variété d'amateur ; à greffer de préférence sur Paradis.



Rambour d'hiver

4.254.881

345 657

Fruits moyens, attachés par 2. Épiderme mince, lisse, jaune citrin, marbré et pointillé de gris et de roux, teinté de rouge et finement strié de carmin. Pédicelle mi-grêle, dans cuvette étroite, légèrement ondulée. Œil mi-clos dans cuvette large, plissée, chair blanchâtre ou jaunâtre un peu verdâtre sous la peau, presque tendre, acidulée, mi-sucrée, juteuse, peu parfumée ; bonne ou assez bonne.

Arbre vigoureux, étalé, moyennement fertile. Rameaux moyens, brun-rougeâtre légèrement duveteux. Lenticelles


peu nombreuses, rondes, saillantes. Feuilles assez grande, ovales-elliptiques vert-clair, mi-épaisses, un peu plissées et à bord légèrement relevé. Pétiole de 3 centimètres, vert clair ou rosé. Dents aiguës ou obtuses. Boutons moyens, ovoïdes.

Variété d'amateur, de marché, d'industrie (confiserie et marmelades) ; convient pour la haute tige et toutes formes naines.

Ravillac

4.254.882


3 42 977



Fruit moyen, sphérique un peu déprimé ou sphéro-conique. Épiderme lisse, brillant, mi-épais, à fond jaune clair, presque entièrement rosé ou rouge, plus foncé à l'insolation, avec stries menues et peu apparentes, parsemé de quelques petits points gris clair. Pédicelle court, mi-fort, renflé à l'extrémité, dans cuvette profonde, étroite, lavée de fauve clair. Œil moyen ou assez grand, mi-ouvert, dans cuvette moyennement profonde, étroite, plissée, et mamelonnée au pourtour. Chair blanchâtre, mi-tendre, mi-juteuse, parfois un peu rosée ou veinée de rose sous la peau, assez douce ; bonne ou assez bonne crue et cuite.

Arbre moyennement vigoureux, très fertile. Rameaux longs, minces, duveteux, brun-rougeâtre ; lenticelles peu nombreuses, rondes, petites. Yeux petits. Feuilles petites elliptiques, vert foncé, épaisses, rudes, un peu plissées, assez étalées ; dents moyennes, arrondies ; pétiole long, mince. Boutons moyens, courts.

Variété de commerce de la région de Loches. A greffer en tête et sur franc ; pour le verger.



Reinette Grise d'hiver

Syn. : *Reinette Grise* ;; *Reinette Grise haute bonté* ;; *Reinette Grise de Vitry* , *Reinette Grise Française*;; *Reinette Grise de Granville*;; *Reinette Grise de Darnetal* , *Reinette Grise du Limousin*.

2

4.255.568

84 56


Fruits moyens à lobes souvent inégaux, attachés isolément ou par deux. Épiderme rude, mince, jaune-verdâtre, presque entièrement recouvert de gris bronzé et marbré de roux. Pédicelle de moyenne grosseur, dans cuvette large, à bord régulier. Œil mi-clos ou clos, dans cuvette plissée, sépales longs. Chair jaunâtre ou blanc-verdâtre, ferme, sucrée, acidulée parfumée, juteuse ; très bonne.

Arbre de moyenne vigueur, mi-étalé, fertile. Rameaux duveteux, grêles, longs, vert-brunâtre ou brun rougeâtre. Lenticelles peu nombreuses, petites, rondes. Yeux moyens, aplatis. Feuilles allongées, vert franc. Boutons assez gros, ovoïdes, cotonneux. Fleurs moyennes, rosées, tardives.

Variété d'amateur et de marché; pour tous porte-greffes et toutes formes, surtout à haute tige. Sol même argileux. Les sélections nombreuses auxquelles a donné lieu cette variété ont souvent incité à en faire autant de variétés distinctes alors qu'il ne faut voir que des types différents, assez variables eux-mêmes suivant les milieux.

Bedforshire FundlingSyn. : *Mignonne de Bedford.*

1
4.255.657
64 861




Fruits surmoyens généralement aplatis, côtelés au sommet, attachés par 2, 3 et 4. Épiderme lisse, assez épais, jaune-paille, légèrement lavé ou voilé de gris brun au pourtour, maculé de même autour du pédicelle ; assez abondamment ponctué de roux ou de blanchâtre ; frappé de rose ou de rouge sombre uni plutôt que strié. Pédicelle moyen dans cavité assez profonde, large. Œil moyen ou assez grand, sépales longs dans cuvette moyennement ou peu profonde, plissée et plus ou moins côtelée. Chair tendre, jaunâtre, finement veinée de jaune ou de verdâtre ; assez juteuse, un peu acidulée. Bonne ou assez bonne.

Arbre de vigueur et de fertilité suffisantes, parfois très fertile. Rameaux brun foncé noirâtre. Lenticelles nombreuses rondes, saillantes. Yeux gros ; stipules moyennes. Feuilles moyennes ou assez grandes, ovales, plissées ; dents profondes, aiguës puis obtuses, pétiole fort.

Variété d'amateur.

Groseille


7
9
4.255.783
5 67 72
4



Fruits moyens ou sous-moyens, réunis par 2, à contour irrégulier. Épiderme lisse, luisant, mi-épais, jaune-paille ou jaune citrin clair, plus ou moins lavé de rose foncé vif ; légèrement

maculé de gris vers l'œil et assez fortement lavé de fauve clair ou verdâtre vers le pédicelle ; parsemé de quelques rares points brun foncé. Pédicelle court, mi-fort dans cuvette profonde ou moyennement profonde, assez évasée. Œil moyen ou assez grand, ouvert ou mi-ouvert dans cuvette peu profonde, large, plissée, souvent irrégulièrement côtelée. Chair blanche, ferme, assez peu juteuse, acidulée ; assez bonne.

Arbre moyennement vigoureux, mi-érigé, très fertile. Rameaux grêles brun olivâtre, violacés en deuxième génération. Lenticelles rondes, mi-saillantes, peu abondantes, yeux petits, ovoïdes, aplatis. Feuilles petites, ovales, mi-étalées ou en cuiller, épaisses, mi-rigides, au bord un peu ondulé. Dents mi-aiguës. Bouton moyen ou assez gros, bien foncé, cotonneux au sommet. Variété de marché ; de bonne conservation. Cultivé dans la Sarthe.



Reinette de Breda

Syn. : *Nelquin*; *Double Pèpin d'or*.

68

4.255.797

5 4 56


Fruit moyen ou assez gros. Épiderme lisse, jaune clair, parsemé de quelques points bruns, légèrement marbré ou non de rouille, frappé ou non de rose pâle, fauve autour du pédicelle. Pédicelle court ou moyen, gros, droit ou arqué dans cuvette étroite et profonde. Œil petit ou moyen, mi-ouvert ou mi-clos dans cuvette peu ou moyennement profonde, assez fortement côtelée. Chair jaunâtre, mi-tendre, fine, un peu sucrée, acidulée, parfumée. Bonne.

Arbre peu vigoureux, mais bien fertile. Rameaux peu nombreux, érigés, rouge-brique, très cotonneux. Lenticelles arrondies ou allongées, abondantes. Yeux gros, appliqués. Feuilles moyennes, vert clair, épaisses, coriaces ; dents larges.

Variété pour amateur ; à cultiver en petites formes.

Sanguine du Rhin

4
4.255.867
5 342 9 1




Fruit moyen. Épiderme mi-rugueux, jaune verdâtre, largement lavé de fauve vers le pédicelle, un peu veiné de brun ; gros points gris roux saillants, ronds ou anguleux ; teinté de rose ou de rouge brun et discrètement veiné de rouge. Pédicelle grêle, dans cuvette étroite. Œil petit clos ou entr'ouvert dans cuvette étroite, cernée de petites côtes. Chair tendre, blanchâtre avec zone et veines verdâtres, mi-sucrée, acidulée. Loges et pépins moyens. Assez bonne.

Arbre très vigoureux, bien fertile. Rameaux grêles, longs, brun clair. Lenticelles moyennement nombreuses, saillantes, allongées ou rondes. Yeux gros, larges. Feuilles grandes ou moyennes, elliptiques, mi-parcheminées, vert foncé. Dents assez larges obtuses ou mi-aiguës. Variété d'amateur.

Court pendu gris

Syn. : *Court pendu doré* ; *de Capendu*.

8
72 9
4.255.873
5 24 688




Fruits sous-moyens ou moyens attachés par deux. Épiderme épais, jaune citrin, parsemé de gros points gris, taché ou marbré de gris fauve, y compris les deux cuvettes, teinté de rose et parfois légèrement strié de rouge. Pédicelle assez fort dans cuvette large, assez régulière. Chair blanc-jaunâtre, ferme, sucrée, parfumée ; bonne crue, très bonne cuite.

Arbre assez vigoureux, érigé, fertile. Rameaux moyens, courts, brun-verdâtre. Lenticelles assez nombreuses, petites.

Yeux gros, obtus, assez fortement duveteux. Feuilles moyennes, arrondies. Dents profondes, régulières. Fleurs petites, très tardives.

Variété d'amateur et de marché ; pour haute tige.




Beauty of Kent

Syn. : *Pépin de Kent* ; *Beauté de Kent*.

2
4.255.881
3 67 35

Fruit gros. Épiderme lisse, jaune citrin avec quelques petits points bruns, largement lavé de roux autour du pédicelle, frappé ou non de rouge uni avec de courtes stries. Pédicelle moyen, dans cuvette à bord légèrement ondulé. Œil fermé, dans cuvette plissée à peine ondulée. Chair blanche, juteuse, tendre, sucrée, acidulée ; bonne au couteau ; très bonne cuite.

Arbre de vigueur suffisante, moyennement fertile. Rameaux forts, longs, étalés, brun-rouge, arqués. Lenticelles grosses, saillantes. Yeux moyens, obtus, appliqués. Feuilles grandes, vert foncé. Dents irrégulières. Variété d'amateur et à cuire.



Arkansas Black


9
4.255.988
2 5

Fruit assez gros. Épiderme lisse, épais, résistant, rouge foncé, marbré de fauve vers le pédicelle, pointillé de gris blanchâtre. Pédicelle grêle, arqué, dans cuvette étroite. Œil clos aux sépales courts, dans large cuvette cernée de côtes ou plissée. Chair jaune, ferme, avec zone verdâtre, un peu juteuse, sans saveur ni parfum spéciaux ; assez bonne.

Variété américaine de commerce et d'apparat.

BarbeSyn. : *Courby*.

6
82 68
4.257.765
5 43 391
7 7




Fruits moyens réunis par deux et trois. Épiderme lisse, mi-épais, brillant, jaune citrin, taché de roux vers le pédicelle, parsemé de gros points gris ou blanchâtres ; parfois veiné de brun et plus ou moins frappé d'un beau rouge vif uni. Pédicelle fort, renflé à l'extrémité, dans cuvette mi-étroite. Œil fermé, à sépales assez longs, dans cuvette peu profonde, plissée ou côtelée. Chair blanche, mi-tendre ou mi-ferme avec zone et veines verdâtres ou jaunâtres, acidulée, mi-juteuse ; loges étroites ; pépins moyens allongés, brun très foncé. Médiocre ou assez bonne.

Arbre de vigueur modérée, érigé, assez fertile. Rameaux brun-olivâtre ou un peu rougeâtres. Lenticelles rondes, saillantes. Yeux petits, appliqués. Feuilles moyennes ou assez grandes, ovales, épaisses, rudes, plissées. Pétiole gros, dents peu profondes, aiguës. Boutons petits.

Variété à deux fins pour verger et routes. Cultivée dans la Drôme, l'Isère et l'Ardèche.

Pearmain HerefordshireSyn. : *De Hereford* ; *Merveille Pearmain* ; *Pearmain Royal* ; *Royal Pearmain d'hiver*.

1 5
4.257.845
24 456




Fruit gros ou moyen. Épiderme mince, jaune foncé avec quelques points bruns, marbré de rouille, taché ou voilé de gris, teinté et strié de rouge-brun. Pédicelle assez gros, dans cuvette lavée de gris. Œil ouvert, dans cuvette large, parfois

plissée ou bossuée. Chair blanc-verdâtre ou jaune-verdâtre, serrée, juteuse, sucrée, acidulée, parfumée ; très bonne.

Arbre de moyenne vigueur, suffisamment fertile. Rameaux gros, longs, brun-violacé. Lenticelles peu nombreuses, petites. Yeux petits, appliqués.

Variété d'amateur ; tous porte-greffes ; toutes formes.



Margille

Syn. . *Reinette musquée; Reinette sucrée.*


4.257.848

3 85 45

Fruit moyen, obliquement tronqué. Épiderme jaune foncé ou doré, marbré de gris, surtout vers le pédicelle, avec quelques points gris et strié de rouge. Pédicelle assez fort, dans cuvette à bord presque régulier. Œil assez grand, clos ou mi-clos, dans cuvette large, un peu plissée. Chair jaune d'or, ferme ; bonne.

Arbre de vigueur assez faible, au port arrondi, très fertile. Rameaux nombreux, longs et grêles, brun-verdâtre à reflet rougeâtre. Lenticelles allongées, petites et abondantes. Yeux gros, ovoïdes. Feuilles petites, ovales-allongées, un peu lancéolées, planes. Dents peu profondes ; pétiole long et grêle.

Variété d'amateur pour plein vent, mais à greffer en tête ; réussit, bien en petites formes.



Châtaignier

Syn. : *de Chastignier.*

44 65

4.257.884

5 25 976

6

Fruits surmoyens ou moyens, réunis souvent par 2 et

parfois 3. Épiderme peu épais, lisse, jaune citrin ou jaune verdâtre veiné ou lavé de fauve autour du pédicelle, presque entièrement lavé de rouge et strié de carmin. Pédicelle assez fort, dans cuvette évasée. Œil

mi-clos, dans cuvette plissée ou entourée de petites bosses. Chair blanche ou blanc-verdâtre, très ferme, un peu cassante, sucrée, parfumée ; bonne crue et très bonne cuite.


Arbre moyennement vigoureux, étalé, plus ou moins fertile. Rameaux courts, forts, brun-violacé. Lenticelles un peu saillantes, arrondies, grosses. Yeux moyens, allongés, appliqués. Feuilles petites, arrondies, épaisses, un peu gaufrées, planes. Dents aiguës ou mi-aiguës, grandes et irrégulières. Fleurs moyennes, tardives.

Variété de commerce ; s'accommode de la haute tige.

Reinette du Canada blanche

Syn. : *Canada blanc* ; *Reinette de Canada* ; *Canada* ; *Grosse Reinette d'Angleterre*.

85 38
4.261.677
5 54 441
9 7




Fruits gros ou très gros attachés par un ou deux. Épiderme mi-mince assez rude, jaune citrin, maculé de fauve, surtout aux extrémités, parsemé de quelques gros points gris irréguliers, anguleux; frappé ou non de rose plus ou moins vif à l'insolation. Pédicelle assez gros, court, dans cuvette évasée, à bord ondulé. Œil mi-ouvert dans cuvette parfois plissée ou

côtelée. Chair blanc-jaunâtre, tendre, sucrée, parfumée ; très bonne.

Arbre assez vigoureux, mi-étalé, fertile, mais alternant. Rameaux gros et longs, brun-violacé. Lenticelles assez nombreuses, rondes, saillantes. Yeux gros, coniques, duveteux. Feuilles ovales, arrondies, épaisses, vert foncé, brillantes, légèrement creusées. Dents grandes, aiguës. Fleurs grandes, de moyenne saison.

Variété de commerce et d'amateur, tous porte-greffes et toutes formes ; sol sain et exposition Est; sujette au chancre.



Favourite de William

5 5
4.261.882
94 96


Fruits gros ou surmoyens, attachés par 1 et par 2. Épiderme lisse, mince, à fond jaune clair, presque entièrement teinté de rouge clair, frappé de rouge foncé violacé pruiné, parfois très légèrement strié, maculé de brun verdâtre vers le pédicelle, un peu marbré de roux au pourtour, parsemé de petits points gris. Pédicelle grêle, renflé à l'extrémité, dans cuvette très étroite à bord ondulé ou uni. Œil mi-clos, dans cuvette plissée et côtelée. Chair blanche, tendre, peu juteuse, peu sucrée, non acidulée ; assez bonne.

Arbre vigoureux, moyennement fertile. Rameaux brun-verdâtre. Lenticelles petites, rondes. Yeux courts. Feuilles ovales, moyennes, planes, gaufrées, plissées, mi-rigides, vert foncé. Dents bien marquées, obtuses. Fleurs blanches, grandes, hâtives.

Variété d'amateur, de commerce et à cuire.

Reinette ParmentierSyn. : *Grise de Parmentier*.

94
4.262.553
31 8




Fruit moyen ou surmoyen. Épiderme mince, mi-lisse, à fond jaune-citrin, parsemé de points gris clair, entièrement recouvert de fauve ; avec ou sans plaques écailleuses, parfois d'un brun plus clair ou cuivré au soleil. Pédicelle fort, moyen, renflé à l'extrémité, dans cuvette étroite à bord à peine ondulé. Œil moyen ou assez grand, clos ou mi-clos, aux sépales mi-allongés, dans cuvette étroite, légèrement côtelée. Chair blanchâtre, mi-ferme, sucrée, parfumée, peu juteuse ; bonne.

Arbre vigoureux, suffisamment fertile. Rameaux gros, longs, tomenteux, brun violacé ou brun verdâtre. Lenticelles peu nombreuses, grosses, saillantes. Yeux moyens, appliqués. Feuilles ovales-elliptiques, parcheminées, étalées ou un peu bombées et arquées, vert foncé. Dents grandes, obtuses ; pétiole fort, rosé. Boutons arrondis.

Variété d'amateur ; à cultiver en petites formes, à tailler long. Sensible au chancre.

Impériale AncienneSyn. : *Frangée ; Magnifique*.

5
4.262.673




Fruits assez gros, généralement isolés, parfois par deux, irrégulièrement côtelés. Épiderme jaune citrin recouvert d'assez nombreux petits points gris, un peu marbré ou voilé de fauve, fortement maculé de même autour du pédicelle, légèrement

frappé de rose carminé. Pédicelle court, ou moyen, dans cuvette mi-étroite à sommet ondulé. Œil moyen ou assez grand, entr'ouvert, dans cuvette peu ou moyennement profonde, plissée et côtelée. Chair blanche, ferme ou croquante, sucrée ; bonne ou très bonne.

Arbre vigoureux, mi-érigé, fertile. Rameaux nombreux, de grosseur et longueur moyennes, cotonneux, rouge-brun assez foncé. Lenticelles grandes, rondes ou longues, abondantes. Yeux gros, coniques cotonneux, appliqués. Feuilles assez petites, vert clair, ovales, terminées en pointe allongée, bords relevés en gouttière. Dents assez profondes.

Variété d'amateur ; pour toutes formes et tous porte-greffes.



Delicious

Syn. : *Stark Delicious*.

35 58
4.262.861
326 23
54 3

Fruits surmoyens, attachés par deux et trois. Épiderme épais, jaune citrin ou clair, frappé de rose, parsemé de petits points roux auréolés de gris clair, abondamment garni de stries entrecoupées, recouvert d'une légère efflorescence violacée. Pédicelle fort ou mi-grêle, renflé à l'extrémité, dans cuvette mi-étroite. Œil clos, à sépales longs et grêles, dans cuvette large ou rétrécie, plissée et entourée de fortes côtes. Chair blanche ou blanchâtre, mi-ferme, veinée de jaunâtre, mi-juteuse, sucrée ; loges moyennes, pépins sous-moyens brun rougeâtre ; assez bonne ou bonne.

Arbre de vigueur modérée, étalé, fertile. Rameaux assez gros ou moyens. Lenticelles arrondies, saillantes. Feuilles en partie ovales et en partie elliptiques-allongées. Dents obtuses. Boutons petits.


Variété de commerce. (Américaine.)

Reinette blanche de Champagne

Syn. : *Reinette plate de Champagne*.

4.264.153

5 51 74



Fruits surmoyens aplatis, attachés par 1 ou 2. Épiderme mince, parcheminé, jaune clair ou même jaune-ivoire, lavé de brun clair autour du pédicelle, rarement taché de même au pourtour, avec ou sans teinte rosée à l'insolation, parsemé de quelques petits points blanchâtres ou bruns. Pédicelle moyen, mi-grêle, renflé à l'extrémité, dans cuvette profonde, élargie au sommet, lavée de gris et à bord très ondulé. Œil assez grand ou moyen, clos, sépales mi-longs, dans cuvette moyennement profonde, plissée et légèrement côtelée. Chair blanche, ou blanchâtre, un peu veinée de jaune, mi-ferme ou mi-tendre, juteuse, légèrement sucrée et acidulée ; pépins gros et noirâtres. Assez bonne.


Arbre de bonne vigueur, très fertile, mi-érigé. Rameaux assez gros, brun-rougeâtre, plutôt courts. Lenticelles rondes, un peu saillantes, peu abondantes. Yeux moyens, plats et appliqués. Feuilles moyennes ou sous-moyennes, ovales, mi-rigides, à peine plissées. Dents larges mi-obtuses ; pétiole gros. Bouton moyen, obtus, cotonneux.

Variété de commerce, appréciée en Suisse ; de longue conservation ; à consommer de février à mai.

Belle Joséphine

Syn. : *Baltimore* ; *Monstrueuse Pippin* ; *Impératrice Joséphine*.

3 7
4.264.187
3 21 34




Fruit gros. Épiderme mi-mince, lisse, vert-clair passant au jaune-paille uniforme ;

à peine lavé de fauve-olivâtre vers le pédicelle. Pédicelle assez fort dans cuvette étroite. Œil grand, mi-clos, dans cuvette mi-large, bossuée ou côtelée au pourtour. Chair blanche un peu veinée ou jaunâtre, mi-fine, mi-tendre peu ou mi-juteuse, peu parfumée. Assez bonne crue ; bonne cuite.

Arbre vigoureux, peu fertile. Rameaux assez forts, brun rougeâtre ou olivâtre. Lenticelles peu nombreuses, petites, rondes, saillantes. Yeux gros, aplatis. Feuilles moyennes, elliptiques-allongées, vert gai, épaisses, gaufrées, un peu plissées, arquées et creusées. Dents profondes, aiguës ou mi-aiguës.

Variété d'amateur, pour petites et moyennes formes.



5 32 757

Reinette de Cuzy

Syn. : *Reinette à côtes* ; *Reinette carrée de Montbard* ; *Reinette d'Angleterre*.

1 9
4.264.381


Fruits moyens ou surmoyens, attachés par 1 ou 2. Épiderme mi-épais, jaune citrin ou foncé, fortement lavé de gris-roux autour du pédicelle, abondamment pointillé de gris et parfois un peu frappé de rouge. Pédicelle fort, dans cuvette étroite. Œil fermé, dans cuvette côtelée ; sépales mi-longs. Chair blanchâtre ou jaunâtre avec petite zone verdâtre, fine, tendre, juteuse, sucrée, parfumée ; très bonne.

Arbre de vigueur et de fertilité moyennes, mi-étalé. Rameaux forts mi-courts, grisâtres ou vert-brunâtre. Lenticelles peu nombreuses grosses, rondes. Yeux petits, coniques, aigus, appliqués. Feuilles moyennes, ovales-arrondies, planes ou légèrement tourmentées, à pointe courte. Dents grandes, mi-aiguës ou obtuses. Pétiole long de 35 millimètres. Fleurs moyennes, légèrement rosées, de moyenne saison. Boutons arrondis.

Variété de commerce et d'amateur ; de très bonne conservation ; s'accommode de tous porte-greffes et de toutes formes.

Baldwin

Syn. : *Calville Buttner* ; *Red Baldwin* ; *Woodecker* ; *Pecker*.



81 7
4.264.648
5 357 853
8


Fruits surmoyens, attachés par 2. Épiderme mince ou lisse, jaune citrin, recouvert de petits points gris, veiné ou voilé de fauve, frappé assez abondamment de rouge sombre et strié de rouge cramoisi, grisâtre dans la cavité caudale. Pédicelle assez fort, de longueur variable, dans cuvette mi-large. Œil entr'ouvert, dans cuvette étroite, plissée, parfois côtelée. Chair blanc-jaunâtre veinée de vert, mi-ferme, juteuse, sucrée, parfumée ; bonne ou très bonne.

Arbre vigoureux, assez fertile. Rameaux gros, longs, brun-violacé. Lenticelles nombreuses, grosses, rondes. Yeux gros. Feuilles moyennes, ovales, vert foncé. Dents profondes. Boutons ovoïdes.

Variété d'amateur ; convient pour toutes formes, mais préfère l'abri des vents.

Quetier

4.264.766
52 6 3




Fruits gros ou surmoyens attachés par 2 et 3, larges, un peu côtelés. Épiderme lisse, jaune-citrin, ou un peu verdâtre parsemé de rares petits points roux, peu ou pas marbré

VERCIER. – *Comment reconnaître les fruits.*

de roux, teinté partiellement de rose sombre. Pédicelle moyen ou mi-long, grêle, renflé à l'extrémité, dans cuvette profonde, étroite, bosselée au sommet. Œil petit, fermé, à longs sépales, dans cuvette moyennement profonde, étroite, entourée parfois de nombreuses petits côtes, se terminant à mi-hauteur du fruit. Chair blanche, veinée de vert, mi-ferme, mi-croquante, légèrement parfumée, sucrée, acidulée, juteuse ; assez bonne.

Arbre de vigueur modérée, assez fertile. Rameaux grêles, brun-rougeâtre. Lenticelles petites, rondes, peu saillante, rares. Yeux arrondis, appliqués. Boutons souvent terminaux, petits ou assez forts, coniques. Feuilles moyennes, elliptiques, vert foncé, gaufrées, épaisses, étalées, à pointe parfois arquée.

Variété pour amateur.



Galantine

Syn. : *Charrière* ; *Carrière*.

4
4.264.794
55 8


Fruit moyen ou surmoyen, épiderme lisse, mince, à fond jaune orange, plus ou moins abondamment pointillé de gris, un peu teinté de rouge mi-brillant. Pédicelle court, gros à l'extrémité; dans cuvette évasée. Œil clos, dans cuvette irrégulière, peu profonde, bosselée au sommet ; chair blanche cassante, sucrée, acidulée ; bonne.

Arbre de moyenne vigueur, érigé, fertile. Rameaux grêles, brun rougeâtre. Lenticelles peu nombreuses, rondes, grisâtres. Yeux arrondis., appliqués. Feuilles grandes, dents profondes, aiguës. Boutons gros, ovoïdes. Fleurs grandes, légèrement rosées, de moyenne saison.

Variété de marché et d'exportation.

Jonathan

5
27 3
4.264.863
3 31 95
1 9




Fruits moyens ou surmoyens, isolés, rarement par 2. Épiderme résistant, lisse, à fond jaune pâle presque entièrement frappé de rouge vif et recouvert de stries plus foncées. Pédicelle mi-grêle, dans cuvette profonde lavée de gris. Œil clos dans cuvette côtelée ou plissée, parfois très peu profonde. Chair blanche ou un peu rosée, ferme ou mi-croquante, un peu juteuse, acidulée, légèrement parfumée ; assez bonne.

Arbre de bonne vigueur, rustique, fertile. Rameaux menus, brun violacé foncé. Feuilles moyennes, ovales-allongées, vert franc, rigides, presque planes, dents mi-aiguës.

Variété de commerce, américaine.

Géante d'Exposition

9 4
4.264.892
3 51 95




Fruits gros ou très gros, attachés isolément ou par 2. Épiderme lisse, très mince, jaune-paille, brun clair ou verdâtre autour du pédicelle ; sans ou avec quelques marbrures grises au pourtour, finement pointillé de gris, parfois presque entièrement rouge, strié mais peu distinctement et pruiné. Pédicelle assez fort, renflé à l'extrémité, dans cuvette mi-étroite. Œil ouvert ou clos dans cuvette étroite, légèrement bossuée. Chair blanche ou blanchâtre, tendre, fine, mi-juteuse,

assez peu sucrée, peu parfumée ; pépins et loges développés. Assez bonne ou médiocre.

Arbre de vigueur modérée, assez peu fertile. Rameaux forts, brun-violacé. Yeux moyens, appliqués. Feuilles irrégulières, ovales, à bord souvent ondulé, vert foncé, luisant, à pointe obtuse. Dents irrégulières, arrondies.

Variété d'apparat ; à cultiver en formes naines.



Belle-Fleur longue

Syn. : *Belle Fleur rouge* ; *Crotte* ; *d'Auberive* ; *Glacière* ; *Monsieur* ; *Richarde*.

52 75
4.264.986
31 89


Fruits surmoyens attachés par 3. Épiderme lisse, vert-jaunâtre, lavé de gris fauve autour du pédicelle, largement frappé de rouge vif ou rouge violacé, quelquefois avec de légères stries. Pédicelle moyen, dans cuvette étroite, à bord ondulé. Œil mi-clos dans cuvette plus ou moins étroite et côtelée. Chair blanc-verdâtre, ferme, un peu acidulée ; bonne cuite et assez bonne crue.

Arbre vigoureux, mi-étalé, bien fertile, résiste aux gelées de printemps. Rameaux duveteux. Lenticelles saillantes. Yeux gros, appliqués. Feuilles ovales à dents aiguës. Boutons moyens, ovoïdes. Floraison tardive.

Variété régionale (Est et Nord) ; de marché ; se conserve bien au fruitier ; peut faire un assez bon cidre.

Calville Lesens

2 74
4.265.161
9 397




Fruits moyens, attachés par 2, 3, 4. Épiderme lisse, souvent onctueux, jaune clair, longtemps un peu verdâtre, légèrement pointillé ; taché de gris vers le pédicelle ; parfois un peu teinté de rose ou de rouge. Pédicelle grêle dans cuvette étroite, ondulée. Œil fermé, sépales longs dans cuvette mi-étroite, côtelée. Chair blanchâtre ou jaunâtre un peu veinée de vert, mi-tendre, mi-juteuse, acidulée, parfumée ; pépins larges, brun-clair ; loges moyennes ; bonne ou assez bonne.

Arbre vigoureux, fertile. Rameaux longs, brun-verdâtre, un peu violacés. Mérithalles longs. Lenticelles peu nombreuses, grises, arrondies. Yeux gros, appliqués. Feuilles grandes, épaisses, planes, gaufrées, à bord à peine ondulé, vert franc. Dents mi-profondes, obtuses. Floraison tardive.

Variété d'amateur et de marché.

Dorée de Bœdiker


4.265.761
9



Fruits moyens, attachés par 2 et 3. Épiderme lisse, jaune doré, frappé de rouge. Pédicelle grêle dans cuvette étroite, lavée de roux. Œil fermé, dans cuvette plissée et côtelée. Chair blanchâtre, tendre, assez juteuse, sucrée ; bonne.

Arbre moyennement vigoureux, d'assez bonne fertilité. Rameaux moyens, brun rougeâtre. Lenticelles peu nombreuses rondes. Yeux petits. Feuilles grandes, ovales, vert franc, luisantes, plissées, un peu convexes. Dents moyennes. Boutons moyens.

Variété d'amateur.



Pigeonnet blanc d'hiver


Syn. : *Pointue* ; *Pigeon blanc* ; *Nez de mouton* ; *Huttlins*.

9
4.265.764
5 35

Fruit moyen, conique, asymétrique, très légèrement côtelé et solidement attaché à l'arbre. Épiderme lisse, épais, jaune pâle légèrement verdâtre, plus ou moins frappé de rouge ou de rose à l'insolation, fortement lavé de fauve autour du pédicelle, parsemé de petits points blanchâtres et gris. Pédicelle assez fort, de moyenne longueur, débordant à peine le fruit, renflé à son extrémité ; dans cuvette profonde, étroite à bord uni ou à peine ondulé. Œil petit ou moyen, fermé ou mi-clos, dans cuvette peu profonde, plissée, à bord mamelonné et oblique. Chair blanche et blanchâtre vers les loges, mi-ferme, juteuse, acidulée ; loges assez grandes, pépins petits et renflés. Assez bonne.

Arbre vigoureux un peu étalé, fertile. Rameaux nombreux, forts, coudés, brun olivâtre nuancé de rougeâtre. Lenticelles rondes ou allongées, nombreuses. Yeux petits ou moyens, arrondis. Feuilles moyennes, ovales-allongées, vert clair, dents profondes. Pétiole fort et court.

Variété de commerce ; pour le plein vent ; région des Hautes-Alpes.



Sainte-Barbe

7
4.265.872
41 981

Fruits gros et plats, tantôt très aplatis aux deux pôles et moyennement colorés, tantôt un peu moins déprimés et presque entièrement rouges. Épiderme lisse,

mince, d'abord rouge-violacé très pruiné, puis rouge avec stries allant jusqu'au noirâtre à l'insolation ; clairsemé de points blanchâtres. Pédicelle court, fort, dans cuvette étroite, bossuée, lavée de brun. Œil fermé, dans cuvette bosselée. Chair blanchâtre avec zone verdâtre, tendre, acidulée ; médiocre.


Arbre vigoureux, moyennement fertile. Rameaux moyens. Lenticelles peu nombreuses, rondes. Yeux moyens. Feuilles elliptiques, vert foncé, peu coriaces, étalées, légèrement plissées. Dents aiguës. Boutons petits, arrondis.

Variété d'amateur ; pour moyennes et petites formes.

Brabant Belle fleur


Syn. : *Belle fleur de Brabant* ; *Bon Pommier d'automne* ; *Belle fleur d'automne* ; *Gloire de Flandre* ; *Iron*.

9
4.265.883
57 766



Fruits surmoyens, attachés par deux. Épiderme mi-épais, lisse, jaune citrin clair, un peu ponctué de brun et de gris, frappé de rouge tendre, rayé de pourpre et pruiné. Pédicelle gros, dans cuvette étroite, côtelée, rouillée au centre. Œil mi-clos, à forts sépales, dans cuvette plus ou moins large, plissée, côtelée ou ondulée. Chair blanchâtre ou blanc-verdâtre veinée de verdâtre, pleine, ferme, sucrée, légèrement acidulée, parfumée ; petits pépins, assez bonne.

Arbre vigoureux, assez fertile. Rameaux gros, longs, gris-verdâtre. Lenticelles peu nombreuses, un peu allongées. Yeux moyens, coniques, obtus, presque appliqués. Feuilles moyennes, planes ou à bords relevés en gouttière, vert sombre. Dents grandes aiguës ou obtuses. Fleurs moyennes, hâtives. Variété de marché ; de verger (région d'Angers).



Winter Banana


Syn. : *Banane d'hiver* ; *Flory*.

2 83
4.267.767
5 5 55

Fruits surmoyens, groupés par 2 ou 3. Épiderme mince, jaune pâle, parsemé de points blanchâtres ou rougeâtres, généralement teinté de fauve vers le pédicelle et frappé de rose vif violacé ; montre fréquemment une sorte de couture longitudinale. Pédicelle fort dans cuvette mi-évasée, à bord ondulé. Œil clos, quelquefois mi-ouvert dans cuvette large, plissée. Chair jaunâtre, serrée, grossière, avec quelques veines verdâtres, mi-juteuse, légèrement acidulée, peu parfumée. Assez bonne ou bonne.

Arbre de moyenne vigueur, étalé, très fertile. Rameaux grêles, gris-verdâtre. Lenticelles rondes, grisâtres. Feuilles moyennes, ovales, elliptiques, vert clair, rigides, presque planes. Dents peu profondes, arrondies. Boutons gros, allongés.

Variété américaine, d'apparat et de commerce quoique assez sensible aux chocs.



Raisin

Syn. : *Sauer Grauech*.

9
4.267.845
3 15 57

Fruit surmoyen. Épiderme mince, lisse parsemé de points blanchâtres, à fond jaune clair frappé de rose finement strié de carmin à l'insolation, parsemé de petits

points jaunâtres, légèrement pruiné, un peu maculé de brun clair autour du pédicelle. Pédicelle grêle, de moyenne longueur, un peu renflé aux extrémités dans cuvette mi-étroite et moyennement profonde, à bord uni, quelquefois ondulé. Œil assez grand ou moyen, mi-ouvert, aux sépales assez longs et repliés extérieurement, dans cuvette peu profonde, plissée et un peu côtelée au pourtour. Chair blanchâtre ou blanc-verdâtre, fine, tendre mais serrée, mi-sucrée, acidulée, très légèrement parfumée ; loges grandes ; pépins petits et renflés. Assez bonne ou médiocre crue, bonne cuite ou cidrifiée.


Arbre de vigueur progressive, très érigé, ne fructifiant qu'après dix ans, rustique, résistant aux maladies. Rameaux mi-grêles, brun rougeâtre foncé. Yeux petits, appliqués. Feuilles moyennes, elliptiques, à pointe courte et aiguë ; plus ou moins ondulées ; dents peu marquées.

Variété à deux fins, pour vergers et pour routes ; s'accommode d'une attitude de 1000 mètres ; assez appréciée en Suisse.

Reinette Baumann

Syn.: *Reinette de Bollviller*; *Baumann's Rothe Winter*.


8
25 8
4.267.853
5 54 984
92



Fruits moyens ou surmoyens, asymétriques, bosselés, isolés ou groupés par 2 ou 3. Épiderme mi-épais, lisse, brillant, à fond jaune clair, un peu maculé de brun, parsemé de quelque petits points roux et presque entièrement lavé de rouge-cerise avec de fines stries carmin pourpré. Pédicelle court ou moyen, assez gros, dans cuvette large, bosselée ou ondulée. Œil moyen, mi-ouvert ou mi-clos, dans cuvette étroite, côtelée. Chair jaunâtre ou blanchâtre, veinée de vert, ferme, sucrée, acidulée, parfumée ; bonne.

Arbre assez vigoureux, presque érigé, très fertile. Rameaux longs, brun violacé. Lenticelles moyennement nombreuses, petites, rondes. Mérithalles longs. Yeux moyens, un peu rougeâtres. Feuilles moyennes, épaisses, elliptiques-obtuses, parfois creusées ou au contraire convexes, vert foncé. Dents petites, peu aiguës ou arrondies. Boutons assez gros, ovoïdes. Fleurs nombreuses, tardives.

Variété d'amateur et de marché ; à cultiver sous toutes formes ; perd ses fruits de bonne heure sauf sur Paradis et Doucin.



Fenouillet gros

Syn. : *Reinette douce*.

4.271.593
5 65


Fruit moyen. Épiderme mi-épais, rude, jaune grisâtre, voilé de gris plus ou moins bronzé, marbré de roux surtout autour du pédicelle, abondamment pointillé de brun grisâtre, souvent frappé de rouge cuivré à l'insolation. Pédicelle assez grêle dans cuvette plus ou moins évasée. Œil ouvert ou mi-clos, dans cuvette large et régulière. Chair blanche à zone verdâtre, ferme et croquante, sucrée, mi-juteuse, parfumée ; bonne, crue et cuite.

Arbre assez vigoureux, étalé, fertile. Rameaux érigés, gros, coudés, assez nombreux, brun-rougeâtre clair. Lenticelles peu nombreuses, grandes, arrondies. Yeux moyens, coniques-arrondis, appliqués. Feuilles sous-moyennes, ovales allongées. Dents profondes.

Variété pour amateur et à cuire ; à greffer de préférence sur Doucin. A greffer en tête pour le plein-vent.

Franc Roseau

57 8
4.271.774
5 84 4 3
9



Fruit moyen ou surmoyen. Épiderme mince, résistant, luisant, jaune verdâtre ou citrin clair, largement lavé de brun fauve vers le pédicelle, ponctué de gris et de jaunâtre, fortement lavé de rouge foncé et finement strié de rouge plus ou moins foncé. Pédicelle court, mi-grêle, renflé à l'extrémité dans cuvette large. Œil grand aux forts sépales, mi-clos, dans large cuvette plissée. Chair blanche, fine, très ferme, croquante, mi-juteuse, un peu sucrée, acidulée, un peu parfumée ; loges petites ; pépins sous-moyens, brun foncé. Bonne.


Arbre de moyenne vigueur, étalé, suffisamment fertile. Rameaux nombreux assez longs, forts ou gros, coudés, rouge-brun. Lenticelles nombreuses, petites, rondes ou allongées. Yeux gros, coniques, appliqués. Feuilles assez grandes, ovales-allongées. Dents irrégulières, grandes, profondes, aiguës ou obtuses. Fleurs sous-moyennes, légèrement rosées. Boutons moyens, ovoïdes.

Variété pour verger ; de très bonne conservation. Cultivée en Haute-Savoie et dans le Valais.

Fenouillet gris

Syn. : *Aromatic Russet* ; *Fenouillet anisé* ; *Petit Fenouillet* ; *Gorge de pigeon* ; *Fenouillet roux*.

1
4.275.593
5 7 68




Fruit sous-moyen ou petit. Épiderme rugueux, mi-épais, jaune lavé de gris sur sa plus grande surface, marbré de

fauve qui passe au brun rougeâtre, frappé de rouge-brique à l'insolation, ponctué de gris. Pédicelle fort, dans cuvette étroite, un peu ondulée. Œil ouvert ou mi-clos, dans cuvette à bord uni. Chair blanche, ferme ou mi-ferme, sucrée, juteuse, parfumée ; très bonne.

Arbre moyennement vigoureux érigé, fertile. Rameaux assez gros, peu nombreux, brun violacé foncé. Lenticelles rondes ou allongées, petites. Yeux arrondis. Feuilles petites, elliptiques à pointe courte, vert foncé, planes, assez souples. Dents aiguës. Fleurs moyennes, rosées, tardives.

Variété d'amateur, de marché ; bonne pour toutes formes, doucin plus particulièrement.



Paragon de Dowiuny

82
4.275.646
44 4 5
5


Fruits gros ou surmoyens, attachés par 2 et 3. Épiderme blanchâtre ou jaune-verdâtre, plus ou moins taché de gris rouillé, largement frappé ou non de rose vif, parfois strié de carmin, garni de quelques points grisâtres arrondis. Pédicelle grêle, dans cuvette mi-large, à bord régulier. Œil grand, mi-clos, dans cuvette large un peu plissée ou côtelé. Chair blanc-verdâtre, mi-ferme, mi-juteuse, finement veinée de vert ; loges moyennes, pépins moyens. Assez bonne.

Arbre vigoureux, moyennement fertile. Rameaux assez forts, brun verdâtre. Lenticelles peu nombreuses, rondes, très petites, légèrement saillantes. Yeux pointus. Feuilles assez grandes, souples, elliptiques, gaufrées, vert foncé, terne. Dents mi-obtuses ou aiguës. Pétiole gros, court.

Variété d'amateur et d'apparat ; à cultiver en petites formes.

Franc Rougeot

1 7
4.275.994
3 4 788



Fruit moyen. Épiderme jaune citrin, parsemé de petits points roux, marbré de fauve vers le pédicelle, abondamment ou presque entièrement teinté de rouge foncé. Pédicelle fort, renflé à son extrémité, dans cuvette étroite. Œil clos, sépales très développés, dans cuvette plissée. Chair blanchâtre avec zone verdâtre, cassante ; bonne ou assez bonne.


Arbre vigoureux, étalé, fertile. Rameaux brun rougeâtre. Lenticelles peu nombreuses, rondes. Yeux moyens, appliqués. Feuilles moyennes, vert pâle, épaisses, bien que souples. Dents grandes, aiguës, ou parfois presque arrondies. Boutons moyens, ovoïdes.

Variété de marché ; de verger ; de bonne conservation ; sensible à la tavelure.

Reinette de France

Syn. : *Court pendu de Tournay*; *Reinette d'Orléans*.

54 8
4.277.674
5 45 5 6




Fruits moyens ou surmoyens, attachés par 2 ou 3. Épiderme mi-mince, parcheminé, mi-rugueux, roux sur fond jaune doré, plus ou moins abondamment voilé de gris-brun, y compris les deux cuvettes ; parsemé de quelques gros points débordants ; frappé quelquefois de rose avec quelques menues stries. Pédicelle court ou charnu dans cuvette moyennement profonde, ou profonde, évasée au sommet, plus ou moins écaillée. Œil assez grand aux sépales courts, ouvert, dans

cuvette large et peu profonde, un peu plissée. Chair blanchâtre, ferme, un peu croquante, mi-juteuse, mi-acidulée, zonée ou veinée de verdâtre. Loges assez petites, arrondies ; pépins gros, plats et brun foncé. Bonne.

Arbre moyennement vigoureux à port arrondi ou mi-étalé, moyennement et tardivement fertile. Rameaux mi-grêles, brun olivâtre ou brun foncé. Lenticelles peu abondantes, rondes, saillantes. Yeux assez gros, obtus, appliqués, cotonneux. Feuilles ovales, petites, minces, mi-rigides, à bord relevé, terminées par une courte pointe aiguë. Dents irrégulières, profondes, aiguës ; pétiole rouge à sa base ; stipules développées. Boutons petits, coniques, brun foncé avec extrémité duveteuse.

Variété de commerce, pour verger. Aime les terrains légers. Plus spécialement cultivée dans la Sarthe, le Nord, la Belgique, la Suisse.



Double bon pommier

Syn. : *Belle Fleur double* ; *Double Bon Ente* ; *Double Conente*.

5
4.281.871
4 87

Fruit surmoyen ou gros. Épiderme lisse, jaune clair, brillant, pointillé de gris, frappé de rouge vif, avec stries courtes ou petites plaques rouges. Pédicelle fort dans cuvette irrégulièrement arrondie, lavée de gris-brun. Œil mi-clos dans cuvette étroite, plissée, bordée de côtes inégales. Chair blanchâtre ou blanc-verdâtre, tendre, juteuse, sucrée, acidulée, peu parfumée ; assez bonne.

Arbre vigoureux, assez fertile. Rameaux forts, brun verdâtre. Lenticelles rondes, saillantes. Feuilles grandes, ovales arrondies, étalées, épaisses. Dents obtuses ou arrondies.


Variété de commerce, de la région du Nord.

Court-pendu rouge

Syn. : *Court-pendu plat* ; *Reinette de Capendu* ; *Garmons* ; *Wollaton Pippin*.

4.281.888

5 73



Fruit, moyen, aplati. Épiderme rugueux, jaune clair, abondamment lavé, marbré et strié de rouge-brun, fortement, pointillé de gris, taché de fauve vers le pédicelle. Pédicelle renflé à l'extrémité dans cuvette évasée. Œil ouvert dans cuvette un peu plissée ou unie. Chair jaunâtre, avec zone verdâtre, autour des loges, ferme, croquante, sucrée, acidulée, parfumée ; bonne.


Arbre vigoureux, de fertilité inconstante. Rameaux courts, brun-rougeâtre, mérithalles très courts. Lenticelles peu nombreuses, petites, arrondies. Yeux gros, arrondis, appliqués. Feuilles petites, arrondies, à pointe longue et arquée. Dents profondes. Fleurs tardives.

Variété de marché.

Nouvelle France

4.282.872


71



Fruit gros ou surmoyen, même en plein vent, asymétrique. Épiderme lisse, luisant, mince, jaune-paille, très largement coloré en rose et fortement garni de larges stries ; parsemé de quelques petits points gris ; peu ou pas maculé de brun clair autour du pédicelle. Pédicelle court, gros, renflé au sommet, dans cavité étroite, resserrée, à bord évasé et peu ondulé. Œil grand aux sépales mi-courts ; ouvert ou mi-ouvert, dans cavité moyennement profonde, large, ridée, et à bord ondulé. Chair très blanche, mi-fine, peu juteuse, tendre mais rigide, peu sucrée, peu acidulée, sans parfum. Assez bonne.

Arbre moyennement vigoureux, fertile. Rameaux moyens, olivâtres ; lenticelles rondes, peu nombreuses, saillantes. Yeux gros, un peu cotonneux. Boutons moyens, obtus. Feuilles ovales aiguës ou elliptiques, épaisses, rudes au toucher, vert foncé luisant, à bord ondulé ou légèrement relevé. Dents obtuses ou mi-aiguës, assez profondes.

Variété intéressante pour amateur et marché.



Crâvert

7 6
4.283.794
5 52 368
4 3


Fruits sous-moyens, coniques, attachés par 3 et 4. Épiderme lisse, mi-épais, résistant, jaune verdâtre, puis citrin clair, lavé de gris clair dans la cuvette du pédicelle ; frappé légèrement de rose clair uni ou à peine strié, assez régulièrement parsemé de points brun foncé bien apparents. Pédicelle court ou moyen, fort, renflé à l'extrémité dans cuvette peu ou moyennement profonde, mi-étroite, à bord peu ondulé. Œil petit ouvert ou mi-ouvert dans cuvette peu profonde, étroite, plissée, mamelonnée. Chair blanchâtre, croquante ou très ferme, avec zone et veine verdâtre, peu juteuse, sucrée, acidulée, parfumée ; pépins rares et petits. Assez bonne, crue ; très bonne, cuite.

Arbre d'assez faible vigueur, très fertile, étalé. Ne produit que tous les deux ans. Fructifie rapidement mais vieillit vite. Rameaux rougeâtres, très duveteux. Feuilles elliptiques ou ovales-aiguës, vert foncé, à pointe mi-courte, assez épaisses, mi-souples. Dents arrondies. Pétiole moyen, rougeâtre ; stipules étroites.

Variété de commerce, et deux fins (région du Cher). Convient au verger exclusivement. Sensible à la fumagine. Fleurit tardivement. Se plaît surtout dans les argiles à silex.

Grand'mère bronzée

6
4.284.551
11 47



Fruits moyens, réunis par 2, 3 ou 4. Épiderme assez mince, presque entièrement gris bronzé, abondamment pointillé de brun-clair, partiellement taché ou marbré de rouille.

Pédicelle moyen, fort et velu dans cuvette large. Œil assez grand, mi-clos, sépales grêles, assez longs, dans cuvette bien creusée, plissée, cernée de très fines côtes. Chair blanchâtre ou blanc-verdâtre, tendre ou mi-tendre, sucrée, acidulée, mi-juteuse. Bonne et de bonne conservation.

Arbre de vigueur suffisante, assez fertile. Rameaux moyens brun ardoisé. Lenticelles peu nombreuses, rondes. Yeux aplatis. Feuilles petites, creusées, à bord ondulé. Dents irrégulières, aiguës et accentuées. Stipules de moyenne longueur, étroites. Pétiole court. Variété de commerce.


Carrel

5 5
4.284.886
5 9 9
6



Fruit moyen, asymétrique. Épiderme lisse, épais, jaune-paille, rose et strié à l'insolation, largement lavé de fauve autour du pédicelle, parsemé de quelques points gris foncé. Pédicelle assez fort, court ou moyen, dans cuvette profonde, en entonnoir, à bord ondulé. Œil petit ou moyen, fermé ou mi-clos, dans cuvette moyennement profonde, mi-étroite, au bord un peu mamelonné. Chair blanc-verdâtre, ferme, sucrée, peu juteuse, aux loges moyennes et pépins petits, noirâtres. Bonne.

Variété pour verger ; cultivée dans le Pas-de-Calais.




Reinette Descardre

57 7
4.285.847
72 688
41 1

Fruits gros, attachés par 2 et 3. Épiderme épais, résistant, jaune foncé plus ou moins voilé de gris, parsemé de points gris, marbré ou lavé de fauve vers le pédicelle, frappé de rouge cuivré et légèrement strié. Pédicelle fort, dans cuvette à bord légèrement ondulé. Œil ouvert dans cuvette large, de profondeur variable, plissée. Chair jaunâtre avec zone verdâtre, mi-tendre, sucrée, acidulée, juteuse, très parfumée ; très bonne.

Arbre vigoureux, fertile. Rameaux longs, vert brunâtre. Lenticelles rondes, saillantes. Yeux ovoïdes, appliqués. Feuilles moyennes, rigides, vert foncé, planes. Dents grandes, profondes, aiguës. Boutons moyens, allongés.

Variété d'amateur et de marché, de bonne conservation. Convient pour formes basses. A tailler court.



Grand'mère

Syn. : *Grand'mère jaune d'Angers*.

94 6 1
4.287.793
55 3 4
61

Fruit surmoyen. Épiderme mi-épais parcheminé, jaune clair, mi-lisse, parsemé de points roux anguleux, un peu voilé de roux clair, nuancé ou non de rose, lavé ou largement maculé de brun clair vers le pédicelle. Pédicelle moyen ou assez court, fort ou mi-grêle, dans cuvette étroite. Œil mi-clos dans cuvette plissée ou un peu

côtelée ; sépales grêles et longs. Chair blanche, mi tendre ou assez ferme, suffisamment juteuse ; bonne, crue ou cuite.


Arbre très vigoureux, érigé, moyennement fertile. Rameaux moyens, gris-ardoise. Lenticelles rondes, saillantes, peu nombreuses. Yeux petits, très appliqués. Feuilles moyennes, planes, souples, bien nervées. Dents irrégulièrement profondes, obtuses ; pétiole grêle et violacé ; stipules assez petites et étroites.

Variété de marché ; de bonne conservation ; pour verger. Cultivée en Indre-et-Loire.

Bon Pommier

Syn. : *Bon Pommier d'hiver* ; *Belle Fleur simple* ; *Bonne Ente* ; *Franc bon pommier* ; *Petit bon pommier*.


5
4.287.877
7 7 3



Fruit moyen. Épiderme vert clair, marbré de fauve vers le pédicelle, garni de nombreux petits points blanchâtres, lavé et strié de rouge à l'insolation. Pédicelle fort dans cuvette large. Œil ouvert dans légère cuvette étroite et régulière. Chair blanchâtre, souvent veinée de verdâtre ; ferme ou mi-tendre, sucrée, acidulée, juteuse ; bonne.

Arbre moyennement vigoureux, étalé, moyennement fertile. Rameaux assez nombreux, mi-grêles, brun clair. Lenticelles peu nombreuses, grandes, arrondies. Yeux petits, appliqués. Feuilles moyennes à longue pointe. Dents profondes.

Variété de marché, de verger ; à greffer en tête pour hautes tiges et sur doucin pour moyennes formes.



Belle Fille normande


Syn. : *De Damoiselle*.

155
4.294.361
361 79

Fruit gros, asymétrique souvent terminé en pointe comme Calville de Boskoop, mais plus tardive, d'un jaune plus foncé et frappée de rose. Épiderme lisse, mince, parcheminé jaune citrin foncé brillant, lavé de brun autour du pédicelle et veiné de même au pourtour, partiellement rosé et parsemé de quelques points roux. Pédicelle court ou moyen, grêle, dans cavité étroite et profonde. Œil petit, resserré, sépales longs, dans cuvette étroite, peu ou moyennement profonde et côtelée au pourtour. Chair blanche, tendre, finement veinée de verdâtre, acidulée, juteuse ; assez grandes loges, pépins moyens, bruns. Bonne.

Arbre vigoureux, assez fertile. Rameaux jaunâtres, de moyenne grosseur. Lenticelles rondes, blanches, débordantes. Yeux arrondis ; stipules fines. Feuilles ovales-allongées au bord ondulé, vert franc brillant, rigides ; dents profondes, aiguës ; pétiole long, rougeâtre.

Variété de marché, d'amateur, à deux fins.



Calville blanc

Syn. : *Calville blanche* ; *Calleville* ; *Calville blanche d'hiver* ; *Calville à côtes* ; *Bonnet carré*.

1 16
4.294.751
5 65 327

Fruits gros ou surmoyens, souvent attachés par 2 et 3. Épiderme mince, lisse, jaune citrin, finement ponctué de gris, lavé de brun vers le pédicelle, frappé fréquemment mais partiellement

de rose vif. Pédicelle grêle, dans cuvette élargie, à bord fortement ondulé. Œil mi-clos, ou mi-ouvert, dans cuvette étroite, entourée de fortes côtes. Chair blanchâtre, tendre, sucrée, juteuse, parfumée ; loges moyennes ; pépins moyens, noirâtres. Très bonne.


Arbre vigoureux, mi-érigé, très fertile. Rameaux longs, forts, brun grisâtre. Lenticelles peu nombreuses, rondes. Yeux assez gros, aplatis. Feuilles moyennes, vert pâle, à bord un peu relevé, épaisses mais assez souples. Dents obtuses. Fleurs grandes, rosées hâtives.

Variété de commerce ; sensible au puceron lanigère et à la tavelure ; pour petites formes et espaliers.

Doux d'Argent

Syn. : *Doux d'Angers* ; *d'Ève* ; *Ostogate*.


3 6
4.295.381
67 7



Fruits moyens, attachés souvent par 2, aplatis et finement côtelés. Épiderme lisse, mince, jaune clair, parsemé de quelques points bruns ou gris foncé, lavé de brun vers le pédicelle, parfois veiné de même au pourtour ou teinté de rose à l'insolation. Pédicelle pubescent, tantôt gros et court, tantôt grêle et moyen, dans cuvette large, ondulée. Œil moyen et clos ; sépales assez longs dans cuvette étroite, plissée, au contour finement côtelé. Chair très blanche, tendre, veinée de jaunâtre, mi-acidulée ; loges larges ; pépins gros et larges. Assez bonne.

Arbre vigoureux, très fertile. Rameaux gros, courts, vert brunâtre. Lenticelles peu nombreuses, petites. Yeux coniques appliqués. Feuilles moyennes. Dents grandes, arrondies. Boutons ovoïdes. Fleurs moyennes, de moyenne saison.

Variété d'amateur et à deux fins ; pour verger et toutes formes naines.



Calville de Saint-Sauveur


Syn. : *Calville Saint-Sauveur* ; *Reinette Saint-Sauveur*.

1
4.361.752
25 63
9

Fruit moyen ou assez gros finement côtelé. Épiderme mince, jaune clair, parsemé de points gris à l'ombre et rougeâtre au soleil ; frappé de rouge plus ou moins foncé violacé, uni. Pédicelle assez fort dans cuvette étroite, irrégulière, un peu maculée de gris. Œil assez petit aux sépales longs, mi-clos, dans cuvette étroite, cernée de petites côtes. Chair blanchâtre, fine, demi-tendre, légèrement acidulée et faiblement parfumée ; bonne.

Arbre vigoureux, fertile. Rameaux moyens, brun-rosé. Lenticelles moyennement nombreuses, petites, rondes. Yeux courts, appliqués. Feuilles moyennes, ovales, planes, vert franc, un peu creusées, mi-épaisses. Dents mi-aiguës. Boutons moyens, cotonneux.

Variété d'apparat ; à cultiver en petites formes ; mais réussit aussi à haute tige.



Calville rouge d'hiver

Syn. : *Calville rouge* ; *Calville musquée* ; *Passe pomme d'hiver*.

5 8 2
4.364.961
23 739

Fruits gros ou surmoyens, ordinairement isolés, rarement par 2. Épiderme à fond jaune pâle maculé de roux vers le pédicelle, presque entièrement teinté de rouge clair, frappé

de rouge foncé à l'insolation, ponctué de gris blanchâtre. Pédicelle grêle, dans cuvette ondulée. Œil clos à longs sépales dans cuvette côtelée et plissée. Chair blanche plus ou moins rosée, fine, tendre, juteuse, sucrée, acidulée, parfumée ; assez bonne crue et bonne cuite.


Arbre moyennement vigoureux, très fertile. Rameaux longs, gros, brun rougeâtre. Lenticelles peu nombreuses, allongées. Yeux moyens, coniques, appliqués. Feuilles elliptiques terminées en pointe, vert clair. Dents grandes, obtuses. Boutons gros, cotonneux, allongés, pointus.

Variété de commerce ; pour verger ; même pour montagne.

De l'Estre

Syn. : *Reinette de Brive ; de Comte ; Sainte-Germaine.*


221 36
4.385.683
5 137 778
92
6



Fruits moyens attachés par 1 ou par 2. Épiderme épais lisse, jaune citrin, lavé ou marbré de fauve ou de roux autour du pédicelle, souvent voilé de même au pourtour, irrégulièrement parsemé de points anguleux, gris foncé à l'ombre et rouges au soleil ; parfois lavé de rose carminé. Pédicelle assez gros, dans cuvette mi-étroite. Œil clos, dans cuvette peu profonde, côtelée ou mamelonnée. Pépins petits, bruns, dans loges étroites et allongées. Chair blanchâtre mi-ferme ; un peu cassante, juteuse, parfumée, acidulée, sucrée ; bonne et de très bonne conservation.

Arbre de vigueur et de fertilité moyennes. Rameaux moyens assez longs, vert brunâtre. Lenticelles assez nombreuses, petites, saillantes. Yeux coniques. Feuilles moyennes, épaisses rigides, plissées, étalées, vert franc. Dents arrondies, petites. Pétiole de 2 centimètres. Boutons moyens, coniques.

Variété de marché ; rustique ; de bonne conservation pour le verger.



Fleiner du roi


Syn. : *Königs Fleiner*.

6 6
4.392.771
167 2 2

Fruits gros ou assez gros, attachés par 1 ou par 2 ; tombant facilement à terre. Épiderme lisse mince, jaune-citrin, un peu maculé de brun clair vers le pédicelle, légèrement veiné ou non de gris, frappé ou non de rouge foncé terne, parsemé de quelques points gris. Pédicelle gros, court, dans cuvette peu profonde, étroite, à bord plus ou moins uni. Œil grand, mi-ouvert ou clos dans cuvette plus ou moins profonde, étroite, plissée et côtelée. Chair blanchâtre, tendre, peu juteuse, sans saveur spéciale, à zone verdâtre, peu sucrée, pépins courts, bruns, dans loges assez grandes.

Arbre vigoureux, moyennement fertile. Rameaux gros, brun olivâtre. Lenticelles arrondies ou mi-allongées, blanchâtres, un peu saillantes. Feuilles ovales-allongées, assez grandes, mi-rigides, à bord un peu tourmenté ; dents peu profondes, mi-aiguës. Bouton court.

Variété d'amateur.



Api

Syn. : *Api fin* ; *Api rouge* ; *Petit Api rose*.

5
5.215.734
4 27 6

Fruits petits aplatis, groupés par 2 ou 3. Épiderme lisse, luisant, blanchâtre, abondamment teinté de rouge vif. Pédicelle grêle dans cuvette régulière, ondulée. Œil fermé dans cuvette large, plissée et souvent maculée de gris. Chair blanche, cassante, mi-juteuse, sucrée, légèrement acidulée ; bonne.


Arbre moyennement vigoureux, érigé, très fertile. Rameaux grêles, brun foncé. Lenticelles allongées. Yeux assez gros, appliqués. Feuilles petites, elliptiques-allongées, planes. Dents obtuses. Boutons petits, pointus. Fleurs moyennes, rosées, tardives.

Fruit d'amateur et d'apparat, pour moyennes et petites formes.

Reinette de Caux

Syn. : *Mignonne de Hollande* ; *Reinette de Cassel* ; *Paternoster* ; *de Laak*.


5 3
5.215.828
4 44 54



Fruits moyens attachés par 1, 2 ou 3. Épiderme épais jaune d'or ou citrin, lavé de gris fauve vers le pédicelle ou même aux deux extrémités, parsemé de gros points gris ; plus ou moins lavé de rose et strié de carmin. Pédicelle mi-grêle, dans cuvette évasée. Œil mi-ouvert, dans cuvette large, ondulée ou plissée. Chair jaunâtre, cassante, sucrée, acidulée, juteuse, parfumée ; loges moyennes ; pépins gros, larges, brun rougeâtre. Très bonne.

Arbre très vigoureux, érigé, très fertile. Rameaux longs, mi-grêles, brun rougeâtre, légèrement coudés. Lenticelles nombreuses, petites, rondes. Yeux moyens, aplatis. Feuilles moyennes, ovales, à pointe mi-courte, étalées, plissées, épaisses, vert clair. Dents assez profondes, aiguës ou obtuses. Boutons moyens, ovoïdes, aigus, brun-clair. Fleurs moyennes, rosées, mi-tardives.

Variété de commerce ; toutes formes, haute tige de préférence ; convient au verger et en avenues ; de longue conservation.



Rome's Beauty


Syn. : *Beauté de Rome* ; *Belle de Rome*.

5 1
5.215.852
47 27
2

Fruits gros, ovoïdes. Épiderme mince, lisse, jaune d'or, teinté de rose sur une moitié avec stries plus foncées, parsemé de quelques rares points gris. Pédicelle grêle, moyen ou long, dans cuvette plus ou moins profonde, étroite ou large, à bord ondulé. Œil moyen, clos, dans cuvette peu profonde, plissée, à bord légèrement côtelé, sépales longs et grêles. Chair blanchâtre avec zone jaunâtre, mi-tendre, peu ou mi-juteuse sucrée, non acidulée ; assez bonne.

Arbre très vigoureux, moyennement fertile. Rameaux peu nombreux plutôt courts, brun-olivâtre-rougeâtre. Lenticelles arrondies peu nombreuses. Yeux très gros, s'écartant du rameau. Feuilles moyennes, ovales-arrondies, vert foncé, rigides ; dents profondes ; pétiole court, gros.

Variété pour amateur ; à greffer en tête pour hautes tiges, convient aussi pour petites formes.



La Nationale

Syn. : *Cusset rouge* ; *Bernardin* ; *Bourget* ; *Déesse nationale*.

6
5 9
5.215.853
4 87 968
2 8

Fruits assez gros, isolés ou par 2. Épiderme lisse, mi-mince, résistant, jaune verdâtre à l'ombre et jaune doré au soleil ;

garni de gros et nombreux points roses ou blanchâtres ; lavé de roux clair vers le pédicelle, presque entièrement rouge foncé ou brique luisant avec ou sans stries, le tout légèrement pruiné. Pédicelle court ou moyen, dans cuvette plus ou moins étroite à bord régulier. Œil mi-clos, à forts sépales dans cuvette plissée. Chair blanche ou blanchâtre, ferme, non cassante, veinée de vert, sans saveur ou à peine parfumée ; loges moyennes, pépins nombreux moyens ; assez bonne ou médiocre.

Arbre vigoureux, mi-étalé, assez fertile. Rameaux moyens, brun foncé ; mérithalles longs. Lenticelles peu nombreuses, petites, rondes. Yeux petits. Feuilles grandes, elliptiques, gaufrées, épaisses, vert foncé. Dents assez aiguës. Boutons ovoïdes. Floraison tardive.

Variété de marché ; de verger et de montagne ; sol même nu peu frais.


Prince Impérial


5.217.79

Fruit moyen. Épiderme lisse, jaune, lavé de rouge vif uni. Pédicelle fort, dans cuvette étroite à bord presque uni. Œil clos, à longs sépales, dans cuvette plissée.

Arbre de bonne vigueur, assez fertile. Rameaux moyens brun foncé. Lenticelles petites, rondes. Yeux moyens. Feuilles moyennes, elliptiques, plissées. Dents aiguës ou obtuses. Boutons gros, ovoïdes, cotonneux.

Variété d'amateur.





Reinette de Dieppedalle


Syn. : *Reinette Grise de Rouen*.

62
5.221.533
4 55 76

Fruits attachés par 2 et 3, moyens, tantôt sphériques, tantôt un peu coniques, bosselés au sommet. Épiderme mi-épais, résistant, à fond jaune, moyennement pointillé et plus ou moins recouvert de roux bronzé parfois un peu frappé de rose. Pédicelle assez long ou moyen, grêle, un peu renflé à son extrémité, dans cuvette évasée, à bord presque uni. Œil petit, clos, sépales assez longs, dans cuvette étroite, assez profonde, rarement superficielle, plissée si non côtelée. Chair blanche, rarement blanc-verdâtre, fine, ferme, sucrée, acidulée, un peu parfumée ; bonne.

Arbre assez vigoureux, assez fertile. Rameaux mi-grêles, assez longs, brun violacé. Lenticelles peu nombreuses, petites, rondes et longues. Yeux allongés, plats. Feuilles moyennes, elliptiques, planes, lisses et peu rigides, vert foncé. Dents moyennes, obtuses ou arrondies. Boutons courts.

Variété de marché et à deux fins ; pour le verger, mais s'accommodant des petites formes qu'il convient de tailler assez long. Craint la tavelure.



Bohnapfel

Syn. : *Pomme Haricot*.

3 4
5.222.856
357 65
9

Fruits moyens ou surmoyens. Épiderme lisse, mi-mince, résistant, jaune clair, pointillé de gris clair, teinté de rose plus ou moins foncé et finement marqué de quelques menues stries. Pédicelle fort ou

charnu dans cuvette peu profonde, étroite, rouillée, à bord régulier. Œil moyen à longs sépales, mi-clos, dans cuvette mi-étroite, peu profonde, à bord légèrement ondulé. Chair blanc verdâtre ferme, un peu cassante, juteuse, mi-fine, peu sucrée, légèrement parfumée ; loges assez vastes ; pépins allongés ; assez bonne, crue ou cuite ; bonne pour le cidre.


Arbre moyennement vigoureux, mi-érigé, fertile, rustique. Rameaux nombreux, forts, longs, brun rougeâtre ardoisé. Yeux gros, appliqués. Feuilles ovales arrondies, vert foncé, gaufrées. Dents arrondies, peu profondes.

Variété de marché, de verger et pour plantations sur routes ; fructifiant assez tôt ; résistant à la tavelure. Cultivée en Suisse allemande.

Vérité

Syn. : *De Vérité*.


16 8
5.222.894
43 63
4



Fruit moyen. Épiderme épais, résistant, lisse, jaune citrin assez clair, fauve vers le pédicelle, lavé de rose ou de rouge sombre avec stries peu accentuées à l'insolation. Pédicelle court et quelquefois moyen, dans cuvette évasée, à bord uni. Œil fermé ou mi-ouvert, dans cuvette étroite. Chair très blanche, souple, mais un peu croquante, peu juteuse, peu sucrée, aux loges petites, pépins moyens, brun foncé ; assez bonne ou médiocre.

Arbre moyennement vigoureux, fertile. Rameaux gris verdâtre, Lenticelles peu nombreuses, petites, rondes. Yeux assez gros, appliqués. Feuilles moyennes, ovales ou elliptiques, planes, à pointe aiguë, souples, vert foncé. Dents aiguës. Boutons petits, arrondis, pubescents.

Variété d'amateur ; de verger.



Calville d'Angleterre


Syn.: *Cornish Gilly flower* ; *July Flower*; *Regalans*.

83 72
5.225.858
54 98
4

Fruits surmoyens, souvent attachés par 2, 3 ou 4. Épiderme lisse, mince, jaune foncé, teinté de brun vers le pédicelle, parsemé de petits points brun clair, fortement teinté de rouge et strié de rouge terne. Pédicelle grêle, renflé à l'extrémité dans cuvette large, à bord ondulé. Œil mi-clos, à grandes sépales dans cuvette large, côtelée. Chair jaunâtre, ferme, ou mi-ferme, sucrée, un peu acidulée, légèrement parfumée, loges moyennes, pépins allongés, moyens. Bonne ou très bonne.

Arbre vigoureux, mi-érigé, très fertile. Rameaux moyens, ou forts, droits, brun verdâtre ou brun rougeâtre. Lenticelles assez nombreuses, grosses, rondes, saillantes. Yeux moyens, appliqués. Feuilles moyennes, ovales-arrondies à pointe courte, épaisses, plissées, vert foncé. Dents profondes, aiguës. Pétiole gros, velu.

Variété de marché ; de très longue conservation ; à cultiver en vase sur Doucin ou Paradis.



Gendreville

17 8
5.225.875
4 354 952

Fruit moyen. Épiderme lisse, mi-épais, brillant, à fond jaune-paille, parsemé de points jaunâtres, taché de fauve autour du pédicelle, frappé presque entièrement de rouge, carminé foncé à l'insolation avec quelques menues stries. Pédicelle fort, dans cuvette mi-étroite. Œil mi-ouvert, dans cuvette assez étroite et côtelée. Chair blanche avec zone verdâtre


ou veinée de vert, tendre, ou mi-ferme, mi-juteuse, un peu sucrée, mi-acidulée, légèrement parfumée ; assez bonne.

Arbre de vigueur modérée, assez fertile. Rameaux sous-moyens. Lenticelles grises, rondes. Yeux courts, arrondis. Feuilles ovales terminées en pointe, planes, un peu plissées. Dents obtuses. Boutons petits, blanchâtres. Fleurs moyennes, très tardives.

Variété de marché et à deux fins ; de longue conservation ; convient pour verger.

Double Rose

Syn. : *Api gros* ; *Api double* ; *Dieu* ; *Rose* ; *Rubis* ; *Vermillon* ; *Poma rosa*.




53 8
5.241.764
14 5
2 7

Fruits moyens ou sous-moyens, souvent par 2. Épiderme jaune-paille, lisse, mi-mince, brillant, lavé de roux-verdâtre vers le pédicelle, parsemé de points jaunâtres, presque entièrement frappé de rouge vif. Pédicelle mi-grêle, dans cuvette régulière, mi-profonde, assez étroite. Œil clos, dans cuvette à peine plissée ou ondulée, sépales assez longs. Chair blanche, fine, mi-tendre, moyennement juteuse, sucrée, un peu acidulée, légèrement parfumée ; pépins assez petits, brun clair ; loges petites. Assez bonne ou bonne.

Arbre moyennement vigoureux, assez érigé, très fertile. Rameaux moyens, rouge-brun. Lenticelles moyennement nombreuses, arrondies ou allongées. Yeux petits, coniques, appliqués. Feuilles petites ou moyennes, elliptiques, planes, souvent un peu arquées. Dents lâches.

Variété d'amateur, mais surtout de marché.


Sturmer's PippinSyn. : *Pépin de Sturmer.*

17 2
5.244.658
55 484

Fruits sous-moyens, par 1 ou 2. Épiderme rude, mi-épais, parcheminé, jaune clair, nuancé de gris verdâtre autour du pédicelle, maculé de brun et un peu ponctué de gris, parfois frappé de rose à l'insolation. Pédicelle moyen, charnu ou grêle, renflé à son extrémité, dans cuvette à bord plus ou moins ondulé. Œil fermé ou mi-clos, sépales longs et forts, dans cuvette peu profonde, bosselée ou plissée. Chair blanchâtre ou jaunâtre, légèrement veinée de verdâtre, ferme, croquante, sucrée, douce ; loges assez vastes, pépins gros, brun-foncé. Bonne.

Arbre moyennement vigoureux, assez fertile. Rameaux nombreux, grêles, longs, coudés. Lenticelles peu nombreuses, rondes ou allongées. Yeux gros, ovoïdes ou obtus, appliqués, Feuilles moyennes, elliptiques, parfois plissées, minces, légèrement creusées. Dents arrondies. Boutons gros, allongés ou ovoïdes aigus.

Variété pour amateur ; toutes formes.

Bonne de MaiSyn.: *Bay ; Drap d'or ; de Bonnefond ; d'or ; Rador ; Reinette marbrée.*

45 991
5.251.873
4 312 688
4 57

Fruits moyens, légèrement asymétriques attachés par 2 et 3. Épiderme mi-lisse, mi-mince, parcheminé, mi-brillant, jaune-paille, parsemé de points blanchâtres ou gris, lavé de gris vers l'œil et le pédicelle, largement frappé de rouge

foncé, à peine strié et comme recouvert d'une marbrure de rouille. Pédicelle renflé à son extrémité dans cuvette étroite, régulière. Œil presque fermé, dans cuvette étroite, légèrement bosselée ou plissée. Chair blanchâtre, mi-tendre, légèrement veinée de verdâtre, juteuse, sucrée, peu acidulée, légèrement parfumée ; bonne.


Arbre vigoureux, fertile. Rameaux abondants, mi-étalés, gros, courts, brun ardoisé. Lenticelles peu nombreuses, rondes ou elliptiques, petites. Yeux petits, courts. Feuilles moyennes, ovales-elliptiques, épaisses, étalées, un peu plissées. Dents mi-aiguës ou arrondies.

Variété d'amateur ; pour le verger ; s'accommodant de toutes formes. Cultivée en Bretagne.

Reinette verte


Syn. : *Reinette très tardive*.

5.252.387



Fruit moyen ou surmoyen, tronconique ou légèrement cylindrique. Épiderme lisse, mi-mince, parcheminé, vert herbacé puis jaune citrin, lavé de gris verdâtre autour du pédicelle ; parsemé d'assez gros points gris de forme irrégulière. Pédicelle court ou très court, fort, arqué, dans cuvette large et moyennement profonde. Œil moyen à sépales longs et grêles, fermé, dans cuvette large et moyennement profonde, souvent plissée. Chair jaunâtre ou verdâtre, un peu veinée de vert, fine, mi-tendre, un peu musquée à maturité, juteuse, acidulée, sucrée. Assez bonne ou bonne.

Arbre vigoureux étalé et suffisamment fertile. Rameaux peu nombreux, un peu étalés, gros, brun plus ou moins foncé. Lenticelles rondes, saillantes. Yeux gros, allongés, plus ou moins appliqués, cotonneux. Feuilles grandes ou très grandes, ovales-allongées, ou elliptiques, assez larges, mi-rigides, à courte pointe, plissées mais planes ; dents grandes assez aiguës ; pétiole court et fort. Variété pour amateur ; à cultiver à haute tige ; peut être greffée au pied.

Royal Russet


Syn. : *Reinette grise royale* ; *Roussette royale* ; *Passe-pomme du Canada*.

47 94
5.252.663
4 21 578

Fruit moyen. Épiderme mi-épais, jaune verdâtre, assez fortement marbré ou voilé de fauve, y compris le tour du pédicelle, parsemé de quelques petits points gris clair; légèrement frappé ou non de rouge brun terne. Pédicelle fort ou mi-grêle dans cuvette large ou mi-étroite. Œil mi-clos, à longs sépales dans cuvette mi-étroite, plissée, légèrement bosselée. Chair blanchâtre ou blanc jaunâtre, ferme, un peu croquante, sucrée, parfumée ; gros pépins brun foncé. Bonne crue, très bonne cuite.

Arbre vigoureux, fertile. Rameaux gros, longs, coudés, brun-rougeâtre. Yeux gros, ovoïdes-obtus, un peu écartés. Feuilles grandes, ovales, vert brillant. Dents profondes.

Variété d'amateur ; pour toutes formes.

**Chasseur de Menznau**

Syn. : *Menznauer Iäger apfel* ; *Belle fleur rouge (en Suisse)*.

8
5.252.875
4 21 8

Fruit moyen. Épiderme mi-épais, lisse, jaune-verdâtre, parsemé de petits points, plus ou moins teinté de rose, strié de rouge. Pédicelle fort, dans large cuvette, à bord ondulé. Œil clos à forts sépales, dans large cuvette, à bord accidenté ou un peu côtelé. Chair blanchâtre, mi-tendre, montrant une zone verdâtre, sans saveur, ni parfum spéciaux ; loges moyennes ; pépins petits, brun foncé. Assez bonne ou bonne.


Arbre vigoureux, mi-étalé, fertile. Rameaux gros, courts, duveteux. Lenticelles peu nombreuses. Yeux moyens, appliqués. Feuilles allongées, un peu tourmentées ou plissées. Dents profondes.

Variété à deux fins ; de marché ; de très longue conservation.

Reinette grise de Saintonge

Syn. : *Reinette Haute Bonté* ; *Haute bonne* ; *de Saintonge*.


4 2
5.254.548
4 321 67
5



Fruits moyens ou assez gros, attachés par 2. Épiderme Pédicelle moyen, fort, renflé à l'extrémité, dans cuvette étroite, profonde, à bord ondulé. Œil grand, aux sépales mi-longs dans cuvette mi-large, plissée. Chair jaune verdâtre, veinée de vert, ferme et croquante, sucrée, assez juteuse, d'un goût légèrement anisé ; loges petites ; pépins petits, bombés, bruns. Très bonne.

Arbre vigoureux, érigé, moyennement fertile. Rameaux moyens, vert grisâtre. Lenticelles peu nombreuses, petites, rondes, saillantes. Yeux larges, courts. Feuilles petites, elliptiques, épaisses, vert foncé, luisantes, gaufrées. Dents aiguës. Bouton petit ou moyen, ovoïde, aigu. Fleurs grandes, rosées, de moyenne saison.

Variété d'amateur et de marché ; convient aux vergers ; fruit de bonne conservation.


**Cartaut**

9
5.254.733
4 65 35
8

Fruits gros ou très gros. Épiderme demi-mince, lisse, parcheminé, jaune-citrin, parsemé de petits points gris, lavé de gris verdâtre vers le pédicelle, frappé de rose plus ou moins foncé. Pédicelle fort, dans cuvette large à bord ondulé. Œil mi-ouvert dans cuvette étroite, fortement plissée ou côtelée. Chair blanche ou blanchâtre avec parfois une zone verdâtre, assez ferme, peu juteuse ; médiocre.

Arbre vigoureux, érigé, très fertile, fructifiant tous les ans. Rameaux grêles, noirâtres. Mérithalles allongés. Lenticelles petites, rondes. Feuilles ovales allongées, vert foncé, planes, épaisses, à bord légèrement ondulé, à pointe aiguë, profondes, arrondies. Dents peu profondes

Variété de commerce ; pour le verger, même en montagne. Cultivée dans le Puy-de-Dôme.

**Teint frais**

Syn. : *Kerlivio*.

7
5.255.673
4 24 64

Fruits surmoyens ou gros, attaché par 2 ou 3. Épiderme lisse, parcheminé, jaune-citrin, parsemé de quelques petits points fauves, marbré de roux y compris le tour du pédicelle, frappé de rose vif foncé. Pédicelle fort, renflé à l'extrémité, dans cuvette mi-étroite. Œil fermé à forts et longs sépales, dans cuvette large et plissée. Chair blanche, assez ferme, un

peu veinée de jaune, mi-juteuse, sucrée, acidulée ; bonne.


Arbre très vigoureux, mi étalé, fertile. Rameaux longs, forts, brun olivâtre. Lenticelles peu nombreuses, rondes, saillantes. Yeux moyens, appliqués. Feuilles abondantes, grandes, ovales, arrondies, épaisses, vert foncé, luisantes, rigides et un peu creusées. Dents moyennes, régulières, mi-aiguës. Pétiole gros et court. Boutons petits, ovoïdes, obtus, duveteux.

Variété d'amateur, pour petites formes.

De Jaune

Syn. : *Pomme d'argent*; *Reinette du Mans*.


24 8
5.257.393
4 45 264



Fruits moyens ou sous-moyens, souvent réunis par 2 ou 3. Épiderme mince, lisse, résistant, jaune citrin, ou clair, doré au soleil, pointillé de roux, lavé de gris vers le pédicelle. Pédicelle fort, renflé à l'extrémité, dans cuvette large. Œil ouvert, dans cuvette large, légèrement côtelée. Chair blanche, ferme, cassante, mi-fine, sucrée, parfumée ; bonne.

Arbre moyennement vigoureux, mi-étalé, fertile. Rameaux flexibles, retombants, duveteux, gris-brun. Lenticelles peu nombreuses, rondes. Yeux moyens, courts, appliqués. Feuilles moyennes, elliptiques, aiguës, épaisses, gaufrées, vert foncé. Dents peu profondes, aiguës. Boutons ovoïdes, rougeâtres, duveteux. Fleurs moyennes ou petites, tardives.

Variété de commerce, de table, à deux fins, pour verger. Sensible à la fumagine.

Rose de Benaue


Syn. : *Rose de mai* ; *Rose tendre* ; *Rose de Hollande, de Cadillac* ; *Dieudonné*.

15 6
5.257.751
4 44 683

Fruit moyen. Épiderme lisse, jaune clair parfois veiné de brun, frappé de rouge vif. Pédicelle moyen dans cuvette large, à bord régulièrement ondulé. Œil clos ou mi-clos, dans cuvette étroite. Chair blanche, ferme, sans saveur ni parfum spéciaux; assez bonne.

Arbre vigoureux, fertile. Rameaux moyens, brun-rougeâtre foncé. Lenticelles nombreuses, allongées, saillantes. Yeux larges. Feuilles elliptiques, vert foncé, à bord ondulé, plissées, parfois arquées. Dents obtuses ou aiguës.

Variété de commerce ; pour plein vent.

**Belle de Magny**

8 4
5.257.884
4 42 973

Fruits moyens, attachés par 2 ou 3. Épiderme mince, lisse, résistant, blanchâtre ou jaune clair, largement bronzé vers le pédicelle, parsemé de menus et irréguliers points gris ou jaunâtres ; teinté de rose vif, puis de rouge vif et faiblement strié de rouge. Pédicelle grêle, dans cuvette étroite et irrégulière. Œil grand, mi-clos, aux sépales assez développés, dans cuvette plissée, à bord ondulé plus ou moins oblique. Chair blanche, assez tendre, mi-fine, juteuse ; légèrement acidulée ; loges faibles ; pépins peu nombreux brun-rougeâtre. Médiocre ou assez bonne.


Arbre suffisamment vigoureux, étalé, fertile. Rameaux moyens, brun rougeâtre. Lenticelles ovales ou rondes, saillantes ;

yeux arrondis ; appliqués. Feuilles assez grandes, ovales, mi-épaisses, vert brillant. Dents profondes, mi-aiguës. Boutons courts, obtus.

Variété régionale à deux fins ; de très longue conservation ; pour le verger.

Reinette Daniel

5.262.288
4 5 35




Fruits moyens attachés par 2, un peu obliquement tronqués, côtelés surtout au sommet. Épiderme jaune foncé presque unicolore ou à peine taché de roux. Pédicelle grêle ou charnu, dans cuvette mi-évasée, à bord ondulé. Œil moyen ou assez grand, fermé, dans cuvette fortement côtelée. Chair jaunâtre, assez ferme, juteuse, bonne.

Arbre de bonne vigueur. Rameaux brun-gris. Lenticelles rondes. Yeux gros. Feuilles elliptiques, un peu allongées, vert foncé, lisses. Dents aiguës ou obtuses. Pétiole rose violacé, fort.

Variété d'amateur.

Gros Locard

1
57 27
5.264.351
4 95 785
2 8



Fruit moyen ou surmoyen. Épiderme mince, lisse, quelquefois visqueux ; tantôt vert jaunâtre unicolore, parsemé de points blanchâtres peu apparents, parfois jaune-citrin, parsemé de quelques points verts, gris ou rouges, et frappé de rose, rarement strié à l'insolation, maculé

de roux vers le pédicelle. Pédicelle fort, dans cuvette large, régulière. Œil plus ou moins grand, mi-clos, aux sépales forts et grêles, dans cuvette plissée à bord ondulé ou côtelé. Chair blanc-verdâtre dans le type vert, ou blanchâtre dans le type bicolore, tendre, acidulée, mi-sucrée, juteuse, peu parfumée ; assez bonne.

Arbre vigoureux, étalé, très fertile. Rameaux longs, gros, brun verdâtre ou ardoisé. Lenticelles nombreuses, assez grandes, arrondies. Yeux larges et plats. Feuilles moyennes, épaisses, plissées, un peu creusées, vert foncé. Dents irrégulières, mi-aiguës. Fleurs moyennes, très tardives.

Variété de marché et à deux fins ; pour le verger. Le type bicolore est nettement supérieur au type vert.


Ontario

5 697

5.264.758

4 31 863

9



Fruits gros, réunis par 2, 3 ou 4. Épiderme mince, lisse, résistant, jaune citrin, parfois un peu veiné de gris, parsemé de points gris clair, maculé de fauve verdâtre vers le pédicelle, d'abord teinté de rouge terne violacé, puis de rouge plus ou moins abondant et vif avec pruine et stries fines, entrecoupées et atténuées. Pédicelle mi-grêle ou grêle dans cuvette large, et à bord ondulé. Œil moyen, mi-clos, dans cuvette plus ou moins étroite, plissée et à bord un peu mamelonné. Chair blanchâtre ou jaunâtre avec légère zone et veines verdâtres

ou jaunâtres, mi-tendre, juteuse, acidulée, légèrement sucrée, loges moyennes ; pépins moyens, bombés, bruns. Assez bonne.


Arbre de vigueur normale, bien fertile. Rameaux mi-grêles, brun-gris ou olivâtres. Lenticelles peu nombreuses, arrondies ou ovales. Yeux larges, appliqués. Feuilles moyennes, ovales, terminées en une pointe courte, très rigides, plissées, légèrement creusées en gouttière, vert gai. Dents fortes, aiguës ou obtuses. Pétiole fort, duveteux. Boutons allongés. Fleurs blanches, de moyenne saison.

Variété d'amateur, d'apparat, fruit de longue conservation, ne ridant pas ; à cultiver de préférence en formes naines.

Calville du Roi

Syn. : *Citron d'hiver* ; *Pomme blanc* ; *De Londres*.

9
2 35
5.265.747
4 37 22
8
6



Fruits moyens, souvent par 2. Épiderme mince, lisse, luisant, jaune citrin, maculé de fauve vers le pédicelle, frappé de rouge vif à l'insolation ; parsemé de rares petits points gris. Pédicelle grêle dans cuvette large à bord à peine ondulé. Œil moyen ou assez grand, mi-clos ou clos, dans cuvette bien côtelée. Chair jaunâtre avec zone verdâtre, mi-tendre ou ferme, juteuse, acidulée ; bonne ou assez bonne ; de bonne conservation.

Arbre de vigueur modérée, très fertile. Rameaux assez grêles, gris verdâtre. Lenticelles nombreuses, petites, arrondies. Yeux petits, appliqués. Feuilles petites, elliptiques, mi-souples, un peu creusées, vert foncé. Dents peu profondes, arrondies. Fleurs sous-moyennes, tardives.

Variété d'amateur et de marché ; un peu faible pour la haute tige ; préfère les formes naines avec Doucin comme porte-greffe. Cultivée en Indre-et-Loire.



Reinette dorée de Bœdiker

5.265.761

9



Fruits moyens, attachés par 2 et 3, aplatis, côtelés. Épiderme lisse, jaune doré, légèrement ponctué et fortement frappé de carmin. Pédicelle grêle, moyen, dans cuvette étroite, profonde, lavée de gris. Œil petit, fermé, dans cavité peu profonde, plissée.

Chair blanche ou blanchâtre, tendre, assez juteuse, sucrée ; bonne.

Arbre de vigueur et de fertilité moyennes. Rameaux moyens, brun ardoisé ou rougeâtre. Lenticelles rondes, mi-saillantes, peu abondantes. Yeux petits. Feuilles grandes, ovales, mi-rigides, plissées, vert franc luisant, un peu convexes. Dents moyennes, aiguës ou obtuses ; stipules petites. Bouton moyen, arrondi, un peu velu. Variété de marché et d'amateur.



Patte de loup

Syn. : *Pomme de loup* ; *Pocre de loup*.

6

5.282.578

4 7 6



Fruit moyen ou sous-moyen, asymétrique, plus développé d'un côté que de l'autre. Épiderme mi-rugueux, mince, entièrement brun-fauve nuancé de vert, ou sur fond jaune d'or, parfois frappé de rose cuivré ; parsemé de quelques petits points gris clair ; verdâtre dans la cuvette du pédicelle. Pédicelle très court, charnu, dans cuvette moyennement profonde, assez étroite, à bord ondulé. Œil grand, ouvert, sépales larges et courts, dans cuvette peu ou moyennement profonde à bord légèrement mamelonné. Chair blanc-jaunâtre, un peu veinée de verdâtre, fine, serrée, ferme, mi-juteuse, sucrée, légèrement acidulée et parfumée. Bonne.


Arbre vigoureux et bien fertile, s'accommodant de tous les porte-greffes et toutes les formes. Rameaux assez nombreux, étalés, gros, courts, très duveteux, brun foncé, à mérithalles courts. Lenticelles rondes, abondantes. Yeux gros, coniques, mi-appliqués. Feuilles petites ou moyennes, ovales-pointues, vert terne, épaisses, gaufrées, coriaces ; dentelure plutôt crénelée et arrondie ; pétiole moyen ou grêle ; stipules élargies.

Variété de commerce ; très répandue dans le Maine-et-Loire.

De Fer

Syn. : *Dure*.


142 5
5.287.686
4 355 79
4



Fruit moyen ou sous-moyen. Épiderme lisse, épais, jaune verdâtre plus ou moins voilé de brun ou partiellement bronzé, teinté de fauve vers l'œil et le pédicelle, abondamment frappé de rouge brun un peu strié ou non ; fortement ponctué de roux-grisâtre. Pédicelle assez fort, ou charnu, renflé à son extrémité, dans cuvette évasée. Œil petit, mi-clos, dans cuvette à bord uni ou légèrement mamelonné. Chair blanc-verdâtre, ferme, mi-juteuse, un peu sucrée, acidulée, à peine parfumée, petites loges, pépins noirâtres assez nombreux, moyens ; assez bonne, crue ; bonne, cuite.

Arbre vigoureux, fertile. Rameaux moyens, grêles, mi-courts, vert brunâtre. Lenticelles peu nombreuses, petites, rondes ou allongées. Yeux moyens, appliqués. Feuilles moyennes ou petites, vert pâle, à longue pointe. Dents fines. Boutons ovoïdes. Floraison tardive.

Variété de marché ; pour verger et toutes formes ; de longue conservation.



Reinette Clochard

Syn. : *Rochelle*.

5 7
5.287.698
4 75 4

Fruits moyens, rarement attachés par 2. Épiderme lisse, jaune-citrin ou doré, parsemé de points roux, un peu bronzé et frappé ou non de rose au soleil. Pédicelle charnu, dans cuvette large. Œil mi-clos, dans cuvette étroite ou assez large, parfois plissée. Chair jaunâtre avec zone jaune, ferme, juteuse, sucrée, acidulé ; bonne.

Arbre vigoureux, érigé, assez fertile. Rameaux brun violacé. Lenticelles petites, rondes. Yeux gros. Feuilles grandes ou moyennes, ovales-aiguës, à pointe courte, vert foncé, luisantes, épaisses, plissées. Dents mi-aiguës. Boutons moyens. Variété de commerce, de bonne conservation ; pour le verger.

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| Adam's pearmain | Pearmain d'Adam ; Pépin de Norfolk. | | 220 |
| Antonowka | | | 197 |
| Api | Petit api rose ; Api rouge .. | | 296 |
| Api gros | Double rose. | Sud-Est. | 303 |
| Api rouge | Api. | | 296 |
| Argent (d') | De Jaune | Anjou, Touraine, Sarthe.... | 309 |
| Aromatic Russet | Fenouillet gris. | | 283 |
| Astracan rouge | Vermillon d'été. | | 194 |
| Arkansas Black | | | 264 |
| Auberive (d') | Belle fleur longue. | Bourgogne. | 276 |
| Baldwin | Calville Buttner ; Pecker ... | | 273 |
| Baltimore | Belle Joséphine. | | 271 |
| Banane d'hiver | Winter Banana | | 280 |
| Barbe | Courby | Ardèche, Isère, Drôme, Haute-Savoie. | 265 |
| Beauté de Rome | Rom's Beauty. | | 298 |
| Beauty of Bath | | | 193 |
| Beauty of Kent | Pépin de Kent. | | 264 |
| Bedforshire Fundling | Mignonne de Bedford. | | 261 |
| Belle de Boskoop | Reinette Belle de Boskoop. | Nord-Est. | 254 |
| Belle de Magny | | Haute-Savoie, Suisse. | 310 |
| Belle de Pontoise | | | 254 |
| Belle de Rome | Rom's Beauty | | 298 |
| Belle-Fille | Belle femme ; Vincent. | | 233 |
| Belle-Fille normande | De Damoiselle. | Touraine. | 292 |
| Belle fleur double | Double bon pommier. | Nord. | 286 |
| Belle fleur longue | Belle fleur rouge ; d'Auberive ; Crotte ;Richarde ; Glacière. | Bourgogne. | 276 |

(1) Régions où sont plus particulièrement répandues certaines variétés dites locales ou régionales ; les variétés d'amateurs ou cultivées un peu partout en France ne font l'objet d'aucune mention.

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| Belle fleur jaune | Linnéous pippin | | 22 |
| Belle fleur rouge | Belle fleur longue. | Côte-d'Or, Haute-Marne, M.-et-Moselle. | 276 |
| Belle fleur rouge suisse. | Chasseur de Menznau. ... | Suisse. | 306 |
| Belle Joséphine | Baltimore ; Joséphine ; Impératrice Joséphine. ... | | 271 |
| Ben Davis | Pépin de New-York ; Victoria pippin | | 241 |
| Bismarck | | | 229 |
| Blanc. | Calville du roi. | | 313 |
| Blenheim pippin | Blenheim orange ; de Blenheim. | | 258 |
| Bohnapfel | Pomme haricot. | Suisse allemande. ... | 300 |
| Bonne Auture. | Bonne Hotture. | Anjou. | 247 |
| Bonne de Mai | Drap d'or. | Bretagne, Gironde. ... | 304 |
| Bonne Ente. | Bon pommier | | 291 |
| Bonne Hotture | Bonne Auture. | Anjou. | 247 |
| Bonnet carré. | Calville blanc. | Ile-de-France. | 292 |
| Bon pommier | Bonne Ente ; Belle fleur simple. | | 291 |
| Bon pommier d'automne | Brabant belle-fleur. | | 279 |
| Borovitsky | Duchesse d'Oldenbourg ... | | 195 |
| Bourget | La Nationale. | | 298 |
| Bovarde | | Suisse. | 239 |
| Brabant Belle fleur | Bon pommier d'automne ; Gloire de Flandres ; Iron ... | Somme. | 279 |
| Cadeau du Général | Reinette d'Angleterre. ... | Ariège, Seine-Inférieure. ... | 238 |
| Calville blanc | Bonnet carré ; Calville blanc à côtes | Ardèche, Ile-de-France, Savoie, Lozère. | 292 |
| Calville Buttner. | Baldwin. | | 273 |
| Calville d'Angleterre | July Flover ; Régalsans ; Cornish Gilly Flover. | | 302 |
| Calville de Boskoop | | | 201 |
| Calville de Dantzig | Dantziger Kantapfel. | | 211 |
| Calville de Saint-Sauveur | Reinette Saint-Sauveur ... | | 294 |
| Calville des femmes | | | 228 |

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Calville d'Oullins | | | 240 |
| Calville Duquesne | | | 216 |
| Calville du Roi | Citron d'hiver ; de Londres | | 313 |
| Calville étoilée | Reinette étoilée | Nord, Belgique | 244 |
| Calville Lesens | | | 277 |
| Calville musquée | Calville rouge d'hiver | Alsace | 294 |
| Calville rayée de Remperheim | | | 219 |
| Calville rouge d'automne | Sonnette ; grelot | Maine-et-Loire | 224 |
| Calville rouge d'hiver | Calville musquée ; passe pomme d'hiver ; Caville rouge | Alsace, Lozère, Hautes- Alpes | 294 |
| Calville rouge du Mont-d'Or | | | 209 |
| Calville Saint-Sauveur | Reinette Saint-Sauveur | | 294 |
| Canada | Reinette du Canada blanche | | 267 |
| Canada blanc | Reinette du Canada blanche | Auvergne, Alpes, Cantal, Ille-et-Vilaine, Hautes- Alpes, Isère, Savoie | 267 |
| Canada gris | Reinette grise du Canada | | 252 |
| Canterbury | Reinette de Cantorbery | | 231 |
| Carmeliter's pippin | Reinette des Carmes | | 244 |
| Carrel | | Bretagne | 289 |
| Carrière | Galantine | Savoie | 274 |
| Cartaut | | Puy-de-Dôme | 308 |
| Cellini | | | 209 |
| Chailleux | | Ille-et-Vilaine, Loire- Inférieure | 215 |
| Champ Gaillard | Des Basses-Alpes ; Jean Gaillard | Hautes-Alpes, Briançonnais | 254 |
| Charrières | Galantine | | 274 |
| Chasseur de Menznau | Belle fleur rouge suisse | Haute-Savoie, Savoie | 306 |
| Châtaignier | De Chastagnier | Suisse, Valais | |
| Citron d'hiver | Calville du roi | Aube Cantal, Loire- Inférieure, Loiret, Ile-de- France | 266 |
| Citron d'hiver suisse | Winterzitrone | | 313 |
| Clermontoise (La) | Reinette Clermontoise | Suisse, Valais | 256 |
| | | Oise | 234 |

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| Cœur de bœuf | Sanguine | Loire-Inférieure | 214 |
| Codling hollandais | | | 202 |
| Corail | Grand Alexandre | | 199 |
| Cornish Gilly Flower | Calville d'Angleterre | | 302 |
| Courby | Barbe | Ardèche, Drôme, Isère, Haute-Savoie | 265 |
| Court pendu de Tournay | Reinette de France | Nord Belgique, Suisse | 285 |
| Court pendu gris | Court pendu doré ; de Capendu | Allier, Aisne | 263 |
| Court pendu noir | | | 227 |
| Court pendu plat | Court pendu rouge | | 287 |
| Court pendu rouge | Court pendu plat ; Reinette de Capendu | Aisne, Calvados | 287 |
| Cox orange pippin | Cox's orange ; Reinette orange de Cox | | 226 |
| Cramoisie de Gascogne | | | 233 |
| Cravert | | Cher | 288 |
| Crotte | Belle fleur longue | Bourgogne, Haute-Marne | 276 |
| Cusset | Reinette Cusset | Lyonnais | 234 |
| Cusset rouge | La Nationale | Lyonnais | 298 |
| Dantziger Kantapfel | Calville de Dantzig | Suisse | 211 |
| De Blenheim | Blenheim pippin | | 258 |
| De Cadillac | Rose de Benauge | Gironde | 310 |
| De Châtaignier | Châtaignier | Loiret | 266 |
| De Comte | De l'Estre, Sainte- Germaine | Auvergne | 295 |
| De Damoiselle | Belle fille normande | Touraine | 292 |
| De fer | Dure | Sud-Est, Cher | 315 |
| De jaune | Reinette du Mans ; d'Argent | Anjou, Touraine, Sarthe, Seine-Inérieure, Ille-et- Vilaine | 309 |
| De Landes | | | 212 |
| De l'Estre | Reinette de Brives | Plateau Central | 295 |
| Delicious | Stark Delicious | | 270 |
| De Livre | Ménagère | | 216 |

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| Demoiselle. | Grosse mignonnette d'Herbassy | Isère | 230 |
| De Neige. | La Fameuse. | | 210 |
| De Parker. | Pépin gris de Parker. | | 232 |
| De suisse. | Reinette suisse. | | 250 |
| De Vérité. | Vérité. | Ile-de-France, Brie | 301 |
| Dorée de Bœdiker. | | | 277 |
| Double Api. | Double rose. | | 303 |
| Double Belle fleur. | Double bon pommier. | Nord. | 286 |
| Double Bon pommier. | Double bonne Enté ; Double belle-fleur. | Nord, Oise, Sud-Est, Seine-Inférieure. | 286 |
| Double pépin d'or. | Reinette de Bréda. | | 262 |
| Double rose. | Double Api ; Dieu ; Vermillon. | Isère, Drôme. | 303 |
| Doux d'argent. | Doux d'Angers ; Ostogate. | Loire-Inférieure. | 293 |
| Drap d'or. | Bonne de mai. | Bretagne. | 304 |
| Duchesse d'Oldenburg. | Borovitsky. | | 195 |
| Dure. | De fer. | Sud-Est. | 315 |
| Elisa Ratk. | | | 201 |
| Empereur Alex. de Russie. | Grand Alexandre. | Région parisienne. | 199 |
| Fameuse (La) | De Neige | | 210 |
| Faros. | Faraud ; Faro. | Ile-de-France, Seine-et- Marne | 236 |
| Favourite de William. | Aromatic Russet ; Gorge de Pigeon. | M.-et-Moselle. | 268 |
| Fenouillet gris. | Reinette douce. | Isère, Drôme | 283 |
| Fenouillet gros. | Königs-Fleiner. | | 282 |
| Fleiner du roi. | Louis XVIII ; de la Madeleine rouge | | 296 |
| Fraise | Calville rouge d'automne | | 196 |
| Framboise d'automne. | Framboise. | | 224 |
| Framboise d'Oberland. | | | 195 |
| Franc rougeot | | Alpes | 285 |

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Franc Roseau | | Savoie, Haute- Savoie, Suisse | 283 |
| Frangée | Impériale ancienne | | 2251 |
| Frémy | Gelineau | Maine-et-Loire | 269 |
| Friandise | Fyne Groon | | 221 |
| Galantine | Charrière ; Carrière | Haute-Savoie, Savoie | 274 |
| Géante d'exposition | | | 275 |
| Gelineau | Fremy | | 251 |
| Gendreville | | Ile-de-France, Seine-et- Marne | 302 |
| Glacière | Belle fleur longue ; Richarde | Ain, Côte-d'Or, Haute- Marne | 276 |
| Gloire de Flandres | Brabant belle fleur | | 279 |
| Glogirowka | | | 208 |
| Gorge de Pigeon | Fenouillet gris | | 283 |
| Grand Alexandre | Gros Alexandre ; Corail ; Empereur Alex. de Russie | Région parisienne | 199 |
| Grand'mère | Grand'mère jaune d'Angers | Anjou | 290 |
| Grand'mère bronzée | | | 289 |
| Grand'mère jaune d'Angers | Grand'mère | Anjou | 290 |
| Gravenstein | A. Grafenstein | | 207 |
| Grelot | Calville rouge d'automne | Maine-et-Loire | 224 |
| Grise de Parmentier | Reinette Parmentier | | 269 |
| Grise de Rouen | Reinette de Dieppedalle | | 300 |
| Gros Alexandre | Grand Alexandre | Région parisienne | 199 |
| Groseille | | Sarthe, Indre-et-Loire | 261 |
| Gros Locard | | Aube, Côtes-du-Nord, Ille- et-Vilaine, Maine-et-Loire, M.-et-Moselle, Loiret, Loir-et-Cher, Seine-et- Marne, Yonne | 311 |
| Grosse mignonnette d'Herbassy | Demoiselle | Isère | 230 |
| Gros Pigeonnet rouge | Pigeon de Jérusalem | | 205 |
| Gros Rambour d'hiver | Ménagère | | 216 |
| Grosse Reinette d'Angleterre | Reinette du Canada blanche | | 267 |
| Haloren | | | 248 |
| Haute bonne | Reinette de Saintonge | Charentes | 307 |

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| Haute bonté. | Reinette de Saintonge. | Charentes | 307 |
| Hower | Wattaugah. | | 242 |
| Impératrice Joséphine. | Belle Joséphine. | | 271 |
| Impériale ancienne | Magnifique ; Frangée. | | 209 |
| Iron | Brabant belle fleur. | | 279 |
| Jaune hâtive | | | 205 |
| Jean Gaillard. | Champ Gaillard | Hautes-Alpes. | 254 |
| Jeanne Hardy | | | 236 |
| Jonathan | | | 275 |
| Jubilé d'Argovie | | | 208 |
| July Flower. | Calville d'Angleterre. | | 302 |
| Jules Labitte | | Oise. | 225 |
| Kandil Sinap | | | 223 |
| Kansas Queen | | | 239 |
| Kerlivio. | Teint frais. | | 308 |
| Königs-Fleiner. | Fleiner du roi. | | 296 |
| Linneous pippin | Belle fleur jaune. | | 222 |
| London pippin. | Calville du roi. | | 313 |
| Mac Intosh | | | 207 |
| Madeleine rouge. | Fraise | | 196 |
| Magnifique | Impériale ancienne. | | 296 |
| Margille | Reinette sucrée ; Reinette musquée. | | 266 |
| Melon. | Reinette de Cantorbery. | | 231 |
| Ménagère | De livre ; Gros Rambour d'hiver ; Monstrueuse de Nikita. | | 216 |
| Menznager läger apfel. | Chasseur de Menznau. | Suisse, Valais. | 306 |
| Mère de ménage. | Ménagère. | | 216 |
| Merveille de Chelmsford | | | 214 |
| Merveille Pearmain | Pearmain Herefordshire. | | 265 |
| Mignonne de Bedford. | Bedfordshire Foundlin. | | 261 |

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| Mignonne de Hollande. | Reinette de Caux. | | 297 |
| Mignonne d'été. | | | 204 |
| Minister Von Hammerstein. | | Valais. | 235 |
| Monstrueuse de Nikita. | Ménagère. | | 216 |
| Monstrueuse Pippin. | Belle Joséphine. | | 271 |
| Nationale (La) | Cusset rouge ; Bernardin ; Bourget. | Lyonnais. | 262 |
| Nelguin. | Reinette de Bréda. | | 249 |
| Newton wonder. | | | 287 |
| Nouvelle France. | | Valais. | 249 |
| Norfolk Beauty. | | | 203 |
| Ohio's Russet. | Russet de l'Ohio. | | 253 |
| Ontario. | | | 312 |
| Ostogate. | Doux d'argent. | | 293 |
| Paragon de Dowiuny | | | 284 |
| Passe-pomme du Canada. | Royal Russet. | | 306 |
| Patte de loup. | Pomme de loup. | Anjou, Basses-Pyrénées, Loire-Inférieure. | 314 |
| Pearmain d'Adam. | Adam Pearmain. | | 220 |
| Pearmain doré d'hiver. | Reine des Reinettes. | Alsace. | 240 |
| Pearmain Herefordshire. | De Hereford ; Merveille Pearmain. | | 265 |
| Peasgood Nonesuch. | Sans pareil de Peasgood .. | | 206 |
| Pépin de Norfolk. | Adam's Pearmain. | | 220 |
| Pépin de Sturmer. | Sturmer's pippin. | | 304 |
| Pépin gris de Parker. | Parsker's pippin ; de Parker | | 232 |
| Pépin Ribston. | Ribston pippin. | | 238 |
| Petit Api rose. | Api. | | 296 |
| Pigeon de Jérusalem. | Gros pigeonnet rouge ; Pigeon d'hiver. | | 205 |
| Pigeon d'hiver. | Pigeon de Jérusalem. | | 205 |
| Pigeonnet blanc d'hiver. | Pigeon blanc ; cœur de Pigeon blanc ; Pointue ; Pigeon rayé. | | 278 |

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Pigeon rouge | Gros Pigeon de Jérusalem ; Pigeon rose; Cœur de pigeon..... | | 222 |
| Pointue..... | Pigeon Blanc d'hiver..... | | 278 |
| Polystica | | | 198 |
| Pomme de loup..... | Patte de loup..... | Anjou..... | 314 |
| Pomme d'or d'Angleterre..... | Reinette d'Angleterre..... | Basses-Pyrénées..... | 238 |
| Président Defaye Dumonceau | | | 211 |
| Prince Impérial | | | 299 |
| Princesse Noble..... | Reinette dorée..... | | 231 |
| Quetier | | | 273 |
| Rador..... | Drap d'or..... | Bretagne..... | 304 |
| Raisin | Sauer Grauech..... | Suisse..... | 280 |
| Rambour d'été..... | Rambour franc..... | Nord-Est..... | 199 |
| Rambour d'hiver | | Nord-Est..... | 258 |
| Rambour franc | Rambour d'été..... | Gironde, Ile-de-France, Nord-Est, Vosges..... | 199 |
| Ravillac | | Île-de-France, Touraine..... | 259 |
| Reine de France | | | 245 |
| Reine des Reinettes | Pearmain dorée d'hiver..... | Alsace, Tarn, Tarn-et-Garonne..... | 240 |
| Reinette à côtes..... | Reinette de Cuzy..... | | 272 |
| Reinette ananas | | | 220 |
| Reinette Raboud..... | Reinette de Demptézieu..... | | 250 |
| Reinette Baumann | Reinette de Bollviller..... | Alsace..... | 281 |
| Reinette blanche..... | Reinette franche..... | | 229 |
| Reinette blanche du Canada..... | Reinette du Canada..... | Auvergne, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Alpes, Touraine, Roussillon..... | 267 |
| Reinette blanche de Champagne | Reinette plate de Champagne..... | Suisse..... | 271 |
| Reinette Clermontoise..... | La Clermontoise..... | | 234 |
| Reinette Clochard | Rochelle..... | Vendée, Touraine..... | 316 |
| Reinette commune..... | Franche..... | | 229 |
| Reinette Cusset..... | Cusset..... | Lyonnais..... | 234 |

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| Reinette d'Angleterre. | Reinette du Vigan ; Cadeau du général ; Pomme d'or d'Angleterre. . . | Ariège, Seine-Inférieure. . . | 238 |
| Reinette d'Angleterre hâtive. | Royale d'Angleterre. | | 213 |
| Reinette Daniel. | | | 311 |
| Reinette de Bleinheim | | | 243 |
| Reinette de Bollviller. | Reinette Baumann. | Alsace | 281 |
| Reinette de Breda. | Double pépin d'or ; Nelguin | | 262 |
| Reinette de Bretagne. | Reinette vermeille de Bretagne. | M.-et-Moselle. | 246 |
| Reinette de Brives | De l'Estre | Limousin. | 295 |
| Reinette de Cantorbéry. | Canterbury ; Melon | | 231 |
| Reinette de Cependu | Court pendu rouge. | | 287 |
| Reinette de Cassel | Reinette de Caux | Est. | 297 |
| Reinette de Caux. | Mignonne de Hollande . . . | Est, Cantal. | 297 |
| Reinette de Chênée. | | | 257 |
| Reinette de Cuzy. | Reinette carrée de Montbard | | 272 |
| Reinette de Dempzeiu. | Reinette Baboud; Reinette Menoux. | | 250 |
| Reinette de Dieppedalle. | Grise de Rouen. | | 300 |
| Reinette de France. | Court pendu de Tournay ; Reinette d'Orléans. | Nord, Sarthe, Belgique, Suisse | 285 |
| Reinette de Landsberg. | | | 206 |
| Reinette de Mauss. | | | 227 |
| Reinette de Metz. | | | 246 |
| Reinette de Normandie. | Reinette franche. | | 229 |
| Reinette de Traver. | Ribston pippin. | | 238 |
| Reinette de Zuccamaglio. | | | 224 |
| Reinette Descardre. | | | 290 |
| Reinette des Carmes | Reinette rousse ; Reinette truitée. | | 244 |
| Reinette Desplanches. | | Ain. | 247 |

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Reinette dorée. | Princesse Noble; Golden Reinette ; Reinette jaune tardive. | | 231 |
| Reinette dorée de Bœdiker. | | | 314 |
| Reinette dorée de Versailles. | Reinette grise de Champagne ; Reinette versaillaise. | | 237 |
| Reinette d'Orléans | Reinette de France. | Nord, Belgique, Suisse. | 285 |
| Reinette douce. | Fenouillet gros | | 282 |
| Reinette du Canada. | Reinette du Canada blanche. | | 267 |
| Reinette du Canada blanche. | Canada blanc ; Canada ; Grosse Reinette d'Angleterre. | Auvergne, Alpes, Cantal, Touraine, Roussillon, Isère, Savoie. | 267 |
| Reinette du Canada grise. | Canada gris. | | 252 |
| Reinette du Mans | De Jaune. | Anjou, Touraine, Sarthe. | 309 |
| Reinette du Vigan. | Reinette d'Angleterre. | Lozère. | 238 |
| Reinette étoilée. | Reinette rouge étoilée, Calville étoilée, Étoilée. | Nord, Belgique. | 244 |
| Reinette franche | Reinette blanche;Gold Reinette ; Reinette commune; Reinette de Normandie. | Maine-et-Loire, Lozère. | 229 |
| Reinette grise. | Reinette grise d'hiver | Haute-Savoie, Sud-Est, Lozère, Gard. | 260 |
| Reinette grise d'automne | Reinette grise d'Angleterre ; Reinette grise plate. | | 218 |
| Reinette grise de Brawlée. | | | 225 |
| Reinette grise d'hiver. | Reinette grise de Vitry ; Reinette grise du Limousin | Sud-Est. | 260 |
| Reinette grise de Saintonge. | Haute Bonté ; Reinette de Saintonge. | Charentes. | 307 |
| Reinette grise Royale | Royal Russet. | | 306 |
| Reinette jaune tardive. | Reinette dorée. | | 231 |
| Reinette marbrée | Bonne de mai; Drap d'or | Bretagne. | 304 |
| Reinette Menoux. | Reinette de Demptézieu. | | 250 |
| Reinette musquée. | Margile. | | 266 |
| Reinette orange de Cox. | Cox's Orange Pippin. | | 226 |
| Reinette Parmentier. | Grise de Parmentier. | | 269 |
| Reinette plate de Champagne. | Reinette blanche de Champagne | Suisse | 271 |

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| Reinette rouge étoilée. | Reinette étoilée. | Nord. Belgique. | 244 |
| Reinette rousse. | Reinette des Carmes. | | 244 |
| Reinette Saint-Sauveur. | Calville Saint-Sauveur. | | 294 |
| Reinette suisse. | De Suisse ; Verte de Stettin ; Verte de Rostok. . | | 250 |
| Reinette très tardive. | Reinette verte. | | 305 |
| Reinette truitée. | Reinette des Carmes. | | 244 |
| Reinette versaillaise. | Reinette dorée de Versailles. | | 237 |
| Reinette verte. | Reinette très tardive. | | 305 |
| Reinette Vignat. | | | 252 |
| Ribston pippin. | Pépin de Ribston ; Reinette de Travers. | | 238 |
| Richarde. | Belle fleur longue. | Côte-d'Or ; Haute-Marne. . | 276 |
| Rochelle. | Reinette Clochard. | Deux-Sèvres, Vendée, Touraine. | 316 |
| Rome's Beauty | Beauté de Rome ; Belle de Rome. | | 298 |
| Rose. | | | 197 |
| Rose d'automne. | Rose de Saint-Florian. | | 218 |
| Rose de Benauge. | De Cadillac ; Rose de mai . | Gironde. | 310 |
| Rose de Bohême. | | | 198 |
| Rose de mai. | Rose de Benauge. | Gironde. | 310 |
| Rose de Saint-Florian. | Passe rose ; roseau d'automne. | | 218 |
| Rose de Virginie. | | Suisse | 192 |
| Rougeur de pêche. | | Suisse | 192 |
| Royale d'Angleterre. | Reinette d'Angleterre hâtive. | | 213 |
| Royale Pearmain d'hiver. | Pearmain Herefordshire. . | | 265 |
| Royal Russet. | Grise royale : Passe- pomme du Canada ; Roussette royale. | | 306 |
| Russet de l'Ohio. | Ohio's Russet. | | 253 |
| Sanguine. | Cœur de Bœuf. | | 214 |
| Sanguine du Rhin. | | | 263 |
| Sans pareille de Peasgood. | Peasgood nonesuch. | | 205 |
| Sainte-Barbe. | | | 278 |
| Sainte-Germaine. | De l'Estre ; de Comte. | | 295 |

| NOMS DES VARIÉTÉS | SYNONYMES | RÉGION DE PRODUCTION | Page |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------|
| Sauer Grauech. | Raisin. | Suisse. | 280 |
| Sonnette. | Calville rouge d'automne. . . | Maine-et-Loire. | 224 |
| Sturmer's Pippin | Pépin de Sturmer. | | 304 |
| Suisse panachée. | Suisse Van Mons. | | 242 |
| Suisse Van Mons | Suisse panachée ; de rose panachée. | | 242 |
| Teint frais | Kerlivio. | Somme. | 308 |
| Titowka. | | Suisse. | 217 |
| Transparente blanche | Grand Sultan. | | 193 |
| Transparente de Croncels | | | 200 |
| Vérité | De Vérité. | Ile-de-France. | 301 |
| Verte de Rostock. | Reinette Suisse. | | 250 |
| Verte de Stettin. | Reinette Suisse. | | 250 |
| Victoria pippin | Ben Davis. | | 241 |
| Vincent. | Belle-fille. | | 233 |
| Wilson June | | | 203 |
| Winesap | Royal Red. | | 256 |
| Winter Banana | Banane d'hiver. | | 280 |
| Zurich | | | 204 |

TABLE DES MATIÈRES

| | Pages |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PRÉFACE..... | 5 |
| INTRODUCTION..... | 6 |
| PREMIÈRE PARTIE | |
| Détermination des fruits par la méthode chiffrée | 10 |
| Valeur ou sens qu'il convient d'attribuer à quelques mots techniques | 11 |
| Comment faut-il s'y prendre pour déterminer rapidement un fruit ?..... | 22 |
| DEUXIÈME PARTIE | |
| Tableau des variétés de poires classées par ordre numérique des diagnostics | 29 |
| Clé destinée à l'identification des poires | 38 |
| Descriptions et figures des variétés de poires (d'après le même ordre numérique) | 39 |
| Liste par ordre alphabétique des poires précédemment étudiées | 169 |
| TROISIÈME PARTIE | |
| Tableau des variétés de pommes classées par ordre numérique des diagnostics..... | 183 |
| Clé destinée à l'identification des pommes | 191 |
| Descriptions et figures des variétés de pommes d'après le même ordre numérique | 192 |
| Liste par ordre alphabétique des pommes précédemment étudiées..... | 317 |